

BULETIN DE AVERTIZARE

Nr. 12 din 04 mai 2026

Condițiile climatice din ultimile zile au favorizat apariția și dezvoltarea daunatorului : *Gărgarita frunzelor (Tanymecus dilaticolis)*.

care pot cauza pierderi importante la culturile de : **PORUMB SI FLOAREA SOARELUI**

Descrierea organismului daunator : adult

Pentru prevenire și combatere, se recomandă executarea tratamentului **T1** pe parcelele pe care s-a depășit pragul economic de daunare: *Gargarita* : **3 exemplare/mp pe timp secetos**

10 exemplare/mp. pe timp umed.



PORUMB



FLOAREA SOARELUI

In parcelele semanate cu Porumb, Floarea soarelui sau Sfecla, imediat dupa rasarirea culturilor, exista pericolul atacului de Gargarita frunzelor (sau gargarita porumbului - Tanymecus dilaticollis). Pentru prevenire si combatere se recomanda un tratament chimic pe toata suprafata, in parcele unde se depaseste o densitate de 5 adulti/m.p.

Gargarita frunzelor de porumb este un daunator polifag care ataca culturile de porumb, floarea soarelui, sfecla de zahar, sorgul, soia, lucerna, grau, orz. In faza initiala de 2-3 frunze, adultul reteaza plantele de la colet, provocand distrugerea in masa a culturii. Datorita atacului de la baza plantei, frunzele surprinse in faza de cornet, prezinta ulterior perforari circulare, dispuse transversal pe limb. Plantele atacate in timpul rasaritului, pana in faza de 2-3 frunze, pot fi roase in zona coletului si se impune intoarcerea culturii.

Intr-o faza mai inaintata de dezvoltare a plantelor, insecta ataca numai limbul foliar pe partile laterale. In aceasta faza plantele se refac, inregistrandu-se o intarziere in vegetatie ce determina o reducere a productiei. Plantele trecute de 4-5 frunze, nu mai constituie sursa de hrana pentru daunator care trece pe alte plante.

Prezinta o singura generatie pe an si ierneaza ca adult in sol, in lojele nimfale, la adancimea de 40-60 cm. Primavara ies din loje nimfale, initial se stabilizeaza in straturile superficiale ale solului (jumatatea lunii martie-prima junatate a lunii aprilie), apoi pe masura ce timpul se incalzeste apar pe plante si devin foarte activi in timpul orelor insorite si calde. Depunerea oualor incepe in a doua decada a lunii aprilie. Stadiul de larva este prezent in natura din prima jumatate a lunii mai pana la sfarsitul lunii august. Acestea se hranesc cu perisorii absorbanti si ultimele ramificatii ale radacinilor plantelor gazda. Impuparea are loc in sol, incepe a doua jumatate a lunii iulie si se incheie la sfarsitul luni august.

Masurile preventive presupun rotatia culturilor si evitarea monoculturii; stabilirea corecta a perioadei semanatului; asigurarea unor conditii care favorizeaza rasarirea rapida; stabilirea unei densitati corespunzatoare a plosntelor .**Tratamentul** se aplica in perioada cuprinsa intre faza de rasarire a plantelor si faza fenologica de 3-5 frunze, ca tratament de corectie la o densitate 5 adulti/mp.

Folositi **unul din produsele de mai jos, dupa caz :**

MOSPILAN 20 SP (GAZELLE)- 0.1 Kg / ha la porumb

DELTAGRI – (FASTER DELTA)- 0,3 L /ha la porumb si floarea soarelui

Produse fitosanitare similare puteti fasi consultand site-ul MADR sectiunea << Agricultura – Fitosanitar – baza de date Pestexpert >>

Perioada optimă de tratament: 05 – 15 mai 2026

Fenofaza culturii :rasarire 3-5 frunze

Alte recomandari : ***Tratamentul se executa pe vreme calduroasa, cu soare puternic, cand daunatorul este prezent pe suprafata solului sau pe planta. Tratamentul este unul de corectie, pentru cei ce au folosit la semanat, samanta netratata.***

Cultura de porumb si floarea soarelui trebuie monitorizata pana la faza de 5 frunze, daca tratamentul nu si a facut efectul, gargaritele fiind vii, se recomanda al doilea tratament sau chiar trei cu produsul **LAMDEX (REXARIS 25 WG) -0,3 KG/HA. PENTRU PORUMB SI FLOAREA SOARELUI**

Luati masurile necesare ce se impun pentru protectia mediului incojurator. Respectati cu strictete normele de lucru cu produse de uz fitosanitar, pe cele de securitate a muncii si cele de protectie a albinelor si animalelor.

Alte recomandari :

Verificați cu mare atenție, recomandările cu privire la compatibilitatea produselor atunci cand intentionați sa aplicați amestecuri de produse de protectie a plantelor !

Luati masurile ce se impun pentru protectia mediului incojurator !

Respectați cu strictete normele de lucru cu produse pentru protectia plantelor, normele de protectie si securitate a muncii, de protectie a albinelor si a animalelor in conformitate cu : Legea nr.383/2013 apiculturii, cu modificarile si completarile ulterioare si Ordinul nr.127/1991 al ACA din România, Ordinul comun nr.45/1991 al Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, 15b/3404/1991 al Dep.pentru Administratie Locala si 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, precum si cu Protocolul de

colaborare nr.328432/2015, incheiat cu ROMAPIS (privind implementarea legislatiei, in vederea protectiei familiilor de albine, impotriva intoxicatiilor cu produse pentru protectia plantelor) :
 Respectati prevederile Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr.297/2017 privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea in siguranta a produselor de protectie a plantelor.
 Respectati obligatiile ce va revin coform Ordinului Ministrului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, al Ministrului Mediului, apelor si Padurilor si al Presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr.352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiționalitatea in cadrul schemelor si măsurilor de sprijin pentru fermieri in Romania, cu modificarile ulterioare.

Întocmit:

Consilier superior,
 Cretu Iuliana

Tratamentele fitosanitare efectuate se inregistrează obligatoriu în registrul de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor conform modelului din anexa nr.2.

ANEXA la Buletinul de prognoza si avertizare

Nume prenume fermier/soc. comercială
 Domiciliu fermier/sediul social al societății
 (Comuna, județul)
 Ferma (nume/număr, adresa).....

REGISTRU

de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor

Data efectuării tratam. (ziua luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Tim-pul aplicării (feno faza)	Tratamentul efectuat				Numele, pre-numele pers. responsabile de efectuarea tratamentului, semntăura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. si data document prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de dăunare: boala/dăunătorul/buruieni	Denumire ppp folosit	Doza omologată /doza folosită	Suprafața, ha			

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

Producătorul agricol numerotează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila după caz) a fermierului sau administratorului societății.

Inspectorii Oficiului Fitosanitar pot sancționa fermierul, conform H.G. nr. 1230 din 12 decembrie 2012 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piață produselor fitosanitare si de abrogare a Directivelor 79/117/CEE si 91/414/CEE ale Consiliului, art. 3, pct 1 (i),(1) Constituie contravenții urmatoarele fapte: i.) nerespectarea de catre utilizatorii profesioniști a prevederilor art.67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr.1.107/2009 privind menținerea evidenței pe o perioadă de cel puțin 3 ani a produselor de protecție a plantelor pe care le utilizează (se sancționează cu amendă de la 8.000 lei la 10.000 lei). Respectati normele de ecocondiționalitate prevazute in Ordinul MADR nr.352

din 10 februarie 2015, conform caruia orice fermier care solicita plăți în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin trebuie să respecte cerințele cu privire la utilizarea produselor de protecția plantelor (SMR 7,8)

Respectați cu strictețe condițiile de depozitare, de manipulare și utilizare a produselor de protecția plantelor în exploatarea agricolă, așa cum sunt prevăzute în Ghidul pentru utilizarea în siguranță a produselor de protecția plantelor (http://www.madr.ro/norme_de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html). Respectați normele de lucru cu produse de protecția plantelor și pe cele de securitate și protecția muncii. Citiți cu atenție și respectați măsurile înscrise pe ambalajul produsului pe care îl utilizați.

IMPORTANT :

NOTA : ESTE INTERZISĂ PULVERIZAREA AERIEANĂ A PRODUSELOR DE PROTECȚIA PLANTELOR FĂRĂ AVIZUL OFICIULUI FITOSANITAR NEAMT CONFORM ORDONANȚEI DE URGENȚĂ NR.34/2012, art.9.

BULETINELE DE PROGNOZĂ ȘI AVERTIZARE VOR FI AFIȘATE ÎN LOCURI VIZIBILE PENTRU A PUTEA FI ACCESIBILE TUTUROR CELOR INTERESAȚI.