

BULETIN DE AVERTIZAREGărgărița silicvelor (*Ceutorhynchus assimilis*)

Oficiul Fitosanitar Vaslui recomandă efectuarea tratamentelor fitosanitare împotriva: **Gărgărița silicvelor** (*Ceutorhynchus assimilis*), **Complex boli foliare și ale silicvei** (*Sclerotinia*, *Botrytis*, *Alternaria*, *Erysiphe*), care poate/pot cauza pierderi importante la culturile: **Rapiță de toamnă**

Pentru prevenire și combatere se recomandă executarea tratamentului numai pe parcelele pe care s-au realizat următoarele condiții: **P.E.D *Ceutorhynchus assimilis* = 1 adult/plantă sau 10–15% silicve atacate.**

Folosiți unul din produsele de mai jos:

1. Trebon 30 EC = 0,2 l/ha + Amistar (Mirador 250 SC) = 0,75 – 1,0 l/ha sau

2. Cyclone (Faster Gold 50 EC) = 0,1 l/ha + Folicur Solo 250 EW (Valor 250 EW) = 1 l/ha

Perioada optimă de tratament: fenofaza „căderea petalelor – formarea primelor silicve”.

Monitorizare: Odată cu apariția primelor silicve va începe și depunerea ouălor. **Monitorizați cu atenție culturile și interveniți cu un tratament la momentul optim, în așa fel încât insectele să depună cât mai puține ouă.** Femelele depun pontă în silicvele mici, abia formate (1 – 2 cm). Însă, majoritatea ouălor sunt depuse la sfârșitul înfloritului, când silicvele au dimensiuni cuprinse între 45 – 60 mm (Doddall et Moisey, 2004).

Alte recomandări:

- În cazul tratamentelor complexate efectuați în prealabil testul de compatibilitate.
- **Agricultorii** care prin activitatea lor depozitează, manipulează și utilizează produse de protecție a plantelor au următoarele **obligații:**

1. Să utilizeze numai produse de protecție a plantelor omologate de Comisia Națională de Omologare a Produselor de Protecție a Plantelor.

2. Să utilizeze produsele de protecție a plantelor doar în scopul pentru care acestea au fost omologate și numai în conformitate cu instrucțiunile de utilizare.

3. Produsele de protecție a plantelor clasificate în categoriile de toxicitate acută (din categoriile 1, 2 și 3 care conțin **pictograma GHS06** și sunt marcate cu cuvântul de avertizare „Pericol”) pot fi utilizate exclusiv de către persoanele juridice care dețin o **autorizație specială** pentru utilizarea produselor de protecție a plantelor și care dispun de personal calificat și instruit în acest sens;

4. Să nu aplice tratamente cu produse de protecție a plantelor în zonele de protecție a resurselor de apă, în zonele de protecție sanitară și ecologică, precum și în alte zone protejate stabilite în condițiile legii.

5. Să respecte condițiile de depozitare, manipulare și utilizare a produselor de protecție a plantelor în exploatarea agricolă, așa cum sunt prevăzute în "**Ghidul pentru utilizarea în siguranță a produselor de protecție a plantelor**" - emis de Autoritatea Națională Fitosanitară;

6. Să păstreze o perioadă de cel puțin 3 ani documentele de evidență contabilă a produselor de protecție a plantelor utilizate și depozitate în exploatarea, precum și **registru de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor**, conform modelului::

Data efectuării tratam. (ziua luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Timpul aplicării / fenofaza culturii	Tratamentul efectuat					Numele, prenumele pers. responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. și data document prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de dăunare: boli/dăunători/buruieni	Denumire PPP folosit	Doza omologată /doza folosită	Suprafața	Cantități utilizate (kg, l)			

7. Pentru protecția familiilor de albine respectați Ordinul comun nr. 45/1991/127/1786/68/15b/1991 al MADR privind unele măsuri pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu pesticide și Legea apiculturii nr. 383/2013.

Responsabil Prognoză și Avertizare
Dr. Ing. Carmen Miroiu

