

**BULETIN DE AVERTIZARE NR. 29 din 15.05.2026**

Oficiul Fitosanitar Călărași recomandă la cultura de tomate în spații protejate și câmp pentru prevenirea și combaterea agenților de dăunare: **MANA** (*Phytophthora i.*), **FĂINARE** (*Leveillula s.*), **OFILIREA BACTERIANĂ A TOMATELOR** (*Corynebacterium m.*), **PĂTAREA CAFENIE** (*Fulvia f.*), **PATAREA ALBĂ A FRUNZELOR DE TOMATE** (*Septoria l.*), **ALTERNARIOZA** (*Alternaria s.*) + **ACARIENI** (*Tetranychus spp.*), **MUSCULIȚA ALBĂ** (*Trialeurodes v.*), **AFIDE**, **TRIPS SPP.**

Se recomandă tratamente cu produse de protecția plantelor după cum urmează:

<b>VITRA 50 WP (CUPRIDIN) TOMATE CÂMP ȘI SERE</b>	Mana, alternarioza, pătarea bacteriană, putregaiul rădăcinilor și fructelor, pătarea pustulară a fructelor de tomate	1,5-2,0 kg/ha. Pauză 3 zile.
<b>TAEGRO</b>	Mana tomatelor – câmp	0,37 kg/ha. Pauză 1 zi.
	Mana tomatelor, făinarea, pătarea brună a frunzelor de tomate (alternarioza) – spații protejate	0,37 kg/ha. Pauză 1 zi.
<b>CUPERTINE SUPER (COMBIDUO COBRE)</b>	Câmp și spații protejate Mana, alternarioza, antracnoza, veștejirea bacteriană, arsura bacteriană	3,5 kg/ha. Pauză 3 zile.
	Câmp Mana tomatelor	3,5 kg/ha. Pauză 10 zile.
<b>ZEAMA BORDELEZĂ TIP „MIF” (ZEAMA BORDELEZĂ VALLES)</b>	Mana tomatelor	3,75-5,0 kg/ha. Pauză 3 zile.
	Alternarioza	3,75-5,0 kg/h. Pauză 3 zile.
<b>ORONDIS EVO</b>	Mană, Făinare	1 l/ha. Se aplică de la prima frunză până la maturitatea deplină.
<b>CUPROFIX ULTRA (NOVICURE)</b>	Mana, Alternarioza, Putregaiul rădăcinilor și fructelor, bășicarea fructelor, pătarea pustulară	1,6-2,4 kg/ha. Pauză 3 zile.
<b>BOUILLIE BORDELAISE WDG</b>	Pătarea pustulară, Alternarioza, Mana, Bășicarea fructelor	0,75% (7,5 kg/ha). Pauză 3 zile și 10 zile pentru tomatele destinate procesării.
<b>POLECI (DECA 2,5 EC)</b>	Afide, tripsi, musculița albă de seră	30-50 ml/hl apă (0,03-0,05 %). Pauză 3 zile.
<b>SIVANTO PRIME 200 SL</b>	Tomate seră și solarii Afide, Musculițe	0,56 l/ha pentru plante cu înălțimea de 1 m în maxim 200-1000 l apă. Pauză 3 zile, 2 tratamente.

<b>APACHE (VERTAB)</b>	Tomate seră Musca minieră, acarieni (acarianul roșu comun, acarianul lat)	0,15-1,0 L/ha (50-100 ml/hl) se aplică înaintea eclozării ouălor, la apariția primelor simptome. Pauză 5 zile.
<b>BERMECTINE</b>	Tomate seră Acarianul roșu comun, acarianul lat, acarianul filicoptid, muște	0,15-1,0 L/ha (50-100 mL/hL)
	Molia tomatelor	1,0 L/ha (100 mL/hL)
<b>MAGNAMUS</b>	Tomate spații protejate Mana tomatelor	0,6 l/ha. Se aplică preventiv de la prima frunză adevărată până la coacerea deplină. Pauză 3 zile. Maxim 4 tratamente.
<b>AZATIN EC</b>	Tomate seră Afide, Musculița alba de seră, Noctuide (Helicoverpa armigera, Autographa gamma, Mamestra brassicae, Spodoptera exigua), Tripși, Tuta absoluta	1,0 - 1,5 l /ha. Se aplică la avertizare. Pauză 3 zile.

**Pentru combaterea dăunătorilor Tuta absoluta și Trialeurodes vaporariorum se pot folosi și capcane lipicioase sau cu feromoni.**

Produsele fitosanitare trebuie utilizate în mod corespunzător, în conformitate cu informațiile de pe eticheta acestora.

Metode profilactice de combatere:

Rotatia culturilor

Igiena culturală

Alternați produsele fitosanitare încercând să nu utilizați de două sau mai multe ori consecutiv aceeași substanță activă

Nu udați în exces, irigați pe biloane, efectuați aerisiri zilnice, mai ales în zilele călduroase pentru a evita apariția bolilor care sunt favorizate de temperaturi ridicate și umiditate în exces.

Udarea se face echilibrat, în funcție de temperatura exterioară.

#### **Alte recomandări:**

Verificați, cu mare atenție, recomandările cu privire la compatibilitatea produselor atunci când intenționați să aplicați amestecuri de produse de protecție a plantelor! Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător.

Respectați cu strictețe normele de lucru cu produse de protecție a plantelor, cele de securitate a muncii, de protecție a animalelor și familiilor de albine, în conformitate cu: Legea Apiculturii nr. 383/2013, cu modificările și completările ulterioare și Ordinul 127/1991 al ACA din România, Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației, Ordinul nr. 15b/3404/1991 al

Departamentului pentru Administrație Locală și Ordinul 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, precum și în conformitate cu Protocolul de colaborare, nr. 328432/2015, încheiat cu ROMAPIS, privind implementarea legislației în vederea protecției familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu produse pentru protecția plantelor.

Respectați prevederile Ordinului Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, nr 297/2017, privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea în siguranță a produselor de protecție a plantelor. Respectați obligațiile ce vă revin conform Ordinului Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerului Mediului Apelor și Pădurilor și al Președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, nr. 352/636/542015, pentru aprobarea normelor privind ecocondiționalitatea în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, cu modificările și completările ulterioare.

Responsabil Prognoză și Avertizare,  
Micuț – Istrate Daniela

