

BULETIN DE AVERTIZARE

Nr. 35 din 06.05. 2026

Oficiul Fitosanitar Ilfov, recomanda efectuarea tratamentelor fitosanitare la cultura de: **TRANDAFIR**
Pentru prevenirea si combaterea organismului daunator: **MACROSIPHUM ROSAE** (păduchele verde)
MACROSIPHUM ROSAE (păduchele verde). *Adultul (femela aptera) are corpul de culoare verde, rareori
bruna. Antenele sunt mai lungi decat corpul. Corniculele sunt lungi, cu reticulatii proeminente de culoare
neagra. Abdomenul este verde – lucios, dorsal cu dungii negre. Afidele se dispun pe partea inferioara a frunzelor, lastari
tineri si inflorescente, inteapa si sug suculele celulare si elimina pe acesta mari cantitati de roua de miera. Frunzele plantelor
atacate se deformeaza, butonii florali nu se mai deschid sau dau flori mici si deformate, lastarii stagneaza din crestere.*
Pentru prevenire si combatere se recomanda executarea tratamentului **nr 2**, numai pe parcelele pe care s-au realizat
urmatoarele conditii:

Pentru efectuarea tratamentului, folositi unul din produsele sau amestecurile de mai jos:

- 1. MOSPILAN 20 SP /GAZELLE - 0,0125% sau**
- 2. TEPPEKI / AFINO – 0,012- 0,014 % sau**

alte produse pentru protectia plantelor omologate, pentru a fi utilizate pe teritoriul Romaniei.

Tratamentul se va combina cu fungicide pentru combaterea bolilor: **SPHAEROTHECA F.** (fainarea);
DIPLOCARPON R. (patarea neagra); **PHRAGMIDIUM D.** (rugina).

SPHAEROTHECA F. (fainarea), se manifesta pe frunze, ramurile tinere, pe boboci si chiar pe fructe in toata
perioada de vegetatie a plantei. Pe ambele fete ale frunzelor atacate apar diferite pete de culoare alba, formate din
miceliul, conidioforii si conidiile ciupercii. Tesuturile din dreptul petelor sufera un proces de necroza, iar frunzele se
rasucesc si se usuca. Ramurile tinere atacate sunt acoperite de o pasla miceliana, compacta, albicioasa la inceput, apoi
galbuie. Ramurile atacate nu se lignifica complet. Bobocii florali sunt acoperiti de miceliul albicios, raman mai mici si nu
mai formeaza flori.

DIPLOCARPON R. (patarea neagra), pe frunzele atacate, apar pete circulare, de 3- 10 mm in diametru, de culoare
negricioasa- violacee. Petele sunt vizibile pe fata superioara a limbului. Datorita atacului, frunzele bolnave cad de
timpuriu, iar plantele formeaza putine flori.

PHRAGMIDIUM D. (rugina), se manifesta pe frunze, flori, lastari si fructe. Pe fata superioara apar primavara pete
galbene, in dreptul carora, pe fata inferioara se formeaza pustule portocalii.

- 1. DIFCOR - 0,1 % sau sau**
- 2. THIOVIT JET 80 WG – 0,4 % sau**

alte produse pentru protectia plantelor omologate, pentru a fi utilizate pe teritoriul Romaniei.

Perioada optimă de tratament: **LA PRIMIREA AVERTIZARII.**

Alte recomandari:

Alte recomandări;

Pentru aderarea solutiei pe planta, in solutia de stropit se adauga adeziv (**SILWET GOLD -0,1%**);

La prepararea solutiei se vor respecta toate instructiunile de folosire, de pe eticheta produsului.

Verificati, cu mare atentie, recomandarile cu privire la compatibilitatea produselor atunci cand intentionati sa aplicati
amestecuri de produse de protectie a plantelor!

Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului inconjurator!

Respectați cu strictete normele de lucru cu produse de protectie a plantelor, normele de protectie si securitate a muncii, de
protectie a albinelor si a animalelor in conformitate cu: Legea nr.383/2013 a apiculturii, cu modificarile si completarile
ulterioare si Ordinul nr.127/1991 al ACA din Romania, Ordinul Comun nr.45/1991 al Ministerului Agriculturii si
Alimentatiei, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administratie Locala si 1786/TB/ al Ministerului
Transporturilor, precum si cu Protocolul de colaborare nr.328432/2015, incheiat cu ROMAPIS (privind implementarea
legislatiei, in vederea protectiei familiilor de albine, impotriva intoxicatiilor cu produse de protectie a plantelor);
Respectati prevederile Ordinului Ministrului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale nr.297/2017 privind aprobarea Codului de
bune practici pentru utilizarea in siguranta a produselor de protectie a plantelor.

Respectati obligatiile ce va revin conform Ordinului Ministrului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, al Ministrului
Mediului Apelor si Padurilor si al presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor

nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiționalitatea în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, cu modificările ulterioare.

Agricultorii care prin activitatea lor depozitează, manipulează și utilizează produse de protecție a plantelor au următoarele obligații:

1. Să utilizeze numai produse de protecție a plantelor omologate de Comisia Națională de Omologare a Produselor de Protecție a Plantelor;
2. Să utilizeze produsele de protecție a plantelor doar în scopul pentru care acestea au fost omologate și numai în conformitate cu instrucțiunile de utilizare;
3. Să nu aplice tratamente cu produse de protecție a plantelor în zonele de protecție a resurselor de apă, în zonele de protecție sanitară și ecologică, precum și în alte zone protejate stabilite în condițiile legii;
4. Să respecte condițiile de depozitare, manipulare și utilizare a produselor de protecție a plantelor în exploatarea agricolă, așa cum sunt prevăzute la cap. VI pct. 6.3 – 6.7 din Codul de bune practici în ferma, aprobat prin Ordinul ministrului mediului și gospodăririi apelor nr. 1.234/2006.

Cerințe obligatorii pentru fermieri: Conform Hotărârii 1230 din 12 Decembrie 2012, art.67, privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr.1.107/2009 al Parlamentului European, utilizatorii profesioniști de produse de protecție a plantelor au obligația să păstreze pentru o perioadă de cel puțin 3 ani, evidența produselor de protecție a plantelor pe care le utilizează.

În registrul în care țin evidența produselor de protecție a plantelor se va specifica:

- denumirea produsului de protecție a plantelor;
- momentul aplicării;
- doza;
- zona și cultura pentru care s-a folosit produsul de protecție a plantelor.

La cerere, utilizatorii profesioniști pun la dispoziția inspectorilor fitosanitari informațiile relevante din evidențele respective.

Nerespectarea de către utilizatorii profesioniști a prevederilor art. 67 alin.(1) din Regulamentul (CE) nr. 1.107/2009, privind menținerea evidenței pe o perioadă de cel puțin 3 ani a produselor de protecție a plantelor pe care le utilizează constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 8000 lei la 10000 lei, conform Hotărârii 1230 din 12 decembrie 2012, Art. 3

alin. (1), litera i.

Nume și prenume fermier/soc. comercială.....

Domiciliul fermier/sediul social al societății

(Comuna, județul)

Ferma (nume/număr, adresa).....

REGISTRU

de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor

Data efectuării tratam. (ziua, luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Timpul aplicării / fenofaza culturii	Tratamentul efectuat					Numele, pre-numele pers. responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. și data document prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de dăunare: boala/dăunătorul/buruieni	Denumire ppp folosit	Doza omologată /doza folosită	Suprafața, ha	Cantități utilizate (kg, l)			

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

Producătorul agricol numerotează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila după caz) fermierului sau administratorului societății.

Responsabil Prognoza și Avertizare,
Maria BOGDAN

