

Oficiul Fitosanitar Olt
Str. Tudor Vladimirescu Nr. 165
SlatinaT +40787603972
F +40(249)436234
e-mail: ufjolt@yahoo.com
ofolt@anf.ro


Nr.663/O/26.05.2026

BULETIN DE AVERTIZARENr. 16 din 26.05.2026**VIERMELE MERELOR (*CYDIA P.*) + RAPANUL (*VENTURIA I.*) + FAINAREA (*PODOSPHAERA L.*) LA MĂR**

Viermele merelor



Fainarea marului



Rapan fata frunza



Rapan spate frunza

Pentru prevenirea și combaterea organismelor daunatoare: **VIERMELE MERELOR (*CYDIA P.*) + RAPANUL (*VENTURIA I.*) + FAINAREA (*PODOSPHAERA L.*) LA MĂR:**

VIERMELE MERELOR (*Cydia p.*) – larvele acestei insecte ataca fructele și lăstarii erbacei. Ele pătrund în pulpă, în zona casei seminale, unde distrug semințele, din care cauză fructele nu mai cresc. Larvele din prima generație cauzează pierderi totale la fructele atacate, deoarece acestea fiind mici, cad.

RAPANUL (*Venturia inaequalis*) – pe fructe apar pete circulare, de 4 – 5 mm diametru, brune – negricioase, izolate sau confluențe. Când sunt atacate fructele tinere, în creștere, petele pot ajunge la dimensiuni mari, de câțiva cm. Ca urmare a atacului pe fructele tinere, acestea nu se mai dezvoltă uniform, producându-se o deformare a acestora. Pe fructele care au ajuns la dimensiunea maximă apar pete mai mici, aproximativ circulare, negricioase, uneori cu marginile roșiatice.

FAINAREA (*Podosphaera leucotricha*) - Boala se poate manifesta în toată perioada de vegetație, de primăvara timpuriu și până toamna. Intensitatea cea mai mare a atacului este de obicei în prima jumătate a ciclului de vegetație, intervalul aprilie – iunie, când organele tinere ale pomilor sunt în creștere rapidă. Atacă frunzele, lăstarii tineri, ramurile, florile, mai rar fructele. Frunzele se deformează, se încovoie ușor spre partea superioară în formă de luntre, sunt mai rigide și se usucă devreme. Pe fructele tinere apare un miceliu albicios la punctul de inserție al pedunculului și la baza sepalului.

Pentru prevenire și combatere se recomandă executarea tratamentului:
IN PLANTATIILE DE MAR IN PERIOADA 27- 31 mai 2026:

Pentru combaterea viermelui merelor (*CYDIA P.*) folosiți unul din produsele de mai jos, după caz:

1. AFFIRM OPTI - 2,0 kg/ha
2. SHERPA 100 EC - 0,30 l/ha
3. SUMI ALPHA 5 EC / WIZARD - 0,02% (0,3 l/ha)
4. KARATE ZEON /NINJA - 0,15 %
5. AFFIRM - 3-4 kg/ha în 1500 l apă
6. ZEBRA - 0,15 l/ha
7. POLECI / DECA 2,5 EC - 30 ml/hl apă (0,03%)
8. DECIS 25 WG- 0,045 kg/ha (0,003%)

Pentru combaterea bolilor, rapanul (*Venturia inaequalis*) si fainarea (*Podosphaera leucotricha*)
tratamentul se complexează cu unul din fungicidele:

1. DOMARK 10 EC - 0,4 l/ha (0,027%)
2. FONTELIS - 0,75 l/ha *pentru depozitare, utilizare si eliminare stocuri de produs la utilizatori (până la data de 02.12.2026).*
3. SEXTAN / TEBUTEC - 0,05% (0,75 l/ha în 1500 l apă);
4. KOCIDE 2000-2,5kg/ha - Expira certificatul de omologare la data de 31/12/2026

sau alte produse pentru protectie a plantelor, omologate, pentru a fi utilizate pe teritoriul Romaniei.

Alte recomandari:

Verificati cu mare atentie recomandarile, cu privire la compatibilitatea produselor atunci cand intentionati sa aplicati amestecuri de produse de protectie a plantelor!

Luati masurile ce se impun pentru protectia mediului inconjurator!

In afara produselor de protectie a plantelor mentionate ma sus se pot utiliza si altele (consultati PESTEXPERT).

Tratamentele efectuate se vor mentiona in **REGISTRUL DE EVIDENTA A TRATAMENTELOR CU P.P.P.**

Producatorul agricol are obligatia de a numerota paginile registrului. La spatele registrului se va mentiona numarul de pagini. Va pune semnatura producatorului sau a administratorului (stampila dupa caz). Registrul de tratamente fitosanitare cu ppp se va pastra 3 ani.

Respectati cu strictete normele de lucru cu produse pentru protectia plantelor, normele de protectie si securitatea muncii, de protectie a albinelor si a animalelor in conformitate cu: Legea nr 383/2013 a apiculturii, cu modificarile si completarile ulterioare si Ordinul nr 127/1991 al ACA din Romania, Ordinul comun nr 45/1991 al Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, 15b/3404/1991 al Dep. Pentru Administratie Locala si 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, precum si cu Protocolul de colaborare nr 328432/2015, incheiat cu ROMAPIS (privind implementarea legislatiei, in vederea protectiei familiilor de albine, impotriva intoxicatiilor cu produse oenru protectia plantelor);

Respectati prevederile Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 297/2017 privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea in siguranta a produselor de protectie a plantelor.

Respectati obligatiile ce va revin conform Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale, al ministrului mediului, apelor si padurilor si al presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecoconditionalitatea in cadrul schemelor si masurilor de sprijin pentru fermieri in Romania, cu modificarile si completarile ulterioare.

Responsabil Prognoza si Avertizare,
Băloi Monalisa

