

BULETIN DE AVERTIZARE

Nr. 18 din 27.05. 2026

Sunt întrunite condițiile optime pentru apariția daunatorului : **Viermele prunelor (Cydia funebrana), afide** la **PRUNE**

Viermele prunelor , in tara noastra este prezent in bazinele pomicole din zonele de stepa si silvostepa precum si in zona padurilor de fag si stejar . Adultul este un fluture de talie mica , cu anvergura aripilor de 10-15 mm, iar larva prezinta culoare rosie –caramizie pe partea dorsala si roz pal pe cea ventrala si masoara 10-14mm lungime la dezvoltarea completa . Viermele prunelor are doua generatii pe an dar s-a observat ca in zonele de campie poate dezvolta si a treia generatie . Acest daunator ierneaza ca larva intru-n cocon matasos , in crapaturile scoartei tulpinilor , sub scoarta sau in resturile vegetale .

Primavara in martie –aprilie , larvele se transforma in pupa . Primii adulti apar la inceputul lunii mai (in zonele de stepa si silvostepa)sau spre sfarsitul lunii (in subzona stejarului si a fagului) si devin activi la temperaturi medii de peste 10 grade C.

Larvele aparute rod galerii in fructele tinere si se hranesc cu pulpa si samburii cruzi . Drept urmare, fructele isi inceteaza cresterea, devin violacee si cad pe sol iar larvele se hranesc in continuare pana la dezvoltarea completa dupa care se retrag sub scoarta exfoliata a trunchiurilor si isi confectioneaza coconul matasos pentru a se transforma in pupe. Urmeaza aparitia fluturilor generatiei a doua , la inceputul lunii iulie . Dupa aparitie , adultii se imperecheaza si depun pontă pe fructele crude sau in parga , preferand soiurile tardive si semitardive . Larvele generatiei a doua patrund in fructe si rod galerii in jurul samburelui .Spre toamna , la inceputul lunii septembrie , larvele se retrag pentru hibernare, constituind rezerva biologica pentru anul urmator .

Efectuati tratamentele folosind unul din urmatoarele produse :

Pentru viermele prunelor :

- **Decis 25 WG** – 0,03% sau
- **Laser 240 SC** – 0,6 L/ha sau
- **Deltagri** – 0,3 L/ha sau
- **Karate Zeon** - 0,015 %
- **Jakpot 2,5 EC** – 0,3 -0,7 L/ha - pentru afide

Perioada optima pentru efectuarea tratamentului: in zile fara ploaie si vant .

Atentie ! In conformitate cu prevederile legale respectati normele de tehnica securitatii muncii , protectia animalelor , albinelor si a mediului inconjurator impotriva intoxicatiilor cu produse de protectia plantelor.

RECOMANDĂRI: Respectați cu strictețe normele de lucru cu produse de uz fitosanitar, pe cele de securitate a muncii, de protecție a albinelor și a animalelor conform: Ordinului Comun nr. 45/1991 al MAA, privind unele măsuri pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu pesticide, a Legii nr.383/2013 a apiculturii și nr.127/1991 al ACA din România; 68/05.02.1992 Ministerul Mediului; 15b/3404/1991 al Dep. Pentru Administrație Locală și 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, precum și a Protocolului de colaborare nr. 328432/31.03.2015, încheiat între *Agencia Națională Fitosanitară și Asociația Crescătorilor de Albine din România*, privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu produse de protecția plantelor.

ALTE RECOMANDĂRI:

Având în vedere implementarea cerințelor legale în materie de gestionare referitor la „Introducerea pe piață a produselor de protecția plantelor “(SMR 10), agricultorii, care prin activitatea lor depozitează, manipulează și utilizează produse de protecție a plantelor au următoarele obligații:

1. Să utilizeze numai produse de protecție a plantelor omologate de Comisia Națională de Omologare a Produselor de Protecție a Plantelor, care se regăsesc în baza de date **PEST-EXPERT**.

2. Să utilizeze produsele de protecție a plantelor doar în scopul pentru care acestea au fost omologate și numai în conformitate cu instrucțiunile de utilizare- doza/ha,to, cultura, agentul de dăunare și respectarea momentului aplicării. Aplicarea produselor de protecția plantelor trebuie realizată numai la avertizare.

3. Sa se asigure ca produsele de protecție a plantelor clasificate ca **foarte toxice (T+)** și **toxice (T)** vor fi utilizate numai de persoanele juridice care dețin autorizație pentru utilizarea acestor produse, emisă de Oficiul Fitosanitar Județean din raza teritorială în care își desfășoară activitatea.

4. Să nu aplice tratamente cu produse de protecție a plantelor în zonele de protecție a resurselor de apă, în zonele de protecție sanitară și ecologică, precum și în alte zone protejate stabilite în condițiile legii.(parcelele din zona de protecție au o fâșie înierbată de 1-3 m, în funcție de înclinația terenului 12%).

5. Să respecte condițiile de depozitare, manipulare și utilizare a produselor de protecția plantelor în exploatațile agricole, conform Ghidului de bune practici de utilizare si depozitare a produselor de protectia plantelor eliberat de Autoritatea Nationala Fitosanitara

6. Toți fermierii trebuie să păstreze o perioadă de cel puțin 3 ani documentele de evidență a produselor de protecție a plantelor utilizate în exploatație, precum și **Registrul cu evidența produselor de protecția plantelor pe care le utilizează.**

Normele privind ecocondiționalitate sunt obligatorii pentru toți fermierii care solicită plăți prin scheme și măsuri de sprijin din fonduri europene care vor respecta OM 352/2015 si vor consulta Ghidul fermierului postat pe site : [http:// www.apia.org.ro/ro/](http://www.apia.org.ro/ro/)

Toți producătorii agricoli înscrși la APIA, care dețin suprafețe cu culturi agricole în câmp și spații protejate, indiferent de suprafața cultivată, sunt obligați să dețină un registru de evidență a tratamentelor fitosanitare, completat la zi după efectuarea fiecărui tratament, prin completarea într-un registru, după modelul anexat.

REGISTRU
de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor

Data efect uării trata m (ziua luna, anul)	Cultu ra și locul unde este situat terenu l	Tim pul apli cării (fen ofaz a)	Tratamentul efectuat					Numele, pre- numele pers. responsabi le de efectuarea tratament ului, semnătura	Data începer ii recoltăr ii produsu lui agricol	Nr. si data docume nt prin care s-a dat în consum populați ei
			Agentul de dăunare: boli/ dăunător i/ buruieni	Denu mire ppp folosi t	Doza Omol o gată /doza folosit ă	Supr a fața, (ha)	Canti tăți utiliz ate (kg, l)			

*Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1).

Producătorul agricol numerează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila, după caz) fermierului sau administratorului societății.

Intocmit
Ing. Ivanescu Camelia



Verificat
Coordonator O.F.
Ing. Novăcescu Maria