

BULETIN DE AVERTIZARE

Nr.62 din 10.06.2026

Pentru prevenirea și combaterea organismelor daunatoare: **GRAPHOLITA MOLESTA** (Molia orientală a fructelor) – **GEN. A II-a și alți daunatori** (Molia vargată, afide, etc.)

Recomandăm efectuarea tratamentelor fitosanitare la speciile de : **CAIS, PIERSIC**

GRAPHOLITA MOLESTA (*Molia orientală a fructelor*), larva acestui dăunător atacă lăstarii și fructele de piersic. Larvele pătrund în lăstari printre frunzele mici din varf sau pe la baza pedicelului primelor frunze laterale, unde forează galerii. Lăstarii atacați se ofilesc, se îndoiesc, apoi toată porțiunea atacată se usucă. În fructe, larvele pătrund pe la peduncul, unde formează galerii înguste spre sămbure, continuând să se hrănească cu pulpa fructului din jurul sămburelui pe care o degradează.

Pentru prevenire și combatere se recomandă executarea tratamentului **nr. 1**, pentru **gen. a II-a**. Pentru efectuarea tratamentului, folosiți unul din produsele sau amestecurile de mai jos, după caz:

- 1. DELTAGRI /FASTER DELTA – 0,03 % sau**
- 2. KARATE ZEON / NINJA-0,015 % sau**
- 3. CORAGEN - 175 mL sau**
- 4. MAVRIK 2F /EVURE – 0,05 % sau**

alte produse pentru protecția plantelor omologate, pentru a fi utilizate pe teritoriul României.

Tratamentul se va combina cu fungicide pentru combaterea bolilor:

MONILINIA FR. (Monilioza); **TAPHRINA D.** (Bașicarea frunzelor);

SPHAEROTHECA P. (Făinarea); **STIGMINA C.** (Ciuruirea)

MONILINIA FR. (*Monilioza*), atacul se manifestă pe flori, lăstari, frunze, ramuri și fructe. Pot fi infectate toate elementele înflorescențelor. Petalele și frunzele tinere din buchetele florale se ofilesc, se îndoiesc, se brunifică și se usucă. Florile și frunzele brunificate și uscate rămân pe pom în tot cursul perioadei de vegetație. Lăstarii tineri atacați se brunifică, se usucă și se îndoiesc cu varful în jos. Cel mai frecvent este atacul pe fructe, acestea putând fi infectate în orice stadiu al dezvoltării lor. Cele foarte tinere (la începutul formării lor) se brunifică și se usucă. Cu timpul, ele se desprind de pe ramuri și cad. Mult mai des boala apare pe fructele ce se găsesc într-un stadiu mai avansat de dezvoltare sau care se apropie de maturitate.

TAPHRINA D. (*BASICAREA*), se manifestă pe frunze, fructe și ramuri. Frunzele atacate prezintă pe anumite porțiuni sau pe toată suprafața, hipertrofii ale parenchimului foliar, ceea ce determină aspectul bașicat al lor, cu umflături pe fața superioară și adâncituri pe cea inferioară. Aceste frunze se înroșesc la început, apoi devin galbene și în final brune. În cazul unui atac puternic, frunzele se desprind și cad, iar pomii rămân desfrunziți de timpuriu. Lăstarii atacați se îngroașă și rămân scurți. Fructele atacate prezintă porțiuni hipertrofiate, bșsicate, brune în dreptul carora țesuturile crapă. La piersicii atacați, se observă și o scurgere de clei.

SPHAEROTHECA P. (*Făinarea*), boala se manifestă pe frunze și lăstarii tineri. Pe ambele fețe ale frunzelor apar pete albicioase, de forme diferite. Frunzele se încrețesc și se rasucesc, rămân mici, se usucă și cad de timpuriu. Creșterea lăstarilor tineri este inhibată, lăstarii rămân scurți, se îndoiesc la varf și se usucă. Pe fructe, apar pete albicioase, care ulterior se brunifică, rămân mici, se deformează și crapă.

Pentru efectuarea tratamentului, folosiți unul din produsele de mai jos

- 1. SCORE 250 EC / MAVITA 250 EC - 0,15 l/ha sau**
- 2. BOUILLIE BORDELAISE WDG / BORDOMIX – 0,5 % sau**
- 3. SULPHUR 80 WG – 3,0 kg./ ha sau**

alte produse pentru protecția plantelor omologate, pentru a fi utilizate pe teritoriul României.

Alte recomandari:

Tratamentul se va efectua in perioada avertizata in zile fara vant si se va repeta la interval de 7 – 10 zile in functie de remanenta produsului folosit si de conditiile meteo.

Verificați,cu mare atenție, recomandările cu privire la compatibilitatea produselor atunci când intenționați să aplicați amestecuri de produse de protecție a plantelor!

La prepararea soluției se vor respecta toate instrucțiunile de folosire,de pe eticheta produsului.

Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător!

Respectați cu strictețe normele de lucru cu produse de protecție a plantelor,normele de protecție si securitate a muncii,de protecție a albinelor si a animalelor in conformitate cu: Legea nr.383/2013 a apiculturii, cu modificarile si completarile ulterioare si Ordinul nr.127/1991 al ACA din România,Ordinul Comun nr.45/1991 al Ministerului Agriculturii si Alimentației,15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administrație Locala si 1786/TB/ al Ministerului

Transporturilor, precum si cu Protocolul de colaborare nr.328432/2015, incheiat cu ROMAPIS (privind implementarea legislației,in vederea protecției familiilor de albine, impotriva intoxicatiilor cu produse de protecție a plantelor);

Respectați prevederile Ordinului Ministrului Agriculturii si Dezvoltării Rurale nr.297/2017 privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea in siguranță a produselor de protecție a plantelor.

Respectați obligațiile ce va revin conform Ordinului Ministrului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, al Ministrului Mediului Apelor si Pădurilor si al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare si pentru Siguranța Alimentelor nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiționalitatea in cadrul schemelor si măsurilor de sprijin pentru fermieri in România,cu modificarile ulterioare.

Agricultorii care prin activitatea lor depozitează, manipulează și utilizează produse de protecție a plantelor au următoarele obligații:

1. Să utilizeze numai produse de protecție a plantelor omologate de Comisia Națională de Omologare a Produselor de Protecție a Plantelor;
2. Să utilizeze produsele de protecție a plantelor doar în scopul pentru care acestea au fost omologate și numai în conformitate cu instrucțiunile de utilizare;
3. Produsele de protecție a plantelor clasificate ca fiind foarte toxice (T+) și toxice (T) vor fi utilizate numai de persoanele juridice care dețin autorizație pentru utilizarea acestor produse;
4. Să nu aplice tratamente cu produse de proteceie a plantelor în zonele de protecție a resurselor de apă, în zonele de protecție sanitară și ecologică, precum și în alte zone protejate stabilite în condițiile legii;
5. Să respecte condițiile de depozitare, manipulare și utilizare a produselor de protecție a plantelor în exploatațiile agricole, așa cum sunt prevazute la cap. VI pct. 6.3 – 6.7 din Codul de bune practici în ferma, aprobat prin Ordinul ministrului mediului și gospodăririi apelor nr. 1.234/2006.

Cerințe obligatorii pentru fermieri: Conform Hotărârii 1230 din 12 Decembrie 2012, art.67, privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009 al Parlamentului European, utilizatorii profesioniști de produse de protecție a plantelor au obligația să păstreze pentru o perioadă de cel puțin 3 ani, evidența produselor de protecție a plantelor pe care le utilizează.

În registrul în care țin evidența produselor de protecție a plantelor se va specifica:

- denumirea produsului de protecție a plantelor;
- momentul aplicării;
- doza;
- zona si cultura pentru care s-a folosit produsul de protecție a plantelor.

La cerere, utilizatorii profesioniști pun la dispoziția inspectorilor fitosanitari informațiile relevante din evidențele respective.

Nerespectarea de către utilizatorii profesioniști a prevederilor art. 67 alin.(1) din Regulamentul (CE) nr. 1.107/2009, privind menținerea evidenței pe o perioadă de cel puțin 3 ani a produselor de protecție a plantelor pe care le utilizează constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 8000 lei la 10000 lei, conform Hotărârii 1230 din 12 decembrie 2012, Art. 3 alin. (1), litera i.

Nume și prenume fermier/soc. comercială.....

Domiciliul fermier/sediul social al societății

(Comuna, județul)

Ferma (nume/număr, adresa).....

REGISTRU

de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor

Data efectuării tratam. (ziua,luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Timpul aplicării/ fenofaza culturii	Tratamentul efectuat				Numele, prenumele pers. responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. și data document prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de dăunare: bola/ dăunătorul/ buruieni	Denumire ppp folosit	Doza omologată /doza folosită	Suprafata, ha			

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

Producătorul agricol numerotează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila după caz) fermierului sau administratorului societății.

Responsabil Prognoza și Avertizare,
Maria BOGDAN