

BULETIN DE AVERTIZARE Nr. 65 din 17.06.2026

Oficiul Fitosanitar Călărași, recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar la cultura de **VIȚĂ DE VIE** împotriva: moliei viței de vie (*Lobesia b.*)

Molia viței de vie (*Lobesia botrana*)

Prim[vara adul'tii (fluturii) genera'tiei hibernante depun ouăle din care, după o perioadă de incubație de 6-8 zile, apar larvele. Larvele din prima generație rod bobocii florali și florile, înfășurând părțile atacate cu fire de mătase sub formă de cuiburi. Uneori, ele rod galerii și în interiorul lăstarilor. Bobocii și florile atacate se usucă și cad. O singură omidă poate distruge 60-80 de boboci. Perioada larvară durează 25-30 de zile, în funcție de temperatură. Perioada de nimfă durează 10-13 zile. Adulții generației întâi apar la început de iunie. Aceștia depun ouăle generației a II-a, care se dezvoltă până la începutul lunii august, când apar adulții. Aceștia depun ouăle generației a III-a pe boabele de struguri. Larvele din generațiile a II-a și a III-a atacă boabele strugurilor. O singură omidă poate distruge până la 18-20 de boabe. Boabele verzi atacate se zbârcesc, se brunifică și cad, iar cele în pârgă sau coapte, mai ales pe timp ploios, sunt infectate cu ciuperca *Botrytis cinerea* și putrezesc.



Pentru combaterea agenților de dăunare, se recomandă folosirea unui produs de protecție a plantelor de mai jos:

1. DECIS 25 WG

Vița de vie	Dăunători	Molia viței de vie (eudemisul)	30 g/ha. 7 zile pauză pentru struguri de masă și 30 zile pauză pentru struguri de vin.
-------------	-----------	--------------------------------	--

2. AFFIRM

Vița de vie	Dăunători	Molia viței de vie	1,5 kg/ha
-------------	-----------	--------------------	-----------

3. CORAGEN

Vița de vie	Dăunători	Molia viței de vie	150 - 175 ml/ha. 30 zile pauză.
-------------	-----------	--------------------	---------------------------------

4. KARATE ZEON

Vița de vie	Dăunători	Molia viței de vie (eudemisul)	0,015% (0,15 l/ha/1000 l apă), se aplică la avertizare. 7 zile pauză.
-------------	-----------	--------------------------------	---

5. TRAPER

Vița de vie	Dăunători	Molia viței de vie (eudemisul)	0,15 – 0,2 l/ha. Se aplică la primele semne de infestare. Maxim 3 tratamente la interval de 7 zile.
-------------	-----------	--------------------------------	---

Alte recomandări:

Verificați cu mare atenție recomandările cu privire la compatibilitatea produselor atunci când intenționați să aplicați amestecuri de produse de protecție a plantelor! Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător.

Respectați cu strictețe normele de lucru cu produse de protecție a plantelor, cele de securitate a muncii, de protecție a animalelor și familiilor de albine, în conformitate cu: Legea Apiculturii nr. 383/2013, cu modificările și completările ulterioare și Ordinul 127/1991 al ACA din România, Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației, Ordinul nr. 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administrație Locală și Ordinul 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, precum și în conformitate cu Protocolul de colaborare, nr. 328432/2015, încheiat cu ROMAPIS, privind implementarea legislației în vederea protecției familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu produse pentru protecția plantelor.

Respectați prevederile Ordinului Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, nr 297/2017, privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea în siguranță a produselor de protecție a plantelor.

Respectați obligațiile ce vă revin, conform Ordinului Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerului Mediului Apelor și Pădurilor și al Președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, nr. 352/636/542015, pentru aprobarea normelor privind ecocondiționalitatea în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, cu modificările și completările ulterioare.

Responsabil Prognoză și Avertizare,
Micuț – Istrate Daniela

