

BULETIN DE AVERTIZARE Nr. 68 din 23.06.2026

Oficiul Fitosanitar Călărași recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar la culturile de **CIREȘ** și **VIȘIN** împotriva agentului de dăunare :**MONILIOZA** (*Monilinia spp*).

MONILIOZA (Monilinia spp.)

Atacul se manifestă pe ramuri, frunze, flori și fructe. Prima dată boala apare pe lăstari și flori, în primăvară, la toate speciile de samburoase. Organele atacate se ofilesc brusc, ducând la pierderi de recoltă de până la 60-90%.

Lăstarii și florile atacate nu produc fructe. Lăstarii atacați, cu frunze și flori brunificate, reprezintă o sursă puternică de infecție ce se poate manifesta în perioada de părgă-recoltat pe fructele mature. Infecțiile secundare ce provin de la organele atacate se răspândesc cu ușurință prin vânt, ploaie și insecte. Organele atacate ofilite și uscate rămân prinse pe pomi până toamna sau chiar în timpul iernii. Pe fructele în părgă sau cele mature, alături de *Monilinia laxa* se găsește și *Monilinia fructigena*.

Tratamentul este curativ pentru agentul de dăunare.

Pentru combaterea agenților de dăunare se recomandă folosirea unui produs de protecție a plantelor de mai jos:

**1. SCORE 250 EC**

Vișin	Boli	Monilioza	0,15 L/ha, 7 zile pauză.
Cireș	Boli	Monilioza, pătarea roșie a frunzelor (antracnoza)	0,2 L/ha, 14 zile pauză.

2. BOUILLIE BORDELAISE WDG (BORDOMIX)

Vișin, cireș	Boli	Blumeriella jaapi (pătarea roșie a frunzelor), Stigmia cariophylla (ciuruirea micotică a frunzelor), Monilinia spp. (monilioza)	0,5% (5,0 kg/ha), 3 zile pauză
--------------	------	---	-----------------------------------

3. TELDOR 500 SC

Cireș, vișin	Boli	Monilioza	0,8 L/ha, 1- 2 tratamente, 3 zile pauză
--------------	------	-----------	---

4. ORIUS 25 EW

Cireș	Boli	Monilioza	0,075 - 0,1 % (0,075-1,0 l/ha în 1000 l apă), 7 zile pauză
-------	------	-----------	--

5. SWITCH 62,5 WG

Cireș	Boli	Monilioza	1,0 kg/ha, 7 zile pauză
-------	------	-----------	-------------------------

6. CONSUS 250 EC

Cireș	Boli	Monilioza	0,2 l/ha, se aplică de la deschiderea primelor flori până când fructele sunt aproape gata pentru recoltare. Maxim 3 tratamente, 14 zile pauză.
Vișin	Boli	Monilioza	0,15 l/ha, se aplică de la deschiderea primelor flori până când fructele sunt aproape gata pentru recoltare. Maxim 2 tratamente, 7 zile pauză.

Alte recomandări:

Verificați cu mare atenție recomandările cu privire la compatibilitatea produselor atunci când intenționați să aplicați amestecuri de produse de protecție a plantelor! Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător.

Respectați cu strictețe normele de lucru cu produse de protecție a plantelor, cele de securitate a **muncii**, de protecție a animalelor și familiilor de albine, în conformitate cu: Legea Apiculturii nr. 383/2013, cu modificările și completările ulterioare și Ordinul 127/1991 al ACA din România, Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației, Ordinul nr. 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administrație Locală și Ordinul 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, precum și în conformitate cu Protocolul de colaborare, nr. 328432/2015, încheiat cu ROMAPIS, privind implementarea legislației în vederea protecției familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu produse pentru protecția plantelor.

Respectați prevederile Ordinului Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, nr 297/2017, privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea în siguranță a produselor de protecție a plantelor.

Respectați obligațiile ce vă revin, conform Ordinului Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerului Mediului Apelor și Pădurilor și al Președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, nr. 352/636/542015, pentru aprobarea normelor privind ecocondiționalitatea în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, cu modificările și completările ulterioare.

Responsabil Prognoză și Avertizare,
Micuț – Istrate Daniela

