


BULETIN DE AVERTIZARE Nr. 70 din 26.06.2026

Oficiul Fitosanitar Călărași recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar la **DIFERITE SPECII POMICOLE și ARBORICOLE** din grădini, aliniamente, parcuri, împotriva agentului de dăunare **OMIDA PĂROASĂ A DUDULUI** (*Hyphantria cunea*) – generația a II-a.

Omida păroasă a dudului este un dăunător polifag ce atacă peste 120 de specii de arbori și arbuști și 104 specii de plante cultivate. Preferă în mod deosebit arțarul, salcâmul, prunul, mărul, gutuiul, caisul, vișinul, nukul, vița de vie, floarea soarelui, porumbul și altele. Aceasta are 2-3 generații pe an, a doua fiind cea mai periculoasă, deoarece pomii defoliați în toamnă nu reușesc să maturizeze lemnul și îngheață. În luna aprilie a fiecărui an fluturii își fac apariția și vor depune ouăle pe partea dorsală a frunzelor. Ouăle vor ecloza la sfârșitul lunii mai, se vor dezvolta foarte rapid și vor invada întreg pomul dacă nu sunt combătute la timp.



Adulții generației a doua (moliile albe) depun ouăle pe dosul frunzelor începând din lunile iulie și august.

Omizile tinere, generația a doua, atacă agresiv în lunile septembrie și octombrie până la defolierea completă a pomilor, arborilor ornamentali, etc.

Mod de atac: acestea țes cuiburi de mătase la vârfurile ramurilor în interiorul cărora se hrănesc în grup.

Tratamentul este curativ pentru agentul de dăunare.

Pentru combatere se recomandă utilizarea unui produs de protecție a plantelor de mai jos:

1. **KARATE ZEON** – arbori izolați și de aliniament, pomi fructiferi - omizi defoliatoare - 0,015 %, se aplică la avertizare sau
2. **DELTAGRI (FASTER DELTA)** - 0,375 l/ha la măr și 0,25 l/ha la prun, 7 zile pauză – omizi defoliatoare

Perioada optimă de tratament: la apariția în cuiburi a larvelor de vârstă a II - a .

Metode de combatere mecanică:

- distrugerea cuiburilor de omizi prin ardere sau îngropare, înainte ca larvele să se răspândească în toată coroana;

Nu se vor consuma fructe din pomii tratați timp de 7 zile de la data efectuării tratamentului fitosanitar;

Alte recomandări:

Verificați cu mare atenție recomandările cu privire la compatibilitatea produselor atunci când intenționați să aplicați amestecuri de produse de protecție a plantelor! Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător.

Respectați cu strictețe normele de lucru cu produse de protecție a plantelor, cele de securitate a muncii, de protecție a animalelor și familiilor de albine, în conformitate cu: Legea Apiculturii nr. 383/2013, cu modificările și completările ulterioare și Ordinul 127/1991 al ACA din România, Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației, Ordinul nr. 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administrație Locală și Ordinul 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, precum și în conformitate cu Protocolul de colaborare, nr. 328432/2015, încheiat cu ROMAPIS, privind implementarea legislației în vederea protecției familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu produse pentru protecția plantelor.

Respectați prevederile Ordinului Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, nr 297/2017, privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea în siguranță a produselor de protecție a plantelor.

Respectați obligațiile ce vă revin, conform Ordinului Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerului Mediului Apelor și Pădurilor și al Președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, nr. 352/636/542015, pentru aprobarea normelor privind ecocondiționalitatea în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, cu modificările și completările ulterioare.

Responsabil Prognoză și Avertizare,
Micuț – Istrate Daniela

