

BULETIN DE AVERTIZARE**Nr. 50 din 02.06. 2026**Oficiul Fitosanitar Ilfov recomandă efectuarea tratamentelor fitosanitare la speciile de: **MĂR, PĂR, PRUN**Pentru prevenirea și combaterea organismelor dăunătoare: **QUADRASPIDIOTUS PERNICIOSUS (Paduchele din san jose). GEN. I –a, AFIDE, ACARIENI, OMIZI MINATOARE.**

Quadraspidotus perniciosus (paduchele din san jose), larvele mobile ale daunatorului au o culoare portocalie și se raspandesc pe ramuri, tulpini, frunze și fructe, fiind mobile până la 24 ore. În acest interval, larvele pot fi duse de curenții de aer. După câteva ore de la migrație, larvele își găsesc un loc unde se fixează, înfigându-și roșul în organele unde sau localizat, de unde sug seva tesuturilor. În același timp, larvele secreta o substanță pe care o injectează în tesuturile libero-lemnoase, din cauza căreia zona afectată se corelează în roșu, sub forma de pete inelare.

Pentru prevenire și combatere se recomandă executarea tratamentului **nr.1**, numai pe parcelele pe care s-au realizat următoarele condiții: **DEPASIREA PRAGULUI ECONOMIC DE DAUNARE 10% pomi atacați.**

Pentru efectuarea tratamentului, folosiți unul din produsele sau amestecurile de mai jos:

- 1. TREBON 30 EC – 0,45 l/ha sau**
- 2. JUVINAL 10 EC - 0,75 l/ha sau**
- 3. DELTAGRI / FASTER DELTA – 0.45 l/ha sau**

alte produse pentru protecția plantelor omologate, pentru a fi utilizate pe teritoriul României.

Tratamentul se va combina cu fungicide pentru combaterea bolilor:

VENTURIA I. (rapan); **PODOSPHAERA L.(FAINAREA); MONILINIA SP.** (monilioza); **STIGMINA C.** (ciuruirea frunzelor).

VENTURIA I. (rapanul), ciuperca ataca toate organele tinere ale plantei (frunze, flori, ramuri, fructe). Atacul pe frunze se manifestă prin pete mici, cenușii, care se extind treptat. Mai târziu, petele foliare prezintă o culoare brună-măslinie. Atacul pe flori este asemănător cu cel descris pe frunze. Pe fructe apar pete cenușii- măslinii, în dreptul cărora tesuturile se suberifică și crapă.

PODOSPHAERA L. (fainarea), atacul se manifestă pe frunze, flori, lastari tineri. Frunzele tinere atacate sunt deformate, casante și se răscesc cu marginile în sus. Frunzele afectate se usuca de timpuriu. Florile de mar atacate au sepelele deformate, ele rămân sterile. Atacul pe fructele tinere produce o stagnare în creștere sau chiar caderea acestora.

MONILINIA SP. (Monilioza), boala se manifestă pe flori, fructe și ramurile tinere. Cel mai periculos atac fiind acela produs pe flori. Florile sunt infectate înainte de deschiderea petalelor. Infecția poate ajunge și pe ramuri, pe care uneori apar gome. Frunzele se vestejesc, luând aspectul unui buchet uscat. Când atacul este târziu, petele se detasează de pericarpul fructului în curs de formare, iar pedunculul se acoperă cu o masă abundentă de conidii. Pedunculii se îndoaie în așa fel încât florile par lipite una de alta. Acest aspect face ca simptomul să fie vizibil în pomul înflorit. Pe ramuri se observă o uscăre, începând de la varf și până la insertia cu pedunculii uscați. Fructele infectate se înmoaie, se încretesc, iar pulpa putrezește și devine granuloasă.

- 1. KING 250 EW/ TEBUSHA 250 EW – 0,750 l/ha sau**
- 2. VITRA 50 WP – 1,5- 2,0 kg./ha sau**
- 3. TOPAS 100 EC – 0,3 l/ha sau**
- 4. MERPAN 80 WDG / FLO- CAPTAN – 2,25 kg./ha sau**

alte produse pentru protecția plantelor omologate, pentru a fi utilizate pe teritoriul României.Perioada optimă de tratament: **LA APARIȚIA PRIMEI LARVE MOBILE (13 -20. 06. 2026)****Alte recomandări:**

Tratamentul se va efectua în perioada avertizată în zile fără vânt.

Tratamentul al II-lea se va aplica la interval de 7 – 14 zile de la primul tratament efectuat în funcție de remanenta produsului folosit și condițiile climatice.

Verificați, cu mare atenție, recomandările cu privire la compatibilitatea produselor atunci când intenționați să aplicați amestecuri de produse de protecție a plantelor!

La prepararea soluției se vor respecta toate instrucțiunile de folosire, de pe eticheta produsului.

Luați

măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător!

Respectați cu strictețe normele de lucru cu produse de protecție a plantelor, normele de protecție și securitate a muncii, de protecție a albinelor și a animalelor în conformitate cu: Legea nr.383/2013 a apiculturii, cu modificările și completările

Respectați obligațiile ce va revin conform Ordinului Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, al Ministrului Mediului Apelor și Pădurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiționalitatea în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, cu modificările ulterioare.

1. Să utilizeze numai produse de protecție a plantelor omologate de Comisia Națională de Omologare a Produselor de Protecție a Plantelor;

3. Produsele de protecție a plantelor clasificate ca fiind foarte toxice (T+) și toxice (T) vor fi utilizate numai de persoanele juridice care dețin autorizație pentru utilizarea acestor produse;

5. Să respecte condițiile de depozitare, manipulare și utilizare a produselor de protecție a plantelor în exploatațiile agricole, așa cum sunt prevazute la cap. VI pct. 6.3 – 6.7 din Codul de bune practici în ferma, aprobat prin Ordinul ministrului mediului și gospodăririi apelor nr. 1.234/2006.

În registrul în care țin evidența produselor de protecție a plantelor se va specifica:

- momentul aplicării;

- doza;

- zona si cultura pentru care s-a folosit produsul de protectie a plantelor.

Nerespectarea de către utilizatorii profesioniști a prevederilor art. 67 alin.(1) din Regulamentul (CE) nr. 1.107/2009, privind menținerea evidenței pe o perioadă de cel puțin 3 ani a produselor de protecție a plantelor pe care le utilizează constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 8000 lei la 10000 lei, conform Hotărârii 1230 din 12 decembrie 2012, Art. 3 alin. (1), litera i.

Nume și prenume fermier/soc. comercială.....

Domiciliul fermier/sediul social al societății

(Comuna, județul)

Ferma (nume/număr, adresa).....

de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor[illegible]

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

Producătorul agricol numerotează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila după caz) fermierului sau administratorului societății.

Responsabil Prognoza si Avertizare,
Maria BOGDAN