

BULETIN DE AVERTIZARE**Nr. 56 din 03.06.2026**

Oficiul Fitosanitar Ilfov recomandă efectuarea tratamentelor fitosanitare la: **TRANDAFIR**

Pentru prevenirea și combaterea organismelor dăunătoare: **MACROSIPHON ROSAE** (păduchele verde al trandafirului); **TETRANYCHUS URTICAE** (păianjanul roșu).

MACROSIPHUM ROSAE (păduchele verde al trandafirului), *adultul (femela apteră) are corpul de culoare verde, rareori brună. Antenele sunt mai lungi decât corpul. Corniculele sunt lungi, cu reticulații proeminente de culoare neagră. Abdomenul este verde – lucios, dorsal cu dungi negre. Afidele se dispun pe partea inferioară a frunzelor, lăstari tineri și inflorescente, înțepă și sug suc celular și elimină pe acesta mari cantități de rouă de miere. Frunzele plantelor atacate se deformează, butonii florali nu se mai deschid sau dau flori mici și deformate, lăstarii stagnează din creștere.*

TETRANYCHUS URTICAE (păianjanul roșu.), *atacă frecvent în anii calduroși și secetoși. Se localizează pe partea inferioară a frunzelor. Larvele și adulții fitofagi absorb prin înțepare seva din țesuturi, zonele afectate prezintă depigmentări punctiforme.*

Pentru prevenirea și combatere se recomandă executarea tratamentului **nr. 2**, numai pe parcelele pe care s-au realizat următoarele condiții:

Pentru efectuarea tratamentului, folosiți unul din produsele sau amestecurile de mai jos, cu:

1. **TEPPEKI / AFINTO - 0,012 – 0,014 % sau**
2. **MOSPILAN 20 SP / GAZELLE - 0,0125% sau**
3. **MAVRIK 2 F – 0,5 l/ha sau**

alte produse pentru protecția plantelor omologate, pentru a fi utilizate pe teritoriul României.

Tratamentul se va combina cu fungicid pentru combaterea bolilor:

SPHAEROTHECA P. (Făinarea trandafirului);

DIPLOCARPON R. (Pătarea neagră);

PHRAGMIDIUM M. (Rugina)

SPHAEROTHECA PANOSA VAR. ROSAE (făinarea trandafirului) se manifestă pe frunze, ramurile tinere, pe boboci și chiar pe fructe în toată perioada de vegetație a plantei. Pe ambele fețe ale frunzelor atacate apar diferite pete de culoare alăbăstră, formate din miceliul, conidioforii și conidiile ciupercii. Țesuturile din dreptul petelor suferă un proces de necroză, iar frunzele se răsucesc și se usucă. Ramurile tinere atacate sunt acoperite de o pălă miceliană, compactă, albicioasă la început, apoi galbuie. Ramurile atacate nu se lignifică complet. Bobocii florali sunt acoperiți de miceliul albicios, rămân mai mici și nu mai formează flori.

DIPLOCARPON ROSAE (pătarea neagră), pe frunzele atacate, apar pete circulare, de 3-10 mm în diametru, de culoare negricioasă-violetă. Petele sunt vizibile pe fața superioară a limbului. Datorită atacului, frunzele bolnave cad de timpuriu, iar plantele formează puține flori.

PHRAGMIDIUM MUCRONATUM (rugina), se manifestă pe frunze, flori, lăstari și fructe. Pe fața superioară apar primăvara pete galbene, în dreptul cărora, pe fața inferioară se formează pustule portocalii.

1. **PREOMESA - 0,8-1,0 l/ha sau**
2. **ZOXIS 250 SC / NORIOS 250 SC – 0,1 % sau**
3. **MOLINA – 0,06 % sau**
4. **TOPAS 100 EC - 0,05% sau**

alte produse pentru protecția plantelor omologate, pentru a fi utilizate pe teritoriul României.

Alte recomandări:

Tratamentul se va efectua în perioada avertizată în zile fără vânt.

Tratamentul al II-lea se va aplica la interval de 7 – 14 zile de la primul tratament efectuat în funcție de remanența produsului folosit și condițiile climatice.

Verificați, cu mare atenție, recomandările cu privire la compatibilitatea produselor atunci când intenționați să aplicați amestecuri de produse de protecție a plantelor!

La prepararea soluției se vor respecta toate instrucțiunile de folosire, de pe eticheta produsului.

Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător!

Respectați cu strictețe normele de lucru cu produse de protecție a plantelor, normele de protecție și securitate a muncii, de protecție a albinelor și a animalelor în conformitate cu: Legea nr. 383/2013 a apiculturii, cu modificările și completările ulterioare și Ordinul nr. 127/1991 al ACA din România, Ordinul Comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administrație Locală și 1786/TB/ al Ministerului

Transporturilor, precum și cu Protocolul de colaborare nr. 328432/2015, încheiat cu ROMAPIS (privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu produse de protecție a plantelor);

Respectați prevederile Ordinului Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 297/2017 privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea în siguranță a produselor de protecție a plantelor.

Respectați obligațiile ce revin conform Ordinului Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, al Ministrului Mediului Apelor și Pădurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiționalitatea în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, cu modificările ulterioare.

Agricultorii care prin activitatea lor depozitează, manipulează și utilizează produse de protecție a plantelor au următoarele obligații:

1. Să utilizeze numai produse de protecție a plantelor omologate de Comisia Națională de Omologare a Produselor de Protecție a Plantelor;

2. Să utilizeze produsele de protecție a plantelor doar în scopul pentru care acestea au fost omologate și numai în conformitate cu instrucțiunile de utilizare;

3. Produsele de protecție a plantelor clasificate ca fiind foarte toxice (T+) și toxice (T) vor fi utilizate numai de persoanele juridice care dețin autorizație pentru utilizarea acestor produse;

4. Să nu aplice tratamente cu produse de protecție a plantelor în zonele de protecție a resurselor de apă, în zonele de protecție sanitară și ecologică, precum și în alte zone protejate stabilite în condițiile legii;

5. Să respecte condițiile de depozitare, manipulare și utilizare a produselor de protecție a plantelor în exploatațile agricole, așa cum sunt prevăzute la cap. VI pct. 6.3 – 6.7 din Codul de bune practici în ferma, aprobat prin Ordinul ministrului mediului și gospodăririi apelor nr. 1.234/2006.

Cerințe obligatorii pentru fermieri: Conform Hotărârii 1230 din 12 Decembrie 2012, art. 67, privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009 al Parlamentului European, utilizatorii profesioniști de produse de protecție a plantelor au obligația să păstreze pentru o perioadă de cel puțin 3 ani, evidența produselor de protecție a plantelor pe care le utilizează.

În registrul în care țin evidența produselor de protecție a plantelor se va specifica:

- denumirea produsului de protecție a plantelor;

- momentul aplicării;

- doza;

- zona și cultura pentru care s-a folosit produsul de protecție a plantelor.

La cerere, utilizatorii profesioniști pun la dispoziția inspectorilor fitosanitari informațiile relevante din evidențele respective.

Nerespectarea de către utilizatorii profesioniști a prevederilor art. 67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.107/2009, privind menținerea evidenței pe o perioadă de cel puțin 3 ani a produselor de protecție a plantelor pe care le utilizează constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 8000 lei la 10000 lei, conform Hotărârii 1230 din 12 decembrie 2012, Art. 3 alin. (1), litera i.

Nume și prenume fermier/soc. comercială.....

Domiciliul fermier/sediul social al societății

(Comuna, județul)

Ferma (nume/număr, adresa).....

REGISTRU

de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor

Data efectuării tratam. (ziua, luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Timpul aplicării/ fenofaza culturii	Tratamentul efectuat					Numele, pre-numele pers. responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. și data document prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de dăunare: bola/dăunătorul/buruieni	Denumire ppp folosit	Doza omologată /doza folosită	Suprafata, ha	Cantitati utilizate (kg, l)			

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

Producătorul agricol numerotează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila după caz) fermierului sau administratorului societății.

Responsabil Prognoza si Avertizare,
Maria BOGDAN