

BULETIN DE AVERTIZARE
Nr. 48 din 02.06. 2026

Condițiile climatice din ultima perioadă au favorizat dezvoltarea organismelor daunatoare: **EURYGASTER SP.** (ploșnița cerealelor) ; **LEMA MELANOPA** (gândacul bălos) **HAPLODIPLOSIIS MARGINATA** (viermele roșu al paiului); **APHIS SPP.** (afide) .

Oficiul Fitosanitar Ilfov recomandă efectuarea tratamentelor fitosanitare la cultura de: **CEREALE PAIOASE**

EURYGASTER SPP. (ploșnița cerealelor), prezintă o generație pe an. Culturile de grâu în timpul vegetației sunt atacate atât de către adulții hibernanți cât și de indivizii din noua generație (larve și adulți noi), hrănirea făcându-se pe toate organele aeriene ale plantei (tulpina, frunze, spic). După apariția adulților hibernanți în cultura, sunt vătămate frunzele și tulpinile. Frunza centrală și, într-un stadiu mai avansat, tulpina se îngălbenesc și se usucă începând de la locul înțepăturii. Atacul produs deasupra ultimului nod, în timpul formării spicului în burduf, atrage după sine îngălbenirea, veștejirea și chiar distrugerea spicului. Dacă atacul s-a produs după ce spicul a ieșit din burduf și până la legat, acesta se albește. Începând din vârsta a III-a, larvele desfășoară o intensă activitate de hranire pe boabele de grâu. Această activitate fiind continuată de noi adulți. Hrănirea și atacul dăunătorilor din noua generație (larve și adulți) au loc pe boabele în formare și pe cele deja formate până la recoltarea lor. Boabele aflate în ultima fază de dezvoltare, care au fost atacate este marcat de un punct negru înconjurat de o zonă decolorată. Părțile din bob înțepate devin crețoașe și albe

LEMA MELANOPA (gândacul bălos), adultul are corpul de 4-4,8 mm lungime, de culoare albastră cu reflexe metalice verzui. Larva gândacului are corpul curbat cu o lungime de 4.5 mm. Prezintă o generație pe an. Iernează ca insectă adultă sub ierburi, în frunzele pădurilor. Apar primăvara, în luna aprilie când temperatura medie zilnică este de 9-10 C. La apariție insectele se hrănesc perforând frunzele sub formă de dungi longitudinale. Depunerea oualor are loc la începutul lunii mai acestea fiind depuse în rânduri pe partea superioară, paralel cu nervura mediană a frunzei. Larvele se hrănesc pe seama limbului foliar unde rod epiderma superioară sub formă de dungi longitudinale, iar epiderma inferioară se usucă albindu-se, în timp de 2-4 săptămâni, larvele ajung la completa dezvoltare, sacul sterocoral dispare și coboară în sol la 4-5 cm adâncime pentru împutare.

Pentru prevenire și combatere se recomandă executarea tratamentului **nr.1**, numai pe parcelele pe care s-au realizat următoarele condiții: Depășirea pragului economic de daunare:

- ploșnița cerealelor - de la 3 larve /mp la loturile semincere;
- 5 larve/mp la loturile de consum
- gândacul balos – 3-5 adulți/mp sau 2 larve pe o tulpină;
- afide (păduchele de frunze), haplodiplosis marginata (viermele roșu al paiului) prezentă în masă.

Pentru combaterea agenților dăunători sus menționați, se recomandă utilizarea unui produs de protecție a plantelor de mai jos:

- | | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| 1. DECIS EXPERT 100EC | - 75 mL/ha. –Eurygaster spp.. |
| | - 62,5 ml/ha - Afide sau |
| 2. MOSPILAN 20 SG / KRIMA 20SG | - 0,1 kg./ha. sau |
| 3. DELTAGRI / FASTER DELTA | - 0,3 l/ha. sau |
| 4. KARATE ZEON /NINJA | - 0,15 l/ha. sau |
| 5. MAVRIK 2 F / EVURE | - 0,2 l/ha. sau |

alte produse pentru protecția plantelor omologate, pentru a fi utilizate pe teritoriul României.

Perioada optimă de tratament: LA APARIȚIA LARVELOR DE VÂRSTA a III-a

ATENȚIE!!

Se va înștiința în scris cu cel puțin 48 de ore înainte de începerea tratamentului, consiliile locale comunale și apicultorii din zonă, astfel încât aceștia să poată proteja familiile de albine, prin închiderea sau îndepărtarea stupilor în interval de timp cât mai redus cu putință.

Comunicand:

- **Data inceperii si durata tratamentului;**
- **Locul unde se aplică tratamentul;**
- **Denumirea produsului folosit/doza/ha;**
- **Mijlocul de aplicare a tratamentului;**
- **Consiliile locale comunale, va lua masuri pentru anunțarea în scris sub semnătură de luare la cunostință, a tuturor deținătorilor de stupine situate în raza teritorială a localității, precum si circumscripția sanitar- veterinară, despre locul și data inceperii tratamentului.**

Alte recomandări:

Verificați, cu mare atenție, recomandările cu privire la compatibilitatea produselor atunci când intenționați să aplicați amestecuri de produse de protecție a plantelor!

La prepararea soluției se vor respecta toate instrucțiunile de folosire, de pe eticheta produsului.

Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător!

Respectați cu strictețe normele de lucru cu produse de protecție a plantelor, normele de protecție și securitate a muncii, de protecție a albinelor și a animalelor în conformitate cu: Legea nr.383/2013 a apiculturii, cu modificările și completările ulterioare și Ordinul nr.127/1991 al ACA din România, Ordinul Comun nr.45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administrație Locală și 1786/TB/ al Ministerului Transporturilor, precum și cu Protocolul de colaborare nr.328432/2015, încheiat cu ROMAPIS (privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu produse de protecție a plantelor); Respectați prevederile Ordinului Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr.297/2017 privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea în siguranță a produselor de protecție a plantelor.

Respectați obligațiile ce revin conform Ordinului Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, al Ministrului Mediului Apelor și Pădurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiționalitatea în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, cu modificările ulterioare.

Agricultorii care prin activitatea lor depozitează, manipulează și utilizează produse de protecție a plantelor au următoarele obligații:

1. Să utilizeze numai produse de protecție a plantelor omologate de Comisia Națională de Omologare a Produselor de Protecție a Plantelor;
2. Să utilizeze produsele de protecție a plantelor doar în scopul pentru care acestea au fost omologate și numai în conformitate cu instrucțiunile de utilizare;
3. Produsele de protecție a plantelor clasificate ca fiind foarte toxice (T+) și toxice (T) vor fi utilizate numai de persoanele juridice care dețin autorizație pentru utilizarea acestor produse;
4. Să nu aplice tratamente cu produse de protecție a plantelor în zonele de protecție a resurselor de apă, în zonele de protecție sanitară și ecologică, precum și în alte zone protejate stabilite în condițiile legii;
5. Să respecte condițiile de depozitare, manipulare și utilizare a produselor de protecție a plantelor în exploatarea agricole, așa cum sunt prevăzute la cap. VI pct. 6.3 – 6.7 din Codul de bune practici în ferma, aprobat prin Ordinul ministrului mediului și gospodăririi apelor nr. 1.234/2006.

Cerințe obligatorii pentru fermieri: Conform Hotărârii 1230 din 12 Decembrie 2012, art.67, privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009 al Parlamentului European, utilizatorii profesioniști de produse de protecție a plantelor au obligația să păstreze pentru o perioadă de cel puțin 3 ani, evidența produselor de protecție a plantelor pe care le utilizează.

În registrul în care țin evidența produselor de protecție a plantelor se va specifica:

- denumirea produsului de protecție a plantelor;
- momentul aplicării;
- doza;
- zona și cultura pentru care s-a folosit produsul de protecție a plantelor.

La cerere, utilizatorii profesioniști pun la dispoziția inspectorilor fitosanitari informațiile relevante din evidențele respective.

Nerespectarea de către utilizatorii profesioniști a prevederilor art. 67 alin.(1) din Regulamentul (CE) nr. 1.107/2009, privind menținerea evidenței pe o perioadă de cel puțin 3 ani a produselor de protecție a plantelor pe care le utilizează constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 8000 lei la 10000 lei, conform Hotărârii 1230 din 12 decembrie 2012, Art. 3 alin. (1), litera i.

Nume și prenume fermier/soc. comercială.....

Domiciliul fermier/sediul social al societății

(Comuna, județul)

Ferma (nume/număr, adresa).....

REGISTRU

de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor

Data efectuării tratam. (ziua,luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Timpul aplicării/ fenofaza culturii	Tratamentul efectuat					Numele, pre-numele pers. responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. și data document prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de dăunare: bola/ dăunătorul/ buruieni	Denumire ppp folosit	Doza omologată /doza folosită	Suprafata, ha	Cantitati utilizate (kg, l)			

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

Producătorul agricol numerotează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila după caz) fermierului sau administratorului societății.

Responsabil Prognoza si Avertizare,
Maria BOGDAN