

BULETIN DE AVERTIZARE Nr. 63 din 17.06.2026

Oficiul Fitosanitar Călărași recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar la cultura de **MĂR** și **PĂR** împotriva agenților de dăunare: **RAPĂN** (*Venturia inaequalis*), **FĂINARE** (*Podosphaera leucotricha*).

RAPĂNUL (*Venturia inaequalis*)

Pe frunzele afectate de patogen apar pete de culoare cafenie-negricioasă, catifelate. La evoluția bolii acestea se unesc și acoperă frunza. În urma atacului, frunzele se usucă și cad. Fructele pot fi atacate în toate stadiile de dezvoltare. Pe acestea apar pete cenușii, catifelate. Ulterior, fructele se deformează, crapă și, în cazul unui atac timpuriu, cad din coroană. Pulpă acestora capătă în ultimă instanță un gust fad. Boala se transmite de la un an la altul sub formă de miceliu de rezistență. Ciuperca iernează pe frunzele infectate căzute pe sol, sau ca miceliu de rezistență pe ramuri.

**FĂINAREA (*Podosphaera leucotricha*)**

Este ușor de observat făinarea la măr, deoarece organele vor fi acoperite de o pulbere cu aspect făinos, care, la început, are culoarea albă, iar apoi devine verde – cenușie. Frunzele atacate de această boală își vor îndoi vârfurile, iar apoi se vor usca și vor cădea. Lăstarii afectați vor căpăta o culoare maro, iar vârfurile se vor îndoi. Florile sunt atacate, se deformează și se vor usca. Legat de fructe, acestea nu vor mai crește și vor cădea din măr.



Tratamentul este curativ pentru boli.

Se recomandă utilizarea unei variante cu produse de protecția plantelor omologate de mai jos:

- **FOLICUR SOLO 250 EW (VALOR 250 EW)**

Măr	Boli	Rapăn și făinare	0,6 l/ha, 14 zile pauză.
-----	------	------------------	--------------------------

- **ORIOUS 25 EW- 0,05% (SALVATOR 25 EW)**

Măr	Boli	Rapăn, Făinare	0,05 % (0,75 L/ha în 1500 L apă), 14 zile pauză.
-----	------	----------------	--

• **DAGONIS**

Măr, Păr	Boli	Rapăn, făinare	1,2 l/ha pentru rapan; 0,72 l/ha pentru făinare.
----------	------	----------------	--

• **DAFNE 250 EC (ILA 250 EC)**

Măr	Boli	Rapăn, Făinare	0,2 L/ha
-----	------	----------------	----------

• **CRICKET 500 WG**

Măr, Păr	Boli	Rapăn	0,45 – 0,75 kg/ha, maxim 3 tratamente/sezon la un interval minim de 7 – 10 zile între tratamente. Se aplică din faza de urechiușe de șoarece până la sfârșitul înfloriturii.
----------	------	-------	--

• **CONSUS 250 EC**

Măr	Boli	Rapăn, Făinare	0,2 l/ha (0,027%). Se aplică de la începutul înfloririi până când fructele sunt aproape gata de recoltare.
-----	------	-------------------	--

Alte recomandări:

Verificați cu mare atenție recomandările cu privire la compatibilitatea produselor atunci când intenționați să aplicați amestecuri de produse de protecție a plantelor! Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător.

Respectați cu strictețe normele de lucru cu produse de protecție a plantelor, cele de securitate a muncii, de protecție a animalelor și familiilor de albine, în conformitate cu: Legea Apiculturii nr. 383/2013, cu modificările și completările ulterioare și Ordinul 127/1991 al ACA din România, Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației, Ordinul nr. 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administrație Locală și Ordinul 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, precum și în conformitate cu Protocolul de colaborare, nr. 328432/2015, încheiat cu ROMAPIS, privind implementarea legislației în vederea protecției familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu produse pentru protecția plantelor.

Respectați prevederile Ordinului Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, nr 297/2017, privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea în siguranță a produselor de protecție a plantelor.

Respectați obligațiile ce vă revin, conform Ordinului Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerului Mediului Apelor și Pădurilor și al Președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, nr. 352/636/542015, pentru aprobarea normelor privind ecocondiționalitatea în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, cu modificările și completările ulterioare.

Responsabil Prognoză și Avertizare,
Micuț – Istrate Daniela

