

BULETIN DE AVERTIZARENr. 43 din 17 Iunie 2026

Condițiile climatice în spații deschise / în spațiile protejate: sere ☐ solarii ☐ răsadnițe ☐ , din ultima perioadă au favorizat apariția și evoluția dăunătorului/bolii :

**VIERMELE PRUNELOR (LASPEYRESIA FUNEBRANA) GII
PĂTAREA ROȘIE A FRUNZELOR (POLYSTIGMA RUBRUM)
CIURUIREA FRUNZELOR (STIGMINA CARPOPHILA)**

care poate cauza pierderi importante la: **PRUN**

Scurtă descriere a bolii sau dăunătorului:

VIERMELE PRUNELOR : PREZINTĂ 2 SAU UNEORI CHIAȚ 3 GENERAȚII PE AN. FLUTURII APAR ÎNCEPÂND CU LUNA MAI; LARVELE ATACĂ ATÂT FRUCTELE VERZI (ROD GALERII SUPERFICIALE LA ÎNCEPUT, APOI PĂTRUND ÎN INTERIOR UNDE CONSUMĂ PULPA ȘI CHIAȚ SÂMBURELE FRAGED) CÂȚ ȘI CELE ÎN PÂRGĂ SAU COAPTE (UNDE FAC GALERII ȘI ROD PULPA DIN JURUL SÂMBURELUI- ACESTE GALERII SUNT UMPLUTE CU RESTURI DE HRANĂ ȘI EXCREMENTE ALE LARVELOR, DÂND UN ASPECT NEPLĂCUT FRUCTELOR, DEPRECIIND CALITATEA ȘI FAVORIZÂND INSTALAREA UNOR AGENȚI PATOGENI, CARE PROVOACĂ PUTREZIREA FRUCTELOR (EX. MONILINIA FRUCTIGENA)

PATAREA ROSIE A FRUNZELOR: PE FRUNZE APAR PETE CIRCULARE, DE CULOARE GALBEN-CREM, APOI PORTOCALII, IAR ÎN FINAL ROSII. TESUTURILE DIN DREPTUL PETELOR SE ÎNGROAȘA, DEVIN CRUSTOASE ȘI SUNT BOMBATE USOR SPRE PARTEA INFERIOARĂ. ÎN FINAL FRUNZELE ATACATE CAD, PRODUCÂND DEFOLIEREA PREMATURĂ A POMILOR. ASTFEL, POMUL ESTE SENSIBIL LA ÎNGHET, IAR DIFERENȚIEREA MUGURILOR DE ROD NU SE DESFAȘOARĂ NORMAL.

CIURUIREA FRUNZELOR : ATACUL SE MANIFESTĂ PE LĂSTARI, RAMURI, FRUNZE, FRUCTE PRIN APARIȚIA UNOR PETE MICI DE CULOARE PURPURIE.

Pentru prevenire și combatere, se recomandă executarea tratamentului numai pe parcelele/suprafețe pe care s-au realizat următoarele condiții:

PREZENȚA ORGANISMELOR DĂUNĂTOARE , FRUCTUL ARE DIMENSIUNE NORMALĂ

Pentru efectuarea tratamentului, folosiți unul din produsele sau amestecurile de mai jos, după caz :

CORAGEN/ (VOLIAM) =100 ML/HA + ALCUPRAL 50 PU= 2,0 KG/HA (0,2%)

Alte recomandări:

*** TRATAMENTUL SE REPETĂ DUPĂ 8-10 ZILE**

Se pot utiliza și alte produse de protecția plantelor recomandate în PEST EXPERT pentru testele avertizate cu acțiune similară.

Dacă în perioada recomandată intervin condiții nefavorabile de lucru, tratamentul se va prelunși cu numărul de zile în care nu s-a putut lucra.

Respectați timpul de pauză a fiecărui produs.

Citiți cu atenție prospectul/instrucțiunile produselor de protecția plantelor înainte de utilizare !

Folosiți la prepararea soluțiilor de stropit numai apa din surse autorizate și verificate periodic (cu Ph cuprins între 7 - 8;

Clătiți de 3 ori recipientii și livrați ambalajele și apele uzate la operatorii economici care efectuează neutralizarea acestora > **program SCAPA** www.aiprom.ro

Luați măsurile ce se impun și în conformitate cu legislația în vigoare pentru protecția mediului înconjurător !

Respectați cu strictețe normele de lucru cu produse de protecție a plantelor, pe cele de securitate a muncii, de protecție a albinelor și a animalelor conform: Ordinului Comun nr. 45/1991 al MAA, privind unele măsuri pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu pesticide, a Legii nr.383/2013 a apiculturii și nr.127/1991 al ACA din România; 68/05.02.1992 Ministerul Mediului; 15b/3404/1991 al Dep. pentru Administrație Locală și 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, precum și a Protocolului de colaborare încheiat între Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale -

Autoritatea Națională Fitosanitară (nr. 3242/F/21.10.1016) și Federația Asociațiilor Apicole din România – ROMAPIS (nr 103/ 21.10.2016) , privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu produse de protecție a plantelor.

Întocmit,

BOCU MARCELA

(nume, Prenume, Semnătura)

Se aprobă, Coordonator Oficiul Fitosanitar Zonal Bacău - Neamț,

ZAHARIA GHEORGHE



Tratamentele fitosanitare efectuate se înregistrează obligatoriu în registrul de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor conform modelului din anexa nr.1.

ANEXA 1 la Buletinul de prognoza și avertizare

Nume și prenume fermier/soc.comercială.....
Domiciliu fermier/sediul social al societății
(Comuna, județul)
Ferma (nume/număr, adresa).....

REGISTRUL

de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor

Data efectuării tratam. (ziua luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Timpul aplicării (feno faza)	Tratamentul efectuat					Numele, prenumele persoanei responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. și data document prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de dăunare: boala/ dăunătorul/ buruieni	Denumire ppp folosit	Doza omologă /doza folosită	Suprafața, ha	Cantități utilizate (kg, l)			

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

Producătorul agricol numerotează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila după caz) fermierului sau administratorului societății.

Inspectorii Oficiului Fitosanitar pot sancționa fermierul, conform H.G. nr. 1230 din 12 decembrie 2012 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piață produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului, art. 3, pct 1 (i),(1) Constituie contravenții următoarele fapte: i.) nerespectarea de către utilizatorii profesioniști a

prevederilor art.67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr.1.107/2009 privind menținerea evidenței pe o perioadă de cel puțin 3 ani a produselor de protecție a plantelor pe care le utilizează" (se sancționează cu amendă de la 8.000 lei la 10.000 lei).

IMPORTANT !BULETINELE DE PROGNOZĂ ȘI AVERTIZARE VOR FI AFIȘATE ÎN LOCURI VIZIBILE PENTRU A PUTEA FI ACCESIBILE TUTUROR CELOR INTERESAȚI.