

BULETIN DE AVERTIZARE**Nr. 71 din 29.06.2026**

Oficiul Fitosanitar Ilfov recomandă efectuarea tratamentelor fitosanitare la speciile de: **MĂR, PĂR**
Pentru prevenirea și combaterea organismelor daunatoare: **CYDIA POMONELLA** (viermele merelor) – **Gen. a II-a;**
APHIS POMI (paduchele verde al mărului).

CYDIA POMONELLA (viermele merelor) adulții din a II- a generație apar la sfârșitul lunii iunie. Fluturii generației a II-a depun ouălele direct pe fructe, mai rar pe frunze. Larvele pătrund în fructe obișnuit pe partea laterală unde de regulă se găsește o frunză sau un fruct lipit. Atacul se produce în două forme: atacul primar, când fructele sunt roase numai superficial, sub formă de galerii și atacul secundar, când fructele sunt perforate în profunzime, fiind traversate de galerii pline de excavații și de resturi brunificate. La completa dezvoltare, larvele părăsesc fructele, migrează pe tulpină și sub ritidomul acesteia, unde se transformă în pupe.

APHIS P. (paduchele verde al mărului), insectele adulte formează colonii compacte pe dosul frunzelor și pe varful lastarilor. Inteața frunzele și se hrănesc cu suc celular. În urma intepaturilor, frunzele se răsucesc, se îngălbenesc și cad prematur. Pe dejectiile eliminate din abundență pe frunze ("roua de miere") se instalează fumagina, care împiedică asimilația normală a frunzelor.

Pentru prevenire și combatere se recomandă executarea tratamentului **nr.1** pentru **gen. a II- a**.
Pentru efectuarea tratamentului, folosiți unul din produsele sau amestecurile de mai jos, după caz:

1. **KARATE ZEON / NINJA** - 0,015 % (0,225 l/ha.) sau
2. **CORAGEN / VOLIAM** - 150 ml/ha ptr. specia **MĂR**
- 160-175 ml/ha ptr. specia **Păr** sau
3. **LASER 240 SC/ NEXUBA** - 0,06 % (0,9 l/ha) sau

alte produse pentru protecția plantelor omologate, pentru a fi utilizate pe teritoriul României.

Tratamentul se poate complexa cu fungicide pentru combaterea bolilor: **VENTURIA I.** (rapanul);
PODOSPHAERA L. (făinarea); **MONILINIA SP.** (monilioza).

VENTURIA I. (rapanul), ciuperca atacă toate organele tinere ale plantei (frunze, ramuri, fructe). Atacul pe frunze se manifestă prin pete mici, cenușii, care se extind treptat. Mai târziu, petele foliare prezintă o culoare brună- maslinie. Pe fructe apar pete cenușii- maslinii, în dreptul cărora țesuturile se suberifică și crapă.

PODOSPHAERA L. (făinarea), atacul se manifestă pe frunze, lăstari tineri. Frunzele tinere atacate sunt deformate, casante și se răsucesc cu marginile în sus. Frunzele afectate se usucă de timpuriu. Atacul pe fructele tinere produce o stagnare în creștere sau chiar caderea acestora.

MONILINIA SPP. (monilioza), boala se manifestă pe ramurile tinere și fructe. Infecția poate ajunge pe ramuri, pe care uneori apar gome. Pe ramuri se observă o uscăre, începând de la varf și până la inserția cu pedunculii uscați. Frunzele se vestejesc, luând aspectul unui buchet uscat. Când atacul este târziu, petele se detășează de pericarpul fructului în curs de formare, iar pedunculul se acoperă cu o masă abundentă de conidii. Fructele infectate se înmoaie, se încrețesc, iar pulpa putrezește și devine granuloasă.

1. **SYLIT 400 SC** – 0.13% (1,95 l/ha) sau
2. **THIOVIT JET 80 WG** -5,0-8,0 kg./ha sau
3. **INTEREST 25 EC/ DIFENZONE 25 EC** – 0,0133 % (0,2 l/ha.) sau
4. **CHORUS 50** - 0,03 - 0,05% (0,45 – 0,75 kg./ ha) sau
5. **SWITCH 62,5 WG** - 0,053 - 0,066 % (0,8-1,0 kg./ha). sau

alte produse pentru protecția plantelor omologate, pentru a fi utilizate pe teritoriul României.

Perioada optimă de tratament: **02 – 08. 07. 2026**

Alte recomandari:

Tratamentul se aplică în zile fără vânt și se va repeta la interval de 7 – 10 zile în funcție de remanența produsului folosit și de condițiile meteo!

Verificați, cu mare atenție, recomandările cu privire la compatibilitatea produselor atunci când intenționați să aplicați amestecuri de produse de protecție a plantelor!

La prepararea soluției se vor respecta toate instrucțiunile de folosire, de pe eticheta produsului.

Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător!

Respectați cu strictețe normele de lucru cu produse de protecție a plantelor, normele de protecție și securitate a muncii, de protecție a albinelor și a animalelor în conformitate cu: Legea nr. 383/2013 a apiculturii, cu modificările și completările ulterioare și Ordinul nr. 127/1991 al ACA din România, Ordinul Comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administrație Locală și 1786/TB/ al Ministerului Transporturilor, precum și cu Protocolul de colaborare nr. 328432/2015, încheiat cu ROMAPIS (privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu produse de protecție a plantelor); Respectați prevederile Ordinului Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 297/2017 privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea în siguranță a produselor de protecție a plantelor.

Respectați obligațiile ce vă revin conform Ordinului Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, al Ministrului Mediului Apelor și Pădurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiționalitatea în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, cu modificările ulterioare.

Agricultorii care prin activitatea lor depozitează, manipulează și utilizează produse de protecție a plantelor au următoarele obligații:

1. Să utilizeze numai produse de protecție a plantelor omologate de Comisia Națională de Omologare a Produselor de Protecție a Plantelor;
2. Să utilizeze produsele de protecție a plantelor doar în scopul pentru care acestea au fost omologate și numai în conformitate cu instrucțiunile de utilizare;
3. Produsele de protecție a plantelor clasificate ca fiind foarte toxice (T+) și toxice (T) vor fi utilizate numai de persoanele juridice care dețin autorizație pentru utilizarea acestor produse;
4. Să nu aplice tratamente cu produse de protecție a plantelor în zonele de protecție a resurselor de apă, în zonele de protecție sanitară și ecologică, precum și în alte zone protejate stabilite în condițiile legii;
5. Să respecte condițiile de depozitare, manipulare și utilizare a produselor de protecție a plantelor în exploatarea agricolă, așa cum sunt prevăzute la cap. VI pct. 6.3 – 6.7 din Codul de bune practici în ferma, aprobat prin Ordinul ministrului mediului și gospodăririi apelor nr. 1.234/2006.

Cerințe obligatorii pentru fermieri: Conform Hotărârii 1230 din 12 Decembrie 2012, art. 67, privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009 al Parlamentului European, utilizatorii profesioniști de produse de protecție a plantelor au obligația să păstreze pentru o perioadă de cel puțin 3 ani, evidența produselor de protecție a plantelor pe care le utilizează.

În registrul în care țin evidența produselor de protecție a plantelor se va specifica:

- denumirea produsului de protecție a plantelor;
- momentul aplicării;
- doza;
- zona și cultura pentru care s-a folosit produsul de protecție a plantelor.

La cerere, utilizatorii profesioniști pun la dispoziția inspectorilor fitosanitari informațiile relevante din evidențele respective.

Nerespectarea de către utilizatorii profesioniști a prevederilor art. 67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.107/2009, privind menținerea evidenței pe o perioadă de cel puțin 3 ani a produselor de protecție a plantelor pe care le utilizează constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 8000 lei la 10000 lei, conform Hotărârii 1230 din 12 decembrie 2012, Art. 3 alin. (1), litera i.

Nume și prenume fermier/soc. comercială.....

Domiciliul fermier/sediul social al societății

(Comuna, județul)

Ferma (nume/număr, adresa).....

REGISTRU

de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor

Data efectuării tratam. (ziua,luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Timpul aplicării/ fenofaza culturii	Tratamentul efectuat					Numele, pre-numele pers. responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. și data document prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de dăunare: bola/ dăunătorul/ buruieni	Denumire ppp folosit	Doza omologată /doza folosită	Suprafata, ha	Cantitati utilizate (kg, l)			

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

Producătorul agricol numerotează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila după caz) fermierului sau administratorului societății.

Responsabil Prognoza si Avertizare,
Maria BOGDAN

