

BULETIN DE AVERTIZARE Nr. 66 din 17.06.2026

Oficiul Fitosanitar Călărași recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar la cultura de **PRUN** împotriva: **VIERMELE PRUNELOR** (*Laspeyresia f.*)

Cydia funebrana.

Viermele prunelor este un fluture care își depune ouăle primăvara pe fructele mai tinere. Omizile care sunt în nuanțe roșiatice sau rozalii penetrează în interiorul fructelor, hrănindu-se cu pulpa lor și săpând la interior galerii. Intrarea în aceste galerii este vizibilă încă de la exteriorul fructelor și se poate recunoaște după un fel de dop de gumă în nuanțe de galben transparent. La interior fructele vor fi roase de viermi. mai apoi, galeriile săpate de viermi vor deveni cavități de dimensiuni impresionante pline de excremente în apropiere de sâmburi. În primăvară, prima generație de viermi își depune ouăle la 2-3 săptămâni după înflorire. Fructele vor cădea astfel prematur din cauza lor, iar cele care sunt afectate vor lua o nuanță închisă și nu se vor mai dezvolta așa cum trebuie. Dar vor cădea și tijele sau frunzele pe care sunt ouă. A doua generație atacă fructele, respectiv prunele mari, verzi, aproape de mărimea lor normală. Larvele care eclozează rod galerii către sâmbure, în jurul căruia se dezvoltă. Acestea vor cădea și ele prematur și sunt improprii pentru consum. Pierderile sunt foarte importante pentru varietățile tardive sau semi-tardive unde pagubele provocate ajung la aproximativ 80% din recoltă.

Modul de atac:

Viermele prunelor creează galerii în fructele înfestate unde le umple cu excremente și resturi de hrană. Larvele primei generații sapă un tunel până la sâmbure consumând atât sâmburele cât și pulpa fructului. Fructele se coc prematur și cad la sol.

Larvele generației a II a formează galerii în jurul sâmburelui, garnisindu-le cu excremente și se hrănesc cu pulpa. În urma atacului, fructele se coc prematur, se stafidesc, iar unele fructe prezintă zone cu clei care astupă galeriile ca un dop.

Pentru combaterea agenților de dăunare, se recomandă folosirea unui produs de protecție a plantelor de mai jos:

1. AFFIRM OPTI

Prun	Dăunători	Viermele prunelor	2,5 kg/ha. 7 zile pauză.
------	-----------	-------------------	--------------------------

2. CORAGEN (VOLIAM)

Prun	Dăunători	Viermele prunelor	100 ml/ha. 14 zile pauză.
------	-----------	-------------------	---------------------------

3. DELTAGRI (FASTER DELTA)

Prun	Dăunători	Viermele prunelor, viespea sămburilor de prun	0,25-0,3 l/ha. 7 zile pauză.
------	-----------	---	------------------------------

4. KARATE ZEON (NINJA)

Prun	Dăunători	Viermele prunelor	0,015% (se aplică la avertizare). 7 zile pauză.
------	-----------	-------------------	--

5. DECIS 25WG

Prun	Dăunători	Viermele prunelor, afide, viespea neagră a prunelor, păduchele din San Hose	0,03 kg/ha (003%). 7 zile pauză.
------	-----------	---	----------------------------------

6. TRAPER

Prun	Dăunători	Viermele prunelor	0,6 l/ha. Se aplică la primele semne de infestare. Maxim 3 tratamente la interval de 7 zile.
------	-----------	-------------------	--

Alte recomandări:

Verificați cu mare atenție recomandările cu privire la compatibilitatea produselor atunci când intenționați să aplicați amestecuri de produse de protecție a plantelor! Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător.

Respectați cu strictețe normele de lucru cu produse de protecție a plantelor, cele de securitate a muncii, de protecție a animalelor și familiilor de albine, în conformitate cu: Legea Apiculturii nr. 383/2013, cu modificările și completările ulterioare și Ordinul 127/1991 al ACA din România, Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației, Ordinul nr. 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administrație Locală și Ordinul 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, precum și în conformitate cu Protocolul de colaborare, nr. 328432/2015, încheiat cu ROMAPIS, privind implementarea legislației în vederea protecției familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu produse pentru protecția plantelor.

Respectați prevederile Ordinului Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, nr 297/2017, privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea în siguranță a produselor de protecție a plantelor.

Respectați obligațiile ce vă revin, conform Ordinului Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerului Mediului Apelor și Pădurilor și al Președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și

pentru Siguranța Alimentelor, nr. 352/636/542015, pentru aprobarea normelor privind ecocondiționalitatea în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, cu modificările și completările ulterioare.

Responsabil Prognoză și Avertizare,
Micuț – Istrate Daniela

