

Oficiul Fitosanitar Olt
Str. Tudor Vladimirescu Nr. 165
Slatina

T +40787603972
F +40(249)436234
e-mail: ufjolt@yahoo.com
ofolt@anfof.ro




Nr.706/O/12.06.2026

BULETIN DE AVERTIZARE

Nr. __17__ din 12.06.2026


**VIERMELE PRUNELOR (*CYDIA F.*) + PATAREA ROSIE A FRUNZELOR (*POLYSTIGMA R.*) +
MONILIOZA (*MONILINIA SPP.*)**



VIERMELE PRUNELOR



MONILIOZA PRUNULUI



PATAREA ROSIE A FRUNZELOR DE PRUN

Pentru prevenirea și combaterea organismelor daunatoare: **VIERMELE PRUNELOR (*CYDIA F.*) + PATAREA ROSIE A FRUNZELOR (*POLYSTIGMA R.*) + MONILIOZA (*MONILINIA SPP.*)**

Viermele prunelor (*Cydia funebrana*) - Larvele generației I distrug mai ales sămburii la fructele verzi, care nu se mai dezvoltă și cad. Larvele generației a II - a și eventual a III - a, atacă fructele aflate în diferite faze de coacere, săpând cavități mari în jurul sămburelui, în care se găsesc resturi de hrană și excremente brune - negricioase. Fructele atacate se recunosc după prezența picăturilor de gomă, ce se scurg prin orificiul de pătrundere a larvelor. Aceste fructe se maturizează de timpuriu, apoi cad și putrezesc.

Pătarea roșie a frunzelor de prun (*Polystigma rubrum*) - Atacul se manifestă pe frunze, începând din luna mai, prin apariția unor pete aproximativ circulare, de 5 – 20 mm diametru, la început verzi – gălbui, apoi roșii – cărămizii. În dreptul petelor, țesutul frunzei este îngroșat, casant și puțin bombat spre fața inferioară a limbului. Pe fața inferioară a frunzelor, în dreptul petelor, se observă puncte mici, închise la culoare.

Monilioza (*Monilinia spp.*) - Boala afectează cu precădere florile și fructele din faza de pârgă, însă ciuperca poate ataca și ramurile și frunzele. Fructele pot fi infectate, în toate fazele de dezvoltare, mai frecvent în perioada maturizării. Fructele tinere parazitare, se zbârcesc, se brunifică și cad masiv. Pe fructele verzi sau în curs de maturizare, la locul de producere a infecției, apare o pată brună, care crește treptat și în condiții favorabile (precipitații, vreme răcoroasă), se poate extinde asupra întregului fruct.

Pentru prevenire și combatere se recomandă executarea tratamentului **IN PLANTATIILE DE PRUN** în **perioada 13- 17 iunie 2026**

Folosiți unul din produsele insecticide de mai jos, după caz:

1. **DELTAGRI / FASTER DELTA** - 0,25 – 0,3 l/ha
2. **KARATE ZEON / NINJA** – 0,015%
3. **LASER 240 SC/ (NEXSUBA - a doua denumire comerciala)- 0,6 L/ha**
4. **CORAGEN/ (VOLIAM - a doua denumire comerciala)-100 ml/ha**

Pentru combaterea bolilor tratamentul se complexează cu unul din fungicidele:

1. **ALCUPRAL 50 PU** - 2,0 kg/ha (0,2%) expira la 31/12/2025
2. **CAPTAN 80 WDG / CAIMAN** – 0,15 % (1,5 kg/ha) expira la 01/11/2025
3. **LUNA EXPERIENCE 400 SC-** 0,5 L/ha se aplica de la faza de buton alb până la coacerea deplină

sau alte produse pentru protecție a plantelor, omologate, pentru a fi utilizate pe teritoriul României.

Alte recomandări:

Verificați cu mare atenție recomandările, cu privire la compatibilitatea produselor atunci când intenționați să aplicați amestecuri de produse de protecție a plantelor!

Luati măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător!

În afara produselor de protecție a plantelor menționate mai sus se pot utiliza și altele (consultați PESTEXPERT).

Tratamentele efectuate se vor menționa în **REGISTRUL DE EVIDENȚĂ A TRATAMENTELOR CU P.P.P.**

Producătorul agricol are obligația de a numerota paginile registrului. La spatele registrului se va menționa numărul de pagini. Va pune semnătura producătorului sau a administratorului (stampila după caz). Registrul de tratamente fitosanitare cu ppp se va păstra 3 ani.

Respectați cu strictețe normele de lucru cu produse pentru protecția plantelor, normele de protecție și securitatea muncii, de protecție a albinelor și a animalelor în conformitate cu: Legea nr 383/2013 a apiculturii, cu modificările și completările ulterioare și Ordinul nr 127/1991 al ACA din România, Ordinul comun nr 45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentatiei, 15b/3404/1991 al Dep. Pentru Administrație Locală și 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, precum și cu Protocolul de colaborare nr 328432/2015, încheiat cu ROMAPIS (privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu produse pentru protecția plantelor);

Respectați prevederile Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 297/2017 privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea în siguranță a produselor de protecție a plantelor.

Respectați obligațiile ce vă revin conform Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului mediului, apelor și pădurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiționalitatea în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, cu modificările și completările ulterioare.

Responsabil Prognoza și Avertizare,

Băloii Monalisa



www.anfdf.ro