

BULETIN DE AVERTIZARE

NR. 19 din 03.07.2026

Condițiile climatice din ultima perioadă au favorizat apariția agenților fitopatogeni: făinarea (*Uncinula necator*), a manei (*Plasmopara viticola*) și a acarienilor (*Tetranychus urticae*) la vița de vie.


Făinarea (*Uncinula necator*) se manifestă în această perioadă pe frunze, lăstari și boabe și apare pe suprafața acestora sub forma unui puf albicios cu aspect pulverulent. Cea mai păgubitoare formă este cea care apare pe boabe și care crează pagube însemnate dacă nu este tratată corespunzător. Răspîndirea sporilor se face ușor cu ajutorul vîntului.

Mana (*Plasmopara viticola*) Se manifestă în această perioadă pe frunze prin apariția unor pete de culoare galben -undelemnii, iar pe fața inferioară în dreptul petelor se poate observa un puf albicios care cu timpul se brunifică.

Acarianul roșu comun (*Tetranychus urticae*) are dimensiuni între 0,3-0,6 mm .Condițiile cele mai favorabile pentru înmulțirea dăunatorului sînt îndeplinite în verile călduroase și secetoase. La început apar pe partea inferioară a frunzelor și o dată cu creșterea numărului de indivizi se extinde atacul pe ambele fețe ale frunzelor.



Plasmopara viticola



Tetranychus urticae



Uncinula necator

Efectuați tratamentul folosind unul dintre amestecurile:

1. FOLICUR SOLO 250 EW – 0,4 l/ha + AIRONE SC – 2,5 l/ha sau
2. UNIVERSALIS 593 SC - 2 l/ha sau
3. REYONA - 1 l/ha + ZORVEC VINABEL - 0,6 l/ha.

La apariția acarienilor peste pragul economic de dăunare 5-10 exemplare pe frunză se adaugă și un acaricid:

NISSORUN 10 WP – 0,5 kg/ha sau

MILBECNOK – 0,075% sau

ORTUS 5 SC – 0,5 l/ha.

La efectuarea tratamentului se mai pot utiliza și alte produse de protecție a plantelor cu efect similar omologate în România.

Perioada optimă pentru efectuarea tratamentului: 03 - 07.07.2026

La prepararea soluției, se vor respecta toate instrucțiunile de folosire, de pe eticheta produsului. De asemenea, se va verifica cu mare atenție recomandările privind compatibilitatea produselor, atunci când urmează să se facă amestecuri de produse de protecție a plantelor.

Se va respecta cu strictețe timpul de pauză înscris pe ambalaj după utilizarea fiecărui produs utilizat.

ALTE RECOMANDĂRI :

- Respectați cu strictețe normele de protecție și securitate a muncii.
- Protejați familiile de albine împotriva intoxicațiilor cu produse de protecție a plantelor conform Legii nr. 383/2013 a apiculturii, cu modificările și completările ulterioare, Ordinului nr. 127/1991 al ACA Romania, Ordinului comun nr.45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației 15b/3404/1991/ al Departamentului pentru Administrație Locală și 1786/TB/ al Ministerului Transporturilor, precum și Protocolului de colaborare nr. 328432/2015, încheiat cu ROMAPIS privind implementarea legislației.
- Verificați cu mare atenție recomandările cu privire la compatibilitatea produselor atunci când intenționați să aplicați amestecuri de produse de protecție a plantelor.
- Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător.
- Respectați obligațiile ce vă revin conform Ordinului ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, al ministrului Mediului, Apelor, și Pădurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiționalitatea în cadrul schemelor de sprijin și măsurilor de sprijin pentru fermieri în Romania cu modificările ulterioare.

Responsabil Prognoză și Avertizare
ing. Virgil Iltu

