

Hr. înreg.: 10152/10.07.20.

**MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
COMISIA NAȚIONALĂ DE AUTORIZARE
A PRODUSELOR DE PROTECȚIE A PLANTELOR**

**1. LISTA PRODUSELOR DE PROTECȚIE A PLANTELOR AUTORIZATE ÎN ȘEDINȚA
DIN DATA DE 08.06.2026**

A. AUTORIZARE

NR. CRT.	DENUMIRE PRODUS	SOLICITANT AUTORIZARE	STAT MEMBRU RAPORTOR ZONAL/ STAT MEMBRU DE REFERINȚĂ	CULTURI AUTORIZATE/ AGENȚI DE DĂUNARE/ DOZE DE APLICARE	CUVÂNT DE AVERTIZARE
AUTORIZARE ZONALĂ (art. 33-39 – Reg. (CE) nr. 1107/2009)					
ERBICIDE					
1.	CONAXIS 400 g/L dimetenamid-P + 50 g/L clomazonă	BASF SE, Germania Autorizație nr.: 1148PC/08.06.2026	SMRZ: AUSTRIA	RAPITĂ DE TOAMNĂ: Buruieni dicotiledonate anuale și monocotiledonate anuale: <i>Viola arvensis</i>, <i>Stellaria media</i>, <i>Veronica</i> sp., <i>Thlaspi arvense</i>, <i>Capsella bursa-pastoris</i>, <i>Galium aparine</i>, <i>Matricaria</i> sp., <i>Papaver rhoeas</i>, <i>Lamium purpureum</i>, <i>Polygonum convolvulus</i>, <i>Echinochloa crus-galli</i>, <i>Setaria</i> sp. 1 - 1,25 L/ha Se aplică preemergent (BBCH 00-09). SOIA, MAZĂRE DE CÂMP, MAZĂRE VERDE, BOB*, FLOAREA-SOARELUI: Buruieni dicotiledonate anuale și monocotiledonate anuale: <i>Viola arvensis</i>, <i>Stellaria media</i>, <i>Veronica</i> sp., <i>Thlaspi arvense</i>, <i>Capsella bursa-pastoris</i>, <i>Galium aparine</i>, <i>Matricaria</i> sp., <i>Papaver rhoeas</i>, <i>Lamium purpureum</i>, <i>Polygonum convolvulus</i>, <i>Echinochloa crus-galli</i>, <i>Setaria</i> sp. 1 - 1,50 L/ha Se aplică preemergent (BBCH 00-09). *Utilizări minore în România, conform Ordinului MADR nr. 200/2020 pentru care nu s-a efectuat teste de eficacitate	ATENȚIE UTILIZARE PROFESIONALĂ



2.	MAZZAM 40 SL 40 g/L imazamox	INNIGO Sp.z.o.o., Polonia Autorizație nr.: 1149PC/08.06.2026	SMRZ: POLONIA	<u>SOIA:</u> Buruieni monocotiledonate și dicotiledonate • 1-1,2 L/ha Se aplică de la faza de 2 frunze adevărate până la faza de 6 frunze desfăcute (BBCH 12-16). <u>MAZĂRE FURAJERĂ, LINTE*, BOB*, LUPIN*:</u> Buruieni monocotiledonate și dicotiledonate • 0,6 - 0,9 L/ha Se aplică de la faza de cotiledoane complet desfășurate până la faza de 6 frunze desfăcute (BBCH 10-16). <u>IN*, MAC*, SUSAN*, MUȘTAR*, SOFRAN/SOFRĂNEL*, LIMBA MIELULUI*, DOVLEAC*, CÂNEPĂ*, LUPIN*, RICIN*, BUMBAC*:</u> Buruieni monocotiledonate și dicotiledonate • 0,6 - 0,9 L/ha Se aplică de la faza de cotiledoane complet desfășurate până la faza de 8 frunze desfăcute (BBCH 10-18). <u>TUTUN*:</u> Buruieni monocotiledonate și dicotiledonate • 0,38 - 0,9 L/ha Se aplică de la faza de cotiledoane complet desfășurate până la faza de coacere deplină (BBCH 10-89). <u>RĂCHITĂ*, SALCIE ENERGERICĂ, PLANTE ORNAMENTALE:</u> Buruieni monocotiledonate și dicotiledonate • 0,38 - 0,9 L/ha Se aplică de la faza de cotiledoane complet desfășurate până la faza de coacere deplină (BBCH 10-89).	<u>ATENȚIE</u> <u>UTILIZARE PROFESIONALĂ</u>
3.	KUNTAO 475 g/L aclonifen + 105 g/L diflufenican	Globachem NV., Belgia Autorizație nr.: 1150PC/08.06.2026	SMRZ: Republica Cehă	<u>CEREALE DE TOAMNĂ (GRÂU, GRÂU DUR, ORZ, TRITICALE, SECARĂ, GRÂU SPELTĂ**):</u> Buruieni monocotiledonate și dicotiledonate anuale: (<i>Apera spica-venti</i>*, <i>Capsella bursa-pastoris</i>, <i>Galium aparine</i>*, <i>Tripleurospermum inodorum</i>*, <i>Papaver rhoeas</i>*, <i>Poa annua</i>*, <i>Stellaria media</i>, <i>Veronica hederifolia</i>*, <i>Veronica persica</i>*, <i>Viola arvensis</i>*) • 0,35 - 0,7 L/ha În funcție de gradul de îmburuienare Se aplică preemergent, după semănat până la răsărire (BBCH 00-09).	<u>ATENȚIE</u> <u>UTILIZARE PROFESIONALĂ</u>



				• 0,35 - 0,625 L/ha În funcție de gradul de îmburuienare Se aplică postemergent, când culturile de cereale se află în stadiul fenologic de 1-3 frunze (BBCH 10-13). *Specii de buruieni mult mai sensibile la dozele mai mari. **Utilizări minore conform Ordinului 200/2020 al MADR pentru care nu s-au efectuat teste.	
4.	KALIMBA MAX 200 g/L dicamba + 100 g/L fluroxipir	UPL Holdings Cooperatief U.A., Olanda Autorizație nr.: 1151PC/08.06.2026	SMRZ: Republica Cehă	PORUMB, SORG*: Buruieni dicotiledonate anuale și perene • 0,8 - 1,0 L/ha Maxim 1 tratament. Se aplică de la fenofaza de două frunze până la fenofaza de nouă frunze (BBCH 12-19). *Utilizări minore în România, conform Ordinului MADR nr. 200/2020 pentru care nu s-au efectuat teste de eficacitate.	<u>PERICOL</u> <u>UTILIZARE</u> <u>PROFESIONALĂ</u>
5.	INVESTO 100EC/ (JENOT 100EC – a doua denumire comercială) 100 g/L quizalofop-P-etil	INNIGO Sp.z.o.o., POLONIA Autorizație nr.: 313PC/10.04.2017	SMRZ: ROMÂNIA	EXTINDEREA DOMENIULUI DE UTILIZARE: FLOAREA SOARELUI: Buruieni monocotiledonate anuale și perene <i>Agropyron repens</i> <i>Echinochloa crus-galli</i> <i>Setaria glauca</i> <i>Sorghum halepense</i> din rizomi Samulastră de cereale • 0,5 - 1,0 L/ha Se aplică de la faza de 4-6 frunze (BBCH 14-16).	<u>PERICOL</u> <u>UTILIZARE</u> <u>PROFESIONALĂ</u>
6.	PENTER 125 g/L terbutilazină + 250 g/L pendimetalin	Finchimica S.p.A., Italia	SMRZ: AUSTRIA	NU SE AUTORIZEAZĂ	
7.	JANERO 480 SL 480 g/L dicamba	Albaugh TKI, Slovenia Autorizație nr.: 1152PC/08.06.2026	SMRZ: OLANDA	PORUMB PENTRU BOABE ȘI SILOZ: Buruieni dicotiledonate anuale și perene • 0,4 - 0,6 L/ha Se aplică postemergent (BBCH 12-18). (Cultura între 3 și 8 frunze). Maxim 1 tratament. PORUMB PENTRU BOABE ȘI PORUMB PENTRU SILOZ: <i>Convolvulus arvensis</i>, <i>Calystegia sepium</i>, <i>Amaranthus retroflexus</i> Buruieni dicotiledonate perene • 0,4 L/ha prima aplicare • 0,2 L/ha a doua aplicare	<u>ATENȚIE</u> <u>UTILIZARE</u> <u>PROFESIONALĂ</u>



				Se aplică postemergent. Prima aplicare: (BBCH 12-16). (Cultura între 2 și 6 frunze). A doua aplicare: (BBCH 18-20) (Cultura între 8 și 9 sau mai multe frunze). Maxim 2 tratamente la interval de 7 zile între tratamente. SORG*: Buruieni dicotiledonate anuale și perene • 0,3 - 0,4 L/ha Se aplică postemergent (BBCH 12-16). (Cultura între 2 și 6 frunze). Maxim 1 tratament. PORUMB ZAHARAT*: Buruieni dicotiledonate anuale și perene • 0,4 - 0,6 L/ha Se aplică postemergent (BBCH 12-18). (Cultura între 2 și 6 frunze). Maxim 1 tratament. *Utilizări minore în România, conform Ordinului MADR nr. 200/2020 pentru care nu s-au efectuat teste de eficacitate.	
--	--	--	--	---	--

INSECTICIDE

1.	FORTENZA 600 FS 600 g/L ciantraniliprol	Syngenta Agro SRL, România Autorizație nr.: 855PC/25.04.2023	SMRZ: POLONIA + ROMÂNIA	EXTINDEREA DOMENIULUI DE UTILIZARE: PORUMB: <i>Agriotes</i> spp. <i>Tanymericus</i> sp. • 37,5 mL/50000 semințe PORUMB ZAHARAT: <i>Tanymericus</i> sp. • 37,5 mL / 50000 semințe	ATENȚIE UTILIZARE PROFESIONALĂ ȘI NEPROFESIONALĂ
2.	CARPOVIRUSINE MAX 1x10 ¹³ CpGV-M/L <i>Cydia pomonella</i> Granulovirus M (CpGV)	UPL Holdings Cooperatief U.A., Olanda Autorizație nr.: 1153PC/08.06.2026	SMRZ: BELGIA	MĂR: <i>Cydia pomonella</i> • 0,1 L / hL* sau 1 L /ha Se aplică de la începutul formării fructelor până la maturare (BBCH 71-89). <i>Cydia molesta</i> • 0,1 L / hL* sau 1 L /ha Se aplică de la începutul formării lăstarilor până la maturarea fructelor (BBCH 31-89).	UTILIZARE PROFESIONALĂ



			PĂR**: <i>Cydia pomonella</i> • 0,1 L / hL* sau 1 L /ha Se aplică de la începutul formării fructelor până la maturare (BBCH 71-89). <i>Cydia molesta</i> • 0,1 L / hL* sau 1 L /ha Se aplică de la începutul formării lăstarilor până la maturarea fructelor (BBCH 31-89). GUTUI**: <i>Cydia pomonella</i> • 0,1 L / hL* sau 1 L /ha Se aplică de la începutul formării fructelor până la maturare (BBCH 71-89). <i>Cydia molesta</i> • 0,1 L / hL* sau 1 L /ha Se aplică de la începutul formării lăstarilor până la maturarea fructelor (BBCH 31-89). SÂMBUROASE (PIERSIC**, CAIS**, NECTARIN**): <i>Cydia pomonella</i> • 0,1 L / hL* sau 1 L /ha Se aplică de la începutul formării fructelor până la maturare (BBCH 71-89). <i>Cydia molesta</i> • 0,1 L / hL* sau 1 L /ha Se aplică de la începutul formării lăstarilor până la maturarea fructelor (BBCH 31-89). NUC**: <i>Cydia pomonella</i> • 0,1 L / hL* sau 1 L /ha Se aplică de la începutul formării fructelor până la maturare (BBCH 71-89). *Corespunde la 1 L/ha cu un volum de pulverizare de 1000 L. **Utilizări minore în România, conform Ordinului MADR nr. 200/2020 pentru care nu s-au efectuat teste de eficacitate.	
--	--	--	---	--



3.	CARPOVIRUSINE ULTRA 1x10 ¹³ CpGV-M/L <i>Cydia pomonella</i> Granulovirus M (CpGV)	UPL Holdings Cooperatief U.A., Olanda Autorizație nr.: 1154PC/08.06.2026	SMRZ: BELGIA	MĂR: <i>Cydia pomonella</i> • 0,1 L / hL* sau 1 L /ha Se aplică de la începutul formării fructelor până la maturare (BBCH 71-89). <i>Cydia molesta</i> • 0,1 L / hL* sau 1 L /ha Se aplică de la începutul formării lăstarilor până la maturarea fructelor (BBCH 31-89). PĂR**: <i>Cydia pomonella</i> • 0,1 L / hL* sau 1 L /ha Se aplică de la începutul formării fructelor până la maturare (BBCH 71-89). <i>Cydia molesta</i> • 0,1 L / hL* sau 1 L /ha Se aplică de la începutul formării lăstarilor până la maturarea fructelor (BBCH 31-89). GUTUI**: <i>Cydia pomonella</i> • 0,1 L / hL* sau 1 L /ha Se aplică de la începutul formării fructelor până la maturare (BBCH 71-89). <i>Cydia molesta</i> • 0,1 L / hL* sau 1 L /ha Se aplică de la începutul formării lăstarilor până la maturarea fructelor (BBCH 31-89). SÂMBUROASE (PIERSIC**, CAIS**, NECTARIN**): <i>Cydia pomonella</i> • 0,1 L / hL* sau 1 L /ha Se aplică de la începutul formării fructelor până la maturare (BBCH 71-89). <i>Cydia molesta</i> • 0,1 L / hL* sau 1 L /ha Se aplică de la începutul formării lăstarilor până la maturarea fructelor (BBCH 31-89).	UTILIZARE PROFESIONALĂ
----	--	--	-------------------------------	---	-------------------------------



				NUC**: <i>Cydia pomonella</i> • 0,1 L / hL* sau 1 L /ha Se aplică de la începutul formării fructelor până la maturare (BBCH 71-89). *Correspunde la 1 L/ha cu un volum de pulverizare de 1000 L. **Utilizări minore în România, conform Ordinului MADR nr. 200/2020 pentru care nu s-au efectuat teste de eficacitate.	
4.	MOSPILAN MIZU 120 g/L acetamiprid	Nisso Chemical Europe GmbH, Germany Autorizație nr.: 857PC/25.04.2023	SMRZ: POLONIA	EXTINDEREA DOMENIULUI DE UTILIZARE: PORUMB PENTRU NUTRET, PORUMB PENTRU SILOZ, PORUMB PENTRU BOABE: <i>Diabrotica virgifera virgifera</i> • 0,35 L/ha Se aplică de la apariția staminelor până la sfârșitul înfloritului (BBCH 61-69) Maxim 1 tratament. ORZ DE TOAMNĂ, ORZ DE PRIMĂVARĂ: <i>Oulema melanopus</i> • 0,35 L/ha Se aplică de la apariția frunzei steag-conținutul boabelor moale, dar uscat (BBCH 40-85). Maxim 2 tratamente la interval de 14 zile între tratamente. FLOAREA SOARELUI: <i>Aphis fabae,</i> <i>Brachycaudus helichrysi</i> • 0,35 L/ha Se aplică de la apariția primelor 2 frunze până când inflorescența este încă închisă (BBCH 12-59). Maxim 1 tratament. SOIA: <i>Vanessa cardui,</i> <i>Helicoverpa armigera</i> • 0,40 L/ha Se aplică de la apariția primilor boboci deschiși până la primele păstăi vizibile (BBCH 55-80). Maxim 1 tratament. SFECLĂ DE ZAHĂR: <i>Myzus persicae, Aphis fabae</i> • 0,40 L/ha Se aplică de la apariția primei perechi de frunze până când rădăcina are dimensiunea recoltabilă (BBCH 12-49). Maxim 1 tratament.	PERICOL UTILIZARE PROFESIONALĂ



				CARTOF: <i>Myzus persicae</i> , <i>Aphis fabae</i> <i>Aphis nasurtii</i> , <i>Macrosiphum euphorbiae</i> • 0,35 L/ha Se aplică de la formarea lăstarilor bazali până când semințele sunt încă verzi (BBCH 20-89). Maxim 1 tratament. <i>Leptinotarsa decemlineata</i> • 0,20 L/ha Se aplică de la formarea lăstarilor bazali până când semințele sunt încă verzi (BBCH 20-89). Maxim 1 tratament.	
5.	KANEMITE SC 164 g/L acequinocil	Summit Agro România SRL Autorizație nr.: 170PC/16.03.2016	SMRZ: UNGARIA	EXTINDEREA DOMENIULUI DE UTILIZARE: PORUMB (SEMINTE PENTRU ÎNSĂMÂNTARE): <i>Tetranychus urticae</i> • 0,45 - 0,75 L/ha Se aplică o singură dată, la apariția simptomelor de atac (BBCH>21).	ATENȚIE UTILIZARE PROFESIONALĂ
6.	TECORLA 51,7 g/L clorantiraniliprol	FMC Agro Operational Romania SRL Autorizație nr.: 1155PC/08.06.2026	SMRZ: BELGIA	MĂR, PĂR*, GUTUI*, MOȘMON*: <i>Cydia pomonella</i> , <i>Phyllonorycter blancardella</i> , <i>Phyllonorycter corylifoliella</i> , <i>Adoxophyes orana</i> , <i>Argyrotaenia pulchellana</i> , <i>Leucoptera scitella</i> , <i>Grapholita molesta</i> , <i>Archips rosana</i> • 0,7 - 1,05 L/ha (0,48 L/ha LWA- suprafața peretelui foliar) Se aplică după înflorire până la maturitatea fructelor (BBCH 71-87). Maxim 1 tratament/an. 0,7 L/ha aplicare la 2 ani 1,05 L/ha aplicare la 3 ani PIERSIC*, CAIS*, MIGDAL*: <i>Cydia molesta</i> , <i>Anarsia lineatella</i> • 0,7 - 1,05 L/ha (0,48 L/ha LWA- suprafața peretelui foliar) Se aplică după înflorire până la maturitatea fructelor (BBCH 71-87). Maxim 1 tratament/an. 0,7 L/ha aplicare la 2 ani 1,05 L/ha aplicare la 3 ani VITĂ DE VIE: <i>Lobesia botrana</i> , <i>Eupoecilia ambiguella</i> , <i>Agryrotaenia pulchenella</i> • 0,84 L/ha (0,5 L/ha LWA- suprafața peretelui foliar) Se aplică la stadiile de dezvoltare post-înflorire (BBCH 70-83) pentru a se asigura protecția albinelor și a altor insecte polenizatoare. BBCH 70 - toate florile s-au scuturat.	ATENȚIE UTILIZARE PROFESIONALĂ



BBCH 83 - boabele de struguri încep să dezvolte culoarea (începe coacerea).
1 aplicare la 3 ani.

**TELINĂ*, PĂSTÂRNAC*,
PĂTRUNJEL* (RĂDĂCINĂ),
ASMĂTUI*, BARABOI:**

Psila rosae

- 0,7 L/ha

Se aplică din momentul în care rădăcinile au ajuns la forma și dimensiunea tipică soiului până la maturitatea deplină (BBCH 41-89).

1 tratament cu aplicare anuală sau 2 tratamente cu aplicare la 3 ani.

Nu se utilizează pe terenuri drenate. Atunci când culturile se utilizează pentru consum se aplică până înainte de apariția inflorescențelor (BBCH 49) iar pentru culturile destinate producerii de sămânță până la maturitatea deplină (BBCH 89).

14 zile intervalul între două aplicări.

**TELINĂ*, PĂSTÂRNAC*,
PĂTRUNJEL* (RĂDĂCINĂ),
ASMĂTUI*, BARABOI*:**

Lepidoptere

(ex. : *Aethes williana*, *Mamestra brassicae*, *Agrotis segetum*)

- 0,6 L/ha

Se aplică din faza de 5 frunze ale culturii până la maturitatea deplină (BBCH 15-89).

1 tratament cu aplicare la 2 ani.

Nu se utilizează pe terenuri drenate. Atunci când culturile se utilizează pentru consum se aplică până la BBCH 49, iar pentru culturile destinate producerii de sămânță până la BBCH 89.

**VARZĂ (ALBĂ, ROSIE, CREATĂ,
CHINEZEASCĂ), CONOPIDĂ*,
BROCCOLI*:**

Mamestra brassicae, *Plutella xylostella*, *P. maculipennis*, *Pieris brassicae*, *Pieris rapae*, *Evergestis forficalis*, *Clepsis spectrana*

- 0,5 L/ha

Se aplică de la începutul formării căpățânilor până la formarea completă a acestora (BBCH 41-49).

1 tratament cu aplicare anuală sau 2 tratamente cu aplicare la 2 ani.

Atunci când se aplică la 2 ani nu se utilizează pe terenuri drenate.

14 zile intervalul între două aplicări.

**PORUMB (BOABE, SILOZ)
PORUMB ZAHARAT*:**

Ostrinia nubilalis

Helicoverpa armigera

- 0,5 L/ha



				Se aplică de la înfrățire-până la mijlocul apariției paniculului (BBCH 20-55). 1 aplicare anuală. PORUMB (BOABE, SILOZ), PORUMB ZAHARAT*: <i>Ostrinia nubilalis</i> <i>Helicoverpa armigera</i> • 0,5 L/ha Se aplică de la începutul apariției paniculului până la maturitatea fiziologică (BBCH 51-87). 1 aplicare anuală sau 2 tratamente cu aplicare la 2 ani. 14 zile intervalul între două aplicări. CARTOF: <i>Leptinotarsa decemlineata</i> • 0,2 L/ha Se aplică din momentul în care plantele acoperă complet terenul până la sfârșitul înfloririi (BBCH 31-69). Maxim 1 tratament/an. NUC*: <i>Cydia pomonella</i> <i>Hyphantria cunea</i> • 0,7-1,05 L/ha (0,48 L/ha LWA-suprafața peretelui foliar) Se aplică după înflorire până la maturitatea fructelor (BBCH 71-87); 1 tratament/an. 0,7 L/ha aplicare la 2 ani 1,05 L/ha aplicare la 3 ani Utilizări minore în România, conform Ordinului MADR nr. 200/2020 pentru care nu s-au efectuat teste de eficacitate.	
--	--	--	--	---	--

FUNGICIDE

1.	LEGADO/ (DIAGONAL - a doua denumire comercială) 250 g/L azoxistrobin	Albaugh TKI d.o.o., Slovenia Autorizație nr.: 394PC/28.02.2018	SMRZ: AUSTRIA	EXTINDEREA DOMENIULUI DE UTILIZARE: CARTOF: <i>Alternaria solani</i> • 0,5 L/ha Se aplică de la apariția primei inflorescențe până când fructele primei infrutescente au culoare maronie (BBCH 51-85). CARTOF: <i>Rhizoctonia solani</i> • 3 L/ha Se aplică pe rând (BBCH 00). SECARĂ: <i>Puccinia recondita</i> <i>Rhynchosporium secalis</i> • 1 L/ha Se aplică de la apariția primului nod până la sfârșitul înfloririi (BBCH 31-69).	ATENȚIE UTILIZARE PROFESIONALĂ
----	---	---	-------------------------	---	--



				TRITICALE: <i>Puccinia recondita</i> <i>Rhynchosporium secalis</i> • 1 L/ha Se aplică de la apariția primului nod până la sfârșitul înfloririi (BBCH 31-69). RAPITĂ DE TOAMNĂ: <i>Alternaria</i> sp., <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> • 1 L/ha Se aplică de la începutul înfloriturii până la înflorire completă (BBCH 60-67). MAZĂRE VERDE: <i>Ascochyta pisi</i>, <i>Ascochyta fabae</i>, <i>Uromyces</i> spp. • 0,8 - 1 L/ha Se aplică de la 7 frunze desfăcute-20% păstăi au lungimea tipică (BBCH 17-72). FASOLE VERDE: <i>Ascochyta pisi</i>, <i>Ascochyta fabae</i>, <i>Uromyces</i> spp., <i>Stemphylium sarciniforme</i> • 0,8 - 1 L/ha Se aplică de la apariția primilor lăstari vizibili-boabe vizibile în păstaie (BBCH 20-79). BOB: <i>Ascochyta pisi</i>, <i>Ascochyta fabae</i>, <i>Uromyces</i> spp., <i>Stemphylium sarciniforme</i> • 0,8 - 1 L/ha Se aplică de la apariția primilor lăstari vizibili-boabe vizibile în păstaie (BBCH 20-79).	
2.	SCALA 400 g/L pirimetanil	BASF AGRO BV, Arnhem (NL), Freienbach Branch, Elvetia Autorizație nr.: 601PC/30.06.2020	SMRZ: POLONIA	EXTINDEREA DOMENIULUI DE UTILIZARE: PIERSIC*, CAIS*, NECTARIN: <i>Monilinia</i> spp. • 1,5 L/ha sau 1 L / 10000 m² LWA (LWA=Suprafața peretelui foliar) A nu se depăși doza de 1,5 L/ha atunci când se aplică în funcție de LWA, chiar dacă LWA este mai mare de 15000 m². CIREȘ, PRUN: <i>Monilinia</i> spp. • 1,5 L/ha sau 1 L / 10000 m² LWA (LWA=Suprafața peretelui foliar)	UTILIZARE PROFESIONALĂ



				A nu se depăși doza de 1,5 L/ha atunci când se aplică în funcție de LWA, chiar dacă LWA este mai mare de 15000 m². Utilizări minore în România, conform Ordinului MADR nr. 200/2020 pentru care nu s-au efectuat teste de eficacitate.	
3.	SERCADIS 300 g/L fluxaproxad	BASF SE, Germania Autorizație nr.: 339PC/28.08.2017	SMRZ: POLONIA	<u>EXTINDEREA DOMENIULUI DE UTILIZARE:</u> <u>PRUN:</u> <i>Monilinia spp.</i> • 0,3 L/ha (0,2 L/10000 m ² perete foliar) Se aplică de la faza de sepale deschise: vârfurile petalelor vizibile, flori unice cu petale alb sau roz (încă închise) și până la faza de fructe coapte care au gustul și fermitatea tipică (BBCH 57-89). <u>PIERSIC, CIRES, CAIS*, NECTARIN*:</u> <i>Monilinia spp.</i> • 0,3 L/ha (0,2 L/10000 m ² perete foliar) Se aplică de la faza de sepale deschise: vârfurile petalelor vizibile, flori unice cu petale alb sau roz (încă închise) și până la faza de fructe coapte care au gustul și fermitatea tipică (BBCH 57-89). Utilizări minore în România, conform Ordinului MADR nr. 200/2020 pentru care nu s-au efectuat teste de eficacitate.	ATENȚIE <u>UTILIZARE PROFESIONALĂ</u>
4.	LUNA SENSATION 500 SC 250 g/L fluopiram + 250 g/L trifloxistrobin	BAYER SRL, România Autorizație nr.: 547PC/20.11.2019	SMRZ: AUSTRIA	<u>EXTINDEREA DOMENIULUI DE UTILIZARE:</u> <u>CAIS, PIERVIC, NECTARIN:</u> <i>Podosphaera pannosa</i> • 0,3 L/ha Se aplică de la apariția mugurilor flori până la coacerea deplină a fructelor (BBCH 55-87). <u>CIRES, VISIN*:</u> <i>Blumeriella jaapii</i> • 0,3 L/ha Se aplică de la apariția mugurilor flori până la coacerea deplină a fructelor (BBCH 55-87). <u>PIERSIC, NECTARIN:</u> <i>Taphrina deformans</i> • 0,3 L/ha Se aplică 2 tratamente: Primul: Înainte de înflorit până la faza de buton verde (BBCH 51-55). Al-2-lea: De la faza de buton verde până la începutul coacerii (55-73).	ATENȚIE <u>UTILIZARE PROFESIONALĂ</u>



				TELINĂ*: <i>Leveillula taurica</i> • 0,6 L/ha Se aplică de la începutul dezvoltării rădăcinilor și până la dezvoltarea completă a rădăcinilor (BBCH 41-49). *Utilizări minore în România, conform Ordinului MADR nr. 200/2020 pentru care nu s-au efectuat teste de eficacitate.	
5.	AMISTAR PRIME 150 g/L azoxistrobin + 280 g/L fenpropidin	Syngenta Agro SRL, România Autorizație nr.: 1156PC/08.06.2026	SMRZ: Republica Cehă	GRÂU (PRIMĂVARĂ, TOAMNĂ): <i>Zymoseptoria (Septoria) tritici</i> <i>Puccinia recondita</i> <i>Puccinia striiformis f.sp. tritici</i> <i>Pyrenophora tritici repentis</i> <i>Blumeria graminis</i> • 0,75 -1 L/ha ORZ (PRIMĂVARĂ, TOAMNĂ): <i>Rhynchosporium secalis</i> <i>Pyrenophora teres, Puccinia hordei</i> <i>Blumeria graminis</i> • 0,75 -1 L/ha SECARĂ* (PRIMĂVARĂ, TOAMNĂ): <i>Rhynchosporium secalis</i> <i>Puccinia recondita</i> <i>Blumeria graminis</i> • 0,75 -1 L/ha TRITICALE * (PRIMĂVARĂ, TOAMNĂ): <i>Zymoseptoria (Septoria) tritici</i> <i>Puccinia recondita</i> <i>Puccinia striiformis</i> <i>Blumeria graminis</i> <i>Rhynchosporium secalis</i> • 0,75 -1 L/ha GRÂU SPELTA*: <i>Zymoseptoria (Septoria) tritici</i> <i>Puccinia recondita</i> <i>Puccinia striiformis f.sp. tritici</i> <i>Pyrenophora tritici repentis</i> <i>Blumeria graminis</i> • 0,75 -1 L/ha GRÂU DURUM*: <i>Zymoseptoria (Septoria) tritici</i> <i>Puccinia recondita</i> <i>Puccinia striiformis f.sp. tritici</i> <i>Pyrenophora tritici repentis</i> <i>Blumeria graminis</i> • 0,75 -1 L/ha *Utilizări minore în România, conform Ordinului MADR nr. 200/2020 pentru care nu s-au efectuat teste de eficacitate.	ATENȚIE UTILIZARE PROFESIONALĂ



6.	ELANVY 66,7 g/L mefentrifluconazol + 100 g/L azoxistrobin	BASF Agro B.V., Arnhem (NL) – Freienbach Branch, Elveția Autorizație nr.: 1157PC/08.06.2026	SMRZ: AUSTRIA	<u>GRÂU DE TOAMNĂ, GRÂU DURUM*, GRÂU SPELTA*:</u> <i>Zymoseptoria tritici</i>, <i>Puccinia triticina</i>, <i>Puccinia striiformis</i>, <i>Pyrenophora tritici-repentis</i> • 1 - 1,5 L/ha Se aplică de la începutul alungirii tulpinii până la sfârșitul înfloritului (BBCH 30-69). <u>ORZ DE TOAMNĂ, ORZ DE PRIMĂVARĂ:</u> <i>Pyrenophora teres</i>, <i>Puccinia hordei</i>, <i>Blumeria graminis</i> • 1 - 1,5 L/ha Se aplică de la începutul alungirii tulpinii până la sfârșitul înfloritului (BBCH 30-69). <u>SECARĂ DE TOAMNĂ, SECARĂ DE PRIMĂVARĂ:</u> <i>Rhynchosporium secalis</i>, <i>Puccinia recondita</i> • 1 - 1,5 L/ha Se aplică de la începutul alungirii tulpinii până la sfârșitul înfloritului (BBCH 30-69). <u>TRITICALE DE TOAMNĂ, TRITICALE DE PRIMĂVARĂ:</u> <i>Septoria spp.</i>, <i>Puccinia recondita</i>, <i>Puccinia striiformis</i>, <i>Blumeria graminis</i> • 1 - 1,5 L/ha Se aplică de la începutul alungirii tulpinii până la sfârșitul înfloritului (BBCH 30-69). *Utilizări minore în România, conform Ordinului MADR nr. 200/2020 pentru care nu s-au efectuat teste de eficacitate.	<u>ATENȚIE</u> <u>UTILIZARE PROFESIONALĂ</u>
7.	DYLLIS 250 g/L protioconazol	Indofil Industries (Netherlands) BV Autorizație nr.: 1158PC/08.06.2026	SMRZ: POLONIA	<u>GRÂU DE TOAMNĂ, GRÂU DE PRIMĂVARĂ:</u> <i>Septoria tritici</i>, <i>Mycosphaerella graminicola</i>, <i>Puccinia triticina</i>, <i>Puccinia striiformis</i>, <i>Fusarium sp.</i>, <i>Erysiphe graminis</i> • 0,8 L/ha Se aplică de la fenofaza de cinci frunze vizibile până la sfârșitul înfloririi (BBCH 25-69). Maxim 2 tratamente la interval de 14 zile între tratamente. <u>ORZ DE TOAMNĂ, ORZ DE PRIMĂVARĂ:</u> <i>Ramularia collo-cygni</i>, <i>Rhynchosporium secalis</i>, <i>Pyrenophora teres</i>, <i>Puccinia hordei</i>, <i>Erysiphe graminis</i>, <i>Fusarium sp.</i> • 0,8 L/ha	<u>ATENȚIE</u> <u>UTILIZARE PROFESIONALĂ ȘI NEPROFESIONALĂ</u>



				Se aplică de la fenofaza de cinci frați vizibili până la sfârșitul înfloririi (BBCH 25-69). Maxim 2 tratamente la interval de 14 zile între tratamente. <u>SECARĂ DE TOAMNĂ*</u> <u>SECARĂ DE PRIMĂVARĂ*</u> : <i>Rhynchosporium secalis</i>, <i>Puccinia recondita</i>, <i>Erysiphe graminis</i>, <i>Mycosphaerella graminicola</i>, <i>Fusarium sp.</i> • 0,8 L/ha Se aplică de la fenofaza de cinci frați vizibili până la sfârșitul înfloririi (BBCH 25-69). Maxim 2 tratamente la interval de 14 zile între tratamente. <u>TRITICALE DE TOAMNĂ*</u> <u>TRITICALE DE PRIMĂVARĂ*</u>: <i>Septoria tritici/ Mycosphaerella graminicola</i>, <i>Puccinia recondita</i> <i>Erysiphe graminis</i>, <i>Fusarium sp.</i> • 0,8 L/ha Se aplică de la fenofaza de cinci frați vizibili până la sfârșitul înfloririi (BBCH 25-69). Maxim 2 tratamente la interval de 14 zile între tratamente. <u>RAPIDĂ:</u> <i>Sclerotinia sclerotiorum</i>, <i>Leptosphaeria maculans</i> <i>L. biglobosa</i>, <i>Alternaria brassicae</i> • 0,7 L/ha Se aplică de la fenofaza fără lăstari laterali până la începutul coacerii (BBCH 20-80). Maxim 1 tratament. *Utilizări minore în România, conform Ordinului MADR nr. 200/2020 pentru care nu s-au efectuat teste de eficacitate.	
8.	JOUST / (ARES - a doua denumire comercială) 250 g/L protioconazol	Nufarm România SRL Autorizație nr.: 906PC/07.03.2024	SMRZ: POLONIA	<u>EXTINDEREA DOMENIULUI DE UTILIZARE:</u> NU SE AUTORIZEAZĂ UTILIZAREA LA CULTURA DE GRÂU DE TOAMNĂ.	
9.	CORTINA 400 g/L protioconazol	Sipcam Oxon S.p.A., Italia Autorizație nr.: 1159PC/08.06.2026	SMRZ: POLONIA	<u>GRÂU DE TOAMNĂ:</u> <i>Puccinia recondita</i> , <i>Puccinia striiformis</i> , <i>Septoria tritici</i> • 0,4-0,5 L/ha Se aplică preventiv sau imediat la primele semne de boală, în primăvară de la sfârșitul înfrățirii până la sfârșitul etapei de înflorire (BBCH 29-69). Maxim 2 tratamente la interval de 14 zile între tratamente. <i>Fusarium spp.</i> • 0,4-0,5 L/ha Se aplică de la începutul etapei de înflorire (primele antere vizibile) până la sfârșitul etapei de înflorire (BBCH 61-69). Maxim 2 tratamente la interval de 14 zile între tratamente.	<u>ATENȚIE</u> <u>UTILIZARE PROFESIONALĂ</u>



ORZ DE TOAMNĂ,
ORZ DE PRIMĂVARĂ:

Pyrenophora teres,
Rhynchosporium secalis

- 0,4-0,5 L/ha

Se aplică preventiv sau imediat la primele semne de boală, de la începutul alungirii tulpinii până la sfârșitul etapei de dezvoltare a urechișelor în teaca frunzei (BBCH 30-49).

Maxim 2 tratamente la interval de 14 zile între tratamente.

RAPITĂ DE TOAMNĂ,
RAPITĂ DE PRIMĂVARĂ:

Sclerotinia spp.

- 0,35-0,45 L/ha

Se aplică preventiv sau imediat la primele semne de boală, de la începutul etapei de înflorire, până la sfârșitul etapei de înflorire (BBCH 61-69).

Maxim 1 tratament.

SFECLĂ DE ZAHĂR:

Cercospora beticola,
Erysiphe betae

- 0,3-0,4 L/ha

Se aplică preventiv sau imediat la primele semne de boală, de la acoperirea completă a culturii (frunzele acoperă 90% din sol) până la stadiul în care rădăcina a atins dimensiunea recoltabilă (BBCH 39-49).

Maxim 2 tratamente la interval de 14 zile între tratamente.

MORCOV, PĂSTÂRNAC*,
PĂTRUNJEL DE RĂDĂCINĂ*:

Alternaria dauci,
Erysiphe heraclei

- 0,5 L/ha

Se aplică preventiv sau imediat la primele semne de boală, de la începutul dezvoltării părților vegetale recoltabile, până la stadiul în care rădăcina atinge 60% din diametrul așteptat (BBCH 41-46).

Maxim 2 tratamente la interval de 21 zile între tratamente.

SFECLĂ ROSIE*:

Cercospora beticola,
Erysiphe betae

- 0,4 L/ha

Se aplică preventiv sau imediat la primele semne de boală, de la începutul dezvoltării părților vegetale recoltabile, până la stadiul în care rădăcina atinge 60% din diametrul așteptat (BBCH 41-46).

Maxim 2 tratamente la interval de 21 zile între tratamente.



				HREAN*, GULIE FURAJERĂ*, NAPI*, SCORTONERA*: <i>Alternaria dauci, Erysiphe crucifearum, Sclerotinia spp.</i> • 0,5 L/ha Se aplică preventiv sau imediat la primele semne de boală, de la începutul dezvoltării părților vegetale recoltabile, până la stadiul în care rădăcina atinge 60% din diametrul așteptat (BBCH 41-46). Maxim 2 tratamente la interval de 21 zile între tratamente. *Utilizări minore în România, conform Ordinului MADR nr. 200/2020 pentru care nu s-au efectuat teste de eficacitate.	
10.	SUBSTRAL SAPROL NATUREN ULTRA 200 g/L sulf	Evergreen Garden Care Poland Sp. z.o.o., Polonia Autorizație nr.: 1160PC/08.06.2026	SMRZ: GERMANIA	PLANTE ORNAMENTALE (CÂMP ȘI SPAȚII PROTEJATE): <i>Sphaerotheca spp., Erysiphe spp.</i> • 12 ml/10 mp (12 L/ha) plante până la 50 cm înălțime • 20 ml/10 mp (20 L/ha) plante între 50 -125 cm înălțime TRANDAFIR (CÂMP): <i>Diplocarpon rosae, Phragmidium mucronatum</i> • 12 ml/10 mp (12 L/ha) plante până la 50 cm înălțime • 20 ml/10 mp (20 L/ha) plante între 50 -125 cm înălțime	ATENȚIE UTILIZARE PROFESIONALĂ
11.	STARJET 250 SC 250 g/L azoxistrobin	QEMETICA Agricultural Solutions Poland S.A., Polonia Autorizație nr.: 1161PC/08.06.2026	SMRZ: GERMANIA	RAPITĂ: <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> • 1 L/ha Se aplică din primăvară la începutul infestării sau când primele simptome devin vizibile (BBCH 60-69). Maxim 2 tratamente/cultură/ sezon. <i>Alternaria spp., Leptosphaeria maculans</i> • 1 L/ha Se aplică din primăvară la începutul infestării sau când primele simptome devin vizibile (BBCH 30-69). Maxim 2 tratamente/cultură/ sezon. GRÂU, GRÂU DURUM, GRÂU SPELTA: <i>Puccinia recondita</i> • 1 L/ha Se aplică din primăvară la începutul infestării sau când primele simptome devin vizibile (BBCH 30-69). Maxim 2 tratamente/cultură/ sezon. ORZ: <i>Puccinia hordei Rhynchosporium secalis</i> • 1 L/ha	ATENȚIE UTILIZARE PROFESIONALĂ



				Se aplică din primăvară la începutul infestării sau când primele simptome devin vizibile (BBCH 30-69). Maxim 2 tratamente/cultură/ sezon. *Utilizări minore în România, conform Ordinului MADR nr. 200/2020 pentru care nu s-au efectuat teste de eficacitate.	
12.	SERENADE SOIL ACTIV Bacillus amyloliquefaciens QST 713: 88,59% (w/v) (spori +reziduuri de fermentație și apă), min. $3,0 \times 10^{13}$ CFU/L	BAYER SRL, România Autorizație nr.: 1162PC/08.06.2026	SMRZ: BELGIA	CARTOF: <i>Rhizoctonia solani</i> • 1,0 - 2,0 L/ha Se aplică de la semănat până la apariția celei de-a treia frunză adevărată (BBCH 00-13). Maxim 1 tratament/cultură/sezon. Aplicare în brazdă. <i>Rhizoctonia solani</i> • 1,0 - 2,0 L/ha Se aplică de la semănat până la apariția celei de-a noua frunză adevărată (BBCH 00-19). Maxim 1 tratament/cultură/sezon. Se aplică prin pulverizare sau picurare. <u>CIRES*, VISIN*, CAIS*, PIERSIC*, NUC*, AFIN * COACĂZ NEGRU*, COACĂZ ROȘU*:</u> <i>Rhizoctonia solani</i> • 1,0 - 2,0 L/ha Se aplică de la stadiul de repaus până la la stadiul când prima frunză este complet dezvoltată. Maxim 2 tratamente/cultură/sezon la interval de 21 zile între tratamente. Aplicare la sol sau picurare. <u>LOBODĂ ROSIE*, SALATĂ*, CRESON*, SPANAC*, VALERIANĂ*:</u> <i>Rhizoctonia solani</i> • 1 mL/mp Se aplică de la semănat până la apariția celei de-a noua frunză adevărată (BBCH 00-19). Maxim 2 tratamente/cultura/sezon la interval de 21 zile între tratamente. Aplicare prin picurare. • 1 - 2 L/ha Se aplică de la semănat până la apariția celei de-a noua frunză adevărată (BBCH 00-19). Maxim 2 tratamente/cultura/sezon la interval de 21 zile între tratamente. Aplicare prin picurare sau stropire la nivelul solului. <u>PEPENE GALBEN*, ZUCCHINI*:</u> <i>Rhizoctonia solani</i> • 1 tratament: 1 mL/mp	UTILIZARE PROFESIONALĂ



			Se aplică de la semănat până la apariția celei de-a noua frunză adevărată (BBCH 00-19). Maxim 3 tratamente/cultura/sezon la interval de 21 zile între tratamente. Aplicare drench (la nivelul solului) – răsadnițe. • 2 tratamente: 1 - 2 L/ha Se aplică de la semănat până la apariția celei de-a noua frunză adevărată (BBCH 00-19). Maxim 3 tratamente/cultura/sezon la interval de 21 zile între tratamente. Aplicare prin picurare sau stropire. VINETE*: <i>Rhizoctonia solani</i> • 1 tratament: 1 mL/mp Se aplică de la semănat până la apariția celei de-a noua frunză adevărată (BBCH 00-19). Maxim 3 tratamente/cultura/sezon la interval de 21 zile între tratamente. Aplicare drench (la nivelul solului) – răsadnițe. • 2 tratamente: 1 - 2 L/ha Se aplică de la semănat până la apariția celei de-a noua frunză adevărată (BBCH 00-19). Maxim 3 tratamente/cultura/sezon la interval de 21 zile între tratamente. Aplicare prin picurare sau stropire. TELINĂ*, HREAN*, SFECLĂ*, CONOPIDĂ*, ANGHINARE*, CARTOF DULCE*, PĂSTÂRNAC*, RIDICHI*, SCORTONERA*, BARBA CAPREI* <i>Rhizoctonia solani</i> • 1-2 L/ha Se aplică de la semănat până la apariția celei de-a noua frunză adevărată (BBCH 00-19). Maxim 1-2 tratamente/cultura/sezon la interval de 21 zile între tratamente, în condiții de câmp. Pulverizare pe sol în brazdă sau aplicare pe sol. • 1-2 L/ha Se aplică de la semănat până la apariția celei de-a noua frunză adevărată (BBCH 00-19). Maxim 1-3 tratamente/cultura/sezon la interval de 21 zile între tratamente, în condiții protejate. Pulverizare pe sol în brazdă sau aplicare pe sol. *Utilizări minore în România conform Ordinului nr. 200/2020 pentru care nu s-au efectuat teste de eficacitate.	
--	--	--	---	--



13.	ELATUS ERA/ (APROVIA - a doua denumire comercială) 75 g/L benzovindiflupir + 150 g/L protriokonazol	Syngenta Agro SRL, România Autorizație nr.: 342PC/29.11.2017	SMRZ: GERMANIA	EXTINDEREA DOMENIULUI DE UTILIZARE: NĂUT*, MAZĂRE (CÂMP), LINTE*: <i>Ascochyta sp., Uromyces sp.</i> • 0,66 L/ha Maxim 1 tratament. FASOLE DE CÂMP: <i>Ascochyta sp., Uromyces sp., Botrytis sp.</i> • 0,66 L/ha Maxim 1 tratament. *Utilizări minore în România, conform Ordinului MADR nr. 200/2020 pentru care nu s-au efectuat teste de eficacitate.	ATENȚIE UTILIZARE PROFESIONALĂ
14.	PROXANIL 400 g/L propamocarb HCl + 50 g/L cimoxanil	UPL Holdings Cooperatief U.A., Olanda Autorizație nr. 423PC/05.06.2018	SMRZ: GRECIA	EXTINDEREA DOMENIULUI DE UTILIZARE: TOMATE, VINETE* (SERĂ): <i>Phytophthora infestans</i> • 2,5 L/ha CASTRAVETI, ZUCCHINI*, (SERĂ): <i>Peronospora cubensis</i> • 2,5 L/ha *Utilizări minore în România, conform Ordinului MADR nr. 200/2020 pentru care nu s-au efectuat teste de eficacitate.	ATENȚIE UTILIZARE PROFESIONALĂ

REPELENȚI

1.	VULTURE PRO 858 g/kg sulfat de amoniu și aluminiu	UBUNTU AG, Elveția Autorizație nr.: 1163PC/08.06.2026	SMRZ: PORTUGALIA	PORUMB: <i>Columba sp., Corvus sp., Phasianus colchicus</i> • 6,6 kg/ tonă Tratament sămânță FLOAREA SOARELUI: <i>Columba sp., Corvus sp., Phasianus colchicus</i> • 4,7 kg/ tonă Tratament sămânță	UTILIZARE PROFESIONALĂ
----	--	---	----------------------------	--	-----------------------------------

DESICANȚI

1.	MIZUKI 10,6 g/L pirafufen-etil	NICHINO EUROPE Co., LTD, AUSTRIA Autorizație nr.: 1027PC/31.01.2025	SMRZ: POLONIA	EXTINDEREA DOMENIULUI DE UTILIZARE: FLOAREA SOARELUI: Desicant • 2 L/ha Se aplică cu 14-21 de zile înainte de recoltarea planificată din stadiul în care partea din spate a inflorescențelor este galben-verzui, bracteele sunt încă verzi iar semintele reprezintă aproximativ 50% din masa uscată până în momentul în care plantele încep procesul de ofilire (BBCH 83-91). Maxim 1 tratament/sezon.	PERICOL UTILIZARE PROFESIONALĂ
----	--	--	-------------------------	---	---



RAPITĂ DE TOAMNĂ:

Desicant

- 2 L/ha

Se aplică cu 14-21 de zile înainte de recoltarea planificată din faza în care 30% din semințele din păstăi sunt tari și maronii până în momentul în care plantele încep procesul de ofilire (BBCH 83-91). Maxim 1 tratament/sezon.

MUSTAR PENTRU SEMINTE*:

Desicant

- 2 L/ha

Se aplică cu 14-21 de zile înainte de recoltarea planificată din faza în care 30% din semințele din păstăi sunt tari și maronii până în momentul în care plantele încep procesul de ofilire (BBCH 83-91). Maxim 1 tratament/sezon.

IN PENTRU SEMINTE*:

Desicant

- 2 L/ha

Se aplică cu 14-21 de zile înainte de recoltarea planificată din faza în care tulpinile devin galbene până la 1/3 din înălțimea lor iar păstăile încep să se îngalbenească până în momentul în care plantele încep procesul de ofilire (BBCH 83-91). Maxim 1 tratament/sezon.

CÂNEPĂ PENTRU SEMINTE*:

Desicant

- 2 L/ha

Se aplică cu 14-21 de zile înainte de recoltarea planificată din faza în care 30% din fructe (achene) sunt copate până în momentul în care dezvoltarea tulpinii este completă iar frunzele superioare sunt încă verzi (BBCH 83-91). Maxim 1 tratament/sezon.

MAC PENTRU SEMINTE*:

Desicant

- 2 L/ha

Se aplică cu 14-21 de zile înainte de recoltarea planificată din faza în care 30% din semințe sunt colorate până în momentul în care dezvoltarea tulpinii este completă iar frunzele superioare sunt încă verzi (BBCH 83-91). Maxim 1 tratament/sezon.

SUSAN PENTRU SEMINTE*:

Desicant

- 2 L/ha

Se aplică cu 14-21 de zile înainte de recoltarea planificată din faza în care 30-40% din capsule au ajuns la maturitate iar primele capsule încep să se deschidă până în momentul în care plantele încep procesul de ofilire (BBCH 83-91). Maxim 1 tratament/sezon.



*Utilizări minore în România, conform Ordinului MADR nr. 200/2020 pentru care nu s-au efectuat teste de eficacitate.

AUTORIZARE ZONALĂ (art. 34-39 – Reg. (CE) nr. 1107/2009)

ERBICIDE

1.	KVAZAR 40 g/L imazamox	Galenika Fitofarmacija d.o.o., Slovenia Autorizație nr.: 1164PC/08.06.2026	SMRZ: ROMÂNIA	FLOAREA-SOARELUI (HIBRIZI REZISTENȚI LA IMAZAMOX): Buruieni dicotiledonate și monocotiledonate anuale și perene, inclusiv <i>Orobanche cumana</i> • 1,0 – 1,25 L/ha Se aplică postemergent în stadiul de 2-8 frunze ale culturii (BBCH 12-18), iar buruienile se află în faza de creștere activă (2-4 frunze). <u>MAZĂRE:</u> Buruieni dicotiledonate și monocotiledonate anuale și perene • 0,75 – 1,0 L/ha Se aplică postemergent în faza de 2-4 frunze desfăcute (BBCH 12-14), iar buruienile se află în faza de creștere activă (2-4 frunze). <u>OREZ (SOIURI REZISTENTE LA ERBICIDE IMIDAZOLINONE):</u> Buruieni dicotiledonate și monocotiledonate anuale și perene • 0,875 L/ha Se aplică 2 tratamente postemergente, astfel: - primul tratament în stadiul de 3 până la 4 frunze desfăcute (BBCH 13-14), iar buruienile se află în faza de creștere activă (2-4 frunze). - al doilea tratament în stadiul de 5 până la 6 frunze desfăcute (BBCH 15-16), iar buruienile se află în faza de creștere activă (2-4 frunze). <u>SOIA:</u> Buruieni dicotiledonate și monocotiledonate anuale și perene • 0,75 – 1,0 L/ha Se aplică postemergent în stadiul de 2-4 frunze ale culturii (BBCH 12- 14), iar buruienile se află în faza de creștere activă (2-4 frunze).	ATENȚIE <u>UTILIZARE PROFESIONALĂ</u>
----	---------------------------	---	------------------	---	--



2.	YACHT 375 g/L metazaclor + 125 g/L quinmerac	Sharda Cropchem España S.L., Spania Autorizație nr.: 1165PC/08.06.2026	SMRZ: ROMÂNIA	RAPITĂ : Buruieni monocotiledonate anuale și dicotiledonate anuale • 2,0 L/ha Se aplică preemergent sau postemergent timpuriu (BBCH 10-14).	ATENȚIE UTILIZARE PROFESIONALĂ
3.	PACNEW XTRA 750 g/L MCPA din sare de dimetilamină	Rainbow Agrosciences Europe S.A.U., Spania Autorizație nr.: 1166PC/08.06.2026	SMRZ: ROMÂNIA	GRĂU, ORZ: Buruieni dicotiledonate anuale și perene: <i>Amaranthus retroflexus</i> , <i>Atriplex</i> spp., <i>Capsella bursa</i> <i>pastoris</i> , <i>Centaurea cyanus</i> , <i>Chenopodium album</i> , <i>Cirsium</i> <i>arvense</i> , <i>Polygonum aviculare</i> , <i>Raphanus</i> spp., <i>Rumex acetosa</i> , <i>Senecio vulgaris</i> , <i>Sinapis arvensis</i> , <i>Solanum nigrum</i> , <i>Sonchus arvensis</i> , <i>Stellaria media</i> , <i>Thlaspi arvense</i> , <i>Vicia</i> spp., <i>Xanthium italicum</i> . • 1,0 L/ha Se aplică de la stadiul de 3 frunze până la apariția frunzei stindard când aceasta este complet desfășurată (BBCH 13- 39).	PERICOL UTILIZARE PROFESIONALĂ
4.	BLENIS GOLD 50 g/L florasulam	AGRIA SA, Bulgaria Autorizație nr.: 1167PC/08.06.2026	SMRZ: ROMÂNIA	GRĂU , ORZ, SECARĂ*, OVĂZ, TRITICALE DE TOAMNĂ*: Buruieni dicotiledonate anuale • 0,07 L/ha Se aplică postemergent, toamna de la stadiul de 3 frunze desfășurate până la sfârșitul înfrățirii (BBCH 13-29). • 0,100 - 0,150 L/ha Se aplică postemergent, primăvara, până la stadiul în care frunza stindard este complet dezvoltată iar ligulele frunzelor sunt vizibile (BBCH 39). GRĂU DE PRIMĂVARĂ, ORZ DE PRIMĂVARĂ, OVĂZ DE PRIMĂVARĂ: Buruieni dicotiledonate anuale • 0,100 - 0,150 L/ha Se aplică postemergent, primăvara, de la stadiul de 3 frunze desfășurate până la stadiul în care frunza stindard este complet dezvoltată iar ligulele frunzelor sunt vizibile (BBCH 13-39). *Utilizări minore în România, conform Ordinului MADR nr. 200/2020 pentru care nu s-au efectuat teste de eficacitate.	ATENȚIE UTILIZARE PROFESIONALĂ

INSECTICIDE

1.	NEVADA 100 g /kg fostiazat	SHARDA CROPCHEM ESPAÑA S.L., Spania Autorizație nr.: 1168PC/08.06.2026	SMRZ: ROMÂNIA	CARTOF: <i>Ditylenchus</i> spp., <i>Agriotes</i> spp. • 10-15 kg/ha Se aplică un tratament o dată la 3 ani, pe aceeași suprafață CARTOF PENTRU SĂMÂNȚĂ: <i>Globodera</i> spp. • 30 kg/ha	PERICOL UTILIZARE PROFESIONALĂ
----	--------------------------------------	---	--------------------------------	---	---



				Se aplică un tratament o dată la 3 ani, pe aceeași suprafață	
2.	TERAGUARD PLUS 200 g/L cloranthraniliprol	AGRIA SA, Bulgaria Autorizație nr.: 1169PC/08.06.2026	SMRZ: ROMÂNIA	VARZĂ: <i>Mamestra brassicae</i>, <i>Plutella xylostella</i> <i>Pieris brassicae</i> • 125 mL/ha CONOPIDA*: <i>Mamestra brassicae</i>, <i>Plutella xylostella</i>, <i>Pieris brassicae</i> • 125 mL/ha BROCCOLI*: <i>Mamestra brassicae</i>, <i>Plutella xylostella</i>, <i>Pieris brassicae</i> • 125 mL/ha PRUN: <i>Cydia funebrana</i> • 100 mL/ha PIERSIC*: <i>Cydia molesta</i>, <i>Anarsia lineatella</i> • 175 mL/ha CAIS*: <i>Cydia molesta</i>, <i>Anarsia lineatella</i> • 175 mL/ha NECTARIN*: <i>Cydia molesta</i>, <i>Anarsia lineatella</i> • 175 mL/ha CARTOF: <i>Leptinotarsa decemlineata</i> • 50 mL/ha MĂR: <i>Phyllonorycter corylifoliella</i>, <i>Pandemis spp.</i>, <i>Adoxophyes orana</i>, <i>Argyrotaenia pulchella</i> • 160 - 175 mL/ha (în funcție de gradul de atac) <i>Phyllonorycter blancardella</i>, <i>Leucoptera scitella</i>, <i>Cydia pomonella</i> • 150 mL/ha PĂR*: <i>Cydia pomonella</i>, <i>Leucoptera scitella</i>, <i>Phyllonorycter blancardella</i>, <i>Phyllonorycter corylifoliella</i>, <i>Pandemis spp.</i>, <i>Adoxophyes orana</i>, <i>Argyrotaenia pulchellana</i> • 160 - 175 mL/ha (în funcție de gradul de atac)	ATENȚIE UTILIZARE PROFESIONALĂ



				MORCOV: <i>Psila rosae</i> • 175 mL/ha TELINĂ*: <i>Psila rosae</i> • 175 mL/ha PORUMB, PORUMB ZAHARAT*: <i>Ostrinia nubilalis</i>, <i>Helicoverpa armigera</i> • 125 mL/ha TOMATE: <i>Helicoverpa armigera</i>, <i>Tuta absolută</i> • 175 mL/ha VINETE*: <i>Helicoverpa armigera</i>, <i>Tuta absolută</i> • 175 mL/ha VITĂ DE VIE: <i>Lobesia botrana</i>, <i>Eupoecilia ambiguella</i> • 150 - 175 mL/ha *Utilizări minore în România, conform Ordinului MADR nr. 200/2020 pentru care nu s-au efectuat teste de eficacitate.	
3.	SENTREX 200 g/L clorantraniliprol	AGROCARE CHEMICALS KFT, Ungaria Autorizație nr.: 1170PC/08.06.2026	SMRZ: ROMÂNIA	BROCCOLI*, CONOPIDĂ*, VARZĂ: <i>Pieris brassicae</i>, <i>Plutella xylostella</i>, <i>Mamestra brassicae</i> • 0,125 L/ha Se aplică de la apariția primelor frunze și până la recoltare, la apariția primelor ouă, înainte de eclozare (BBCH12-49), maxim 2 tratamente la interval de 10-14 zile. CAIS*, PIERSIC*, NECTARIN*: <i>Cydia molesta</i>, <i>Anarsia lineatella</i> • 0,175 L/ha Se aplică, de la stadiul de înflorire până la începutul coacerii (BBCH 70-87), maxim 2 tratamente la interval de 10-14 zile. PRUN: <i>Cydia funebrana</i> • 0,100 L/ha Se aplică de la stadiul de înflorire până la începutul coacerii (BBCH 70-87), maxim 2 tratamente la interval de 10-14 zile.	ATENȚIE UTILIZARE PROFESIONALĂ



PĂR*:

Argyrotaenia spp., *Adoxophyes orana*, *Phyllonorycter corylifoliella*, *Phyllonorycter blancardella*, *Pandemis* spp., *Cydia pomonella*, *Leucoptera scitella*

- 0,160 - 0,175 L/ha

(în funcție de gradul de atac)

Se aplică de la stadiul de înflorire până la începutul coacerii (BBCH 70-87), maxim 2 tratamente la interval de 10-14 zile.

MĂR:

Cydia pomonella, *Leucoptera scitella*, *Phyllonorycter blancardella*

- 0,150 L/ha

Se aplică de la stadiul de înflorire până la începutul coacerii (BBCH 70-87), maxim 2 tratamente la interval de 10-14 zile.

MĂR:

Argyrotaenia spp., *Adoxophyes orana*, *Phyllonorycter corylifoliella*, *Pandemis* spp.

- 0,160-0,175 L/ha

(în funcție de gradul de atac)

Se aplică la avertizare, de la stadiul de înflorire până la începutul coacerii (BBCH 70-87), maxim 2 tratamente la interval de 10-14 zile.

MORCOV, TELINĂ*

Psylla rosae

- 0,175 L/ha

Se aplică de la apariția primelor frunze și până la recoltare (BBCH 15-89), maxim 2 tratamente la interval de 10-14 zile.

PORUMB, PORUMB ZAHARAT*:

Helicoverpa armigera,

Ostrinia nubilalis

- 0,125 L/ha

Se aplică din stadiul de 4 frunze până la recoltare (BBCH 14-87), maxim 2 tratamente la interval de 10-14 zile.

CARTOF:

Leptinotarsa decemlineata.

- 0,05 L/ha

Se aplică de la începutul acoperirii solului cu frunzele plantei (BBCH 31-38), maxim 2 tratamente la interval de 10-14 zile.

TOMATE:

Tuta absoluta, *Helicoverpa armigera*

- 0,175 L/ha



				Se aplică de la apariția primelor ouă, înainte de eclozare (BBCH 51-89), maxim 2 tratamente la interval de 10-14 zile VINETE*: <i>Tuta absoluta</i>, <i>Helicoverpa armigera</i>. • 0,175 L/ha Se aplică de la apariția primelor ouă, înainte de eclozare (BBCH 51-89), maxim 2 tratamente la interval de 10-14 zile VITA DE VIE: <i>Eupoecilia ambiguella</i>, <i>Lobesia botrana</i> • 0,150 - 0,175 L/ha Se aplică de la formarea ciorchinilor până la maturitatea strugurilor (BBCH 57-85), maxim 2 tratamente la interval de 10-14 zile. *Utilizări minore în România, conform Ordinului MADR nr. 200/2020 pentru care nu s-au efectuat teste de eficacitate.	
4.	TEXLA 1,5 GR 15 g/kg teflutrin	SHARDA CROP-CHEM ESPAÑA S.L., Spania Autorizație nr.: 1171PC/08.06.2026	SMRZ: ROMÂNIA	PORUMB, PORUMB ZAHARAT: <i>Agriotes</i> spp. • 12 kg/ha PORUMB, PORUMB ZAHARAT: <i>Diabrotica virgifera</i> • 15 kg/ha FLOAREA SOARELUI: <i>Melolontha melolontha</i>, <i>Agriotes</i> spp. • 10 kg/ha SFECLĂ DE ZAHAR: <i>Melolontha melolontha</i>, <i>Agriotes</i> spp. • 10 kg/ha SALATĂ (CÂMP): <i>Melolontha melolontha</i> • 10 kg/ha PORUMB, PORUMB ZAHARAT: <i>Agriotes</i> spp. • 12 kg/ha PORUMB, PORUMB ZAHARAT: <i>Diabrotica virgifera virgifera</i> • 15 kg/ha FLOAREA SOARELUI: <i>Melolontha melolontha</i>, <i>Agriotes</i> spp. • 10 kg/ha	ATENȚIE UTILIZARE PROFESIONALĂ



				SFECLĂ DE ZAHAR: <i>Melolontha melolontha</i>, <i>Agriotes</i> spp. • 10 kg/ha SALATĂ (CÂMP): <i>Melolontha melolontha</i> • 10 kg/ha CEAPĂ (CÂMP): <i>Melolontha melolontha</i> • 10 kg/ha FASOLE DE CÂMP: <i>Melolontha melolontha</i> • 10 kg/ha MAZĂRE BOABE (CÂMP): <i>Melolontha melolontha</i> • 10 kg/ha DOVLECEI (CÂMP): <i>Melolontha melolontha</i> • 10 kg/ha PEPENI GALBENI (CÂMP): <i>Melolontha melolontha</i> • 10 kg/ha PEPENI VERZI (CÂMP): <i>Melolontha melolontha</i> • 10 kg/ha PEPINIERE, CULTURI ÎNFIINTATE PRIN RĂSAD, BUTAȘI, PLANTE ALTOITE (CÂMP): <i>Melolontha melolontha</i>, <i>Agriotes</i> spp. • 15 kg/ha	
5.	TROJAN 500 g/kg flonicamid	SHARDA CROPCHEM ESPAÑA S.L., Spania Autorizație nr.: 1172PC/08.06.2026	SMRZ: ROMÂNIA	ARDEI (CÂMP): <i>Myzus persicae</i> • 0,012-0,014% (0,120-0,140 kg/ha) Se aplică de la sfârșitul primăverii până la începutul verii la dezvoltarea frunzelor până la recoltarea fructelor (BBCH 16/18-99). VARZĂ ALBĂ, VARZĂ DE BRUXELLES*: <i>Afide</i> spp., <i>Aleyrodes proletella</i> • 0,140 kg/ha Se aplică de la a doua frunză desfăcută până la faza în care căpățâna a ajuns la 50% din mărimea specifică soiului (BBCH 12-45). CARTOF (INDUSTRIE, AMIDON, CONSUM): <i>Afide</i> • 0,160 kg/ha	ATENȚIE UTILIZARE PROFESIONALĂ



Se aplică de la apariția primelor frunze până la apariția celei de-a 5-a frunze (de la BBCH 10-11 până la BBCH 15).

CARTOF (SĂMÂNTĂ):

Afide

- 0,160 kg/ha

Se aplică de la apariția primelor frunze până la apariția celei de-a 5-a frunze (de la BBCH 10-11 până la BBCH 15).

MĂR:

Dysaphis plantaginea

- 0,01% (0,15 kg/ha)

Se aplică de la sfârșitul înfloririi până la dezvoltarea fructului (BBCH 69-75).

PIERSIC*:

Myzus persicae

- 0,012-0,014%
(0,120-0,140 kg/ha)

Se aplică de la sfârșitul înfloririi până la dezvoltarea fructului (BBCH 69-75), în funcție de gradul de infestare.

PRUN:

Hyalopterus pruni

- 0,012-0,014%
(0,120-0,140 kg/ha)

Se aplică de la sfârșitul înfloririi până la dezvoltarea fructului (BBCH 69-75), în funcție de gradul de infestare.

CAIS*:

Myzus persicae,
Brachycaudus schwartzi,
Myzus varians

- 0,140 kg/ha

Se aplică de la apariția primei frunze până la căderea fructelor după înflorire (BBCH 11-71).

CIRES*:

Myzus cerasi, *Myzus persicae*

- 0,140 kg/ha

Se aplică de la apariția primei frunze până la căderea fructelor după înflorire (BBCH 11-71).

MAZĂRE:

Myzus persicae

- 0,140 kg/ha

Se aplică din aprilie până în iunie, de la șase frunze formate (cu stipele) sau trei cârcei dezvoltate până la 10% din păstai au atins mărimea caracteristică (BBCH 16-71).



				<u>ORZ, OVĂZ, SECARĂ*:</u> Afide • 0,140 kg/ha <u>Toamna:</u> Se aplică de la prima frunză desfăcută până la înfrățire (BBCH 11-25). <u>Primăvara:</u> Se aplică de la stadiul de frunză stindard complet dezvoltată până la maturitate în lapte (BBCH 39-77). <u>PLANTE ORNAMENTALE* DIN PARCURI ȘI GRĂDINI:</u> <i>Macrosiphon rosae</i> • 0,012-0,014% (0,120-0,140 kg/ha) În funcție de gradul de infestare. *Utilizări minore în România, conform Ordinului MADR nr. 200/2020 pentru care nu s-au efectuat teste de eficacitate.	
6.	SPINOCIM 240 g/L spinosad	Rainbow Agrosiences Europe S.A.U., Spania Autorizație nr.: 1173PC/08.06.2026	<u>SMRZ:</u> ROMÂNIA	<u>VITĂ DE VIE:</u> <i>Lobesia botrana</i> • 0,15 - 0,20 L/ha (Se aplică diferențiat în funcție de presiunea de atac a dăunătorului) <u>MĂR:</u> <i>Phyllonorycter blancardella</i>, <i>Phyllonorycter corylifoliella</i> • 0,6 L/ha <u>MĂR:</u> <i>Cydia pomonella</i> • 0,9 L/ha <u>CARTOF:</u> <i>Leptinotarsa decemlineata</i> • 0,1 L/ha <u>VARZĂ:</u> <i>Plutella maculipennis</i> • 0,03 % <u>CASTRAVETI (SOLAR):</u> <i>Frankliniella occidentalis</i> • 0,05 % <u>PRUN:</u> <i>Eurytoma schreinerii</i>, <i>Cydia funebrana</i> • 0,6 L/ha <u>CIREȘ:</u> <i>Ragoletis cerasi</i> • 0,06 % <u>CEAPĂ:</u> <i>Thrips tabaci</i> • 0,04 % <u>TOMATE (SERĂ):</u> <i>Liriomyza trifolii</i> • 0,05 %	<u>ATENȚIE</u> <u>UTILIZARE PROFESIONALĂ</u>



FUNGICIDE

1.	KILBRIDE 175 g/L protioconazol + 150 g/L trifloxistrobin	JT AGRO Ltd., Irlanda	<u>SMRZ:</u> ROMÂNIA	NU SE AUTORIZEAZĂ	
2.	DELIGHT 175 g/L protioconazol + 150 g/L trifloxistrobin	SHARDA CROP CHEM ESPAÑA S.L., Spania	<u>SMRZ:</u> ROMÂNIA	NU SE AUTORIZEAZĂ	
3.	DOVVO 375 SC 250 g/L difenoconazol + 125 g/L paclobutrazol	QEMETICA Agricultural Solutions Poland S.A, Polonia Autorizație nr.: 1174PC/08.06.2026	<u>SMRZ:</u> ROMÂNIA	<u>RAPITĂ DE TOAMNĂ:</u> <i>Phoma lingam</i> Regulator de creștere • 0,5 L/ha Se aplică maxim 2 tratamente: <u>Toamna</u> la începerea contaminării, de la 4 frunze (BBCH14) până la stoparea creșterilor, la intrarea în iarnă. <u>Primăvara</u> de la începerea alungirii tulpinii până la stadiul de buton floral verde alungit (BBCH35-55).	ATENȚIE <u>UTILIZARE</u> <u>PROFESIONALĂ</u>
4.	ASTER PLUS 200 g/L azoxistrobin + 125 g/L difenoconazol	Rainbow Agrosiences Co., Ltd., Irlanda Autorizație nr.: 1175PC/08.06.2026	<u>SMRZ:</u> ROMÂNIA	<u>TOMATE, VINETE</u> <u>(CÂMP, SERE ȘI SOLARII):</u> <i>Botrytis cinerea</i> , <i>Phytophthora infestans</i> , <i>Cladosporium fulvum</i> , <i>Leveillula taurica</i> , <i>Alternaria solani</i> , <i>Alternaria alternata</i> • 1 L/ha Se aplică max. 3 tratamente la interval de 7-10 zile. <u>ARDEI</u> <u>(CÂMP, SERE ȘI SOLARII):</u> <i>Botrytis cinerea</i> , <i>Phytophthora infestans</i> , <i>Cladosporium fulvum</i> , <i>Leveillula taurica</i> , <i>Alternaria solani</i> , <i>Alternaria alternata</i> • 1 L/ha Se aplică max. 2 tratamente la interval de 8-10 zile. <u>VARZĂ, VARZĂ DE BRUXELLES,</u> <u>CONOPIDĂ, BROCCOLI (CÂMP):</u> <i>Mycosphaerella brassicae</i> , <i>Alternaria brassicae</i> , <i>Alternaria brassicicola</i> , <i>Peronospora brassicae</i> , <i>Erysiphe cruciferarum</i> , <i>Leptosphaeria maculans</i> , <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> , <i>Albugo candida</i> • 1 L/ha Se aplică max. 2 tratamente la interval de 14 zile.	ATENȚIE <u>UTILIZARE</u> <u>PROFESIONALĂ</u>



			MORCOV, PĂSTARNAC, PĂTRUNJEL (CÂMP): <i>Alternaria dauci, Erysiphe heraclei, Sclerotinia sclerotiorum</i> • 1 L/ha Se aplică max. 3 tratamente la interval de 14 zile. HREAN, RIDICHI (CÂMP): <i>Mycosphaerella brassicae, Alternaria brassicae, Alternaria brassicicola, Peronospora brassicae, Erysiphe cruciferarum, Leptosphaeria maculans, Sclerotinia sclerotiorum, Albugo candida</i> • 1 L/ha Se aplică max. 3 tratamente la interval de 14 zile. TELINĂ (CÂMP, SERE ȘI SOLARII): <i>Erysiphe heraclei, Septoria apii, Sclerotinia sclerotiorum, Alternaria dauci</i> • 1 L/ha Se aplică max. 3 tratamente la interval de 14 zile. CASTRAVETI, DOVLECEI (CÂMP ȘI SERE): <i>Sphaerotheca fuliginea, Erysiphe cichoracearum, Cladosporium cucumerium</i> • 1 L/ha Se aplică max. 3 tratamente la interval de 10 zile. PRAZ (CÂMP): <i>Alternaria porri, Puccinia allii, Peronospora destructor, Phytophthora porri, Cladosporium allii</i> • 1 L/ha Se aplică max. 2 tratamente la interval de 12 zile. SALATĂ (CÂMP): <i>Alternaria brassicae, Cercospora lactucae-sativa, Bremia lactucae, Sclerotinia sclerotiorum</i> • 1 L/ha Se aplică max. 2 tratamente la interval de 7 zile. SALATĂ (SERE): <i>Alternaria brassicae, Cercospora lactucae-sativa, Bremia lactucae, Sclerotinia sclerotiorum</i> • 0,8 L/ha Se aplică max. 2 tratamente la interval de 7 zile.	
--	--	--	---	--



				<u>CEAPĂ SEMĂNATĂ DIRECT, CEAPĂ DIN ARPAGIC, USTUROI (CÂMP):</u> <i>Alternaria porri, Puccinia allii, Peronospora destructor, Phytophthora porri, Cladosporium allii</i> • 1 L/ha Se aplică max. 2 tratamente la interval de 14 zile. <u>CEAPĂ VERDE (CÂMP):</u> <i>Alternaria porri, Puccinia allii, Peronospora destructor, Phytophthora porri, Cladosporium allii</i> • 1 L/ha Se aplică max. 1 tratament. <u>MAZĂRE (CÂMP):</u> <i>Ascochyta pisi, Peronospora viciae, Mycosphaerella fragariae, Erysiphe pisi</i> • 1 L/ha Se aplică max. 2 tratamente la interval de 14 zile. <u>CĂPSUN, ZMEURĂ (CÂMP ȘI SERE):</u> <i>Podosphaera aphanis, Colletotrichum acutatum, Gnomonia comari, Mycosphaerella fragariae</i> • 1 L/ha Se aplică max. 2 tratamente la interval de 7 zile. <u>PEPENI VERZI, PEPENI GALBENI (CÂMP ȘI SERE):</u> <i>Sphaerotheca fuliginea, Erysiphe cichoracearum, Cladosporium cucumerium</i> • 1 L/ha Se aplică max. 3 tratamente la interval de 8 zile. <u>FASOLE (CÂMP):</u> <i>Peronospora viciae, Erysiphe polygoni.</i> • 1 L/ha Se aplică max. 2 tratamente la interval de 12 zile.	
5.	BARIDO 450 g/kg cymoxanil	Rainbow Agrosiences Europe S.A.U., Spania Autorizație nr.: 1176PC/08.06.2026	<u>SMRZ:</u> ROMÂNIA	<u>CARTOF :</u> <i>Phytophthora infestans</i>	<u>ATENȚIE</u> <u>UTILIZARE PROFESIONALĂ</u>
6.	KLAPTON 267 g/kg boscalid + 67 g/kg piraclostrobin	INN VIGO Sp.z.o.o., Polonia Autorizație nr.: 1177PC/08.06.2026	<u>SMRZ:</u> ROMÂNIA	<u>CAIS:</u> <i>Monilinia spp</i>	<u>PERICOL</u> <u>UTILIZARE PROFESIONALĂ</u>
				• 0,5 kg/ha Se aplică de la apariția primelor flori până la coacerea fructelor (BBCH 60-87). <u>PIERSIC:</u> <i>Monilinia spp</i> • 0,5 kg/ha	



				Se aplică de la apariția primelor flori până la coacerea fructelor (BBCH 60-87). CIRES: <i>Monilinia</i> spp., <i>Blumeriella jaapi</i> (syn. <i>Cocomyces hiemalis</i>) • 0,5 kg/ha Se aplică de la stadiul de buton floral până la începutul colorării fructelor (BBCH 59-81). VIȘIN: <i>Monilinia</i> spp. • 0,5 kg/ha Se aplică de la stadiul de buton floral până la începutul colorării fructelor (BBCH 59-81). PRUN: <i>Monilinia</i> spp., <i>Polystigma rubrum</i> • 0,5 kg/ha Se aplică de la stadiul de buton floral până la începutul colorării fructelor (BBCH 59-81). TOMATE: <i>Botrytis cinerea</i> • 1,5 kg/ha Se aplică de la apariția primei inflorescențe până când 50% din fructe sunt colorate (BBCH 50-85). SALATĂ: <i>Botrytis cinerea</i>, <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> • 1,5 kg/ha Se aplică de la a doua frunză adevărată nedeșfacută până la atingerea dimensiunilor specific soiului (BBCH 12-49). MORCOV: <i>Alternaria dauci</i> • 0,75 kg/ha Se aplică de la începutul creșterii rădăcinii până la atingerea a 70% din diametru (BBCH 41-47). VARZĂ: <i>Alternaria</i> spp., <i>Botrytis cinerea</i> • 1,0 kg/ha Se aplică de la începutul formării căpătâii până la atingerea dimensiunilor specifice soiului (BBCH 41-49). ARDEI: <i>Botrytis cinerea</i>, <i>Leveillula taurica</i> • 1,5 kg/ha Se aplică de la primul boboc floral vizibil până când 70% din fructe au culoarea specifică soiului (BBCH 51-87).
--	--	--	--	---



				VINETE: <i>Botrytis cinerea</i>, <i>Leveillula taurica</i> • 1,5 kg/ha Se aplică de la apariția primei inflorescențe până când 50% din fructe sunt colorate (BBCH 50-85). PRAZ: <i>Cladosporium allii-porri</i>, <i>Phytophthora porri</i>, <i>Alternaria porri</i> • 1,5 kg/ha Se aplică de când frunzele bazale se îngroasă până la dezvoltarea completă, înălțimea și diametrul corespund soiului (BBCH 41-49). CĂPSUN: <i>Botrytis cinerea</i> • 1,8 kg/ha Se aplică de la primele flori deschise până când primele fructe sunt colorate (BBCH 60-87).	
7.	SPECTAR 500 g/kg boscalid	AGRIA SA, Bulgaria Autorizație nr.: 1178PC/08.06.2026	SMRZ: ROMÂNIA	VITĂ DE VIE: <i>Botrytis cinerea</i> • 1,0 - 1,2 kg/ha (În funcție de presiunea de atac) Se aplică un singur tratament/an în unul dintre următoarele stadii de dezvoltare a viței de vie: sfârșitul înfloritului, înainte de compactarea ciorchinului sau la intrarea în părgă a strugurilor. RAPITĂ DE TOAMNĂ, RAPITĂ DE PRIMĂVARĂ: <i>Plenodomus lingam</i> • 0,2 - 0,5 kg/ha (În funcție de presiunea de atac) Se aplică din faza de 3 frunze până când inflorescența este complet dezvoltată, dar mugurii florali sunt încă închiși (BBCH 13-57); Maxim 2 tratamente/sezon (o aplicare în toamnă și una în primăvară). <i>Sclerotinia sclerotiorum</i>, <i>Alternaria spp.</i> • 0,2 - 0,5 kg/ha (În funcție de presiunea de atac) Se aplică din faza de inflorescență complet dezvoltată cu mugurii florali închiși până când 10% din silicve au ajuns la mărimea finală (BBCH 57-71); Maxim 2 tratamente/sezon la un interval de minim 14 zile între tratamente.	UTILIZARE NEPROFESIONALĂ
8.	REVESTI 25 g/L fludioxonil	SHARDA CROPCHEM ESPAÑA S.L., Spania Autorizație nr.: 1179PC/08.06.2026	SMRZ: ROMÂNIA	GRĂU: <i>Ustilago tritici</i>, <i>Tilletia caries</i>, <i>Septoria nodorum</i>, <i>Microdochium nivale</i>, <i>Fusarium spp.</i> • 0,2 L/100 kg semințe	PERICOL UTILIZARE PROFESIONALĂ



				ORZ: <i>Ustilago hordei</i>, <i>Helminthosporium gramineum</i>, <i>Fusarium</i> spp. • 0,2 L/100 kg semințe SECARĂ: <i>Urocystis occulta</i>, <i>Microdochium nivale</i>, <i>Fusarium</i> spp. • 0,2 L/100 kg semințe TRITICALE: <i>Microdochium nivale</i>, <i>Fusarium</i> spp. • 0,2 L/100 kg semințe	
9.	TELEXAMID SC 500 g/L fenhexamid	UPL Holdings Coöperatief U.A., Olanda Autorizație nr.: 1180PC/08.06.2026	SMRZ: ROMÂNIA	VITĂ DE VIE: <i>Botrytis cinerea</i> • 1 L/ha Se aplică: - BBCH 63-89 la strugurii de vin, de la apariția înflorescenței până la coacerea deplină; - BBCH 69-89 la strugurii de masă de la sfârșitul înfloritului până la coacerea deplină. CIRES, VIȘIN, PRUN: <i>Monilinia</i> spp. • 0,8 L/ha Se aplică de la umflarea mugurilor până la maturitatea fructelor (BBCH 51-89). CASTRAVETI (SPATII PROTEJATE): <i>Botrytis cinerea</i> • 0,8 L/ha Se aplică de la a 2 a frunză adevărată până la maturitatea deplină (BBCH 12-89). TOMATE (SPATII PROTEJATE): <i>Botrytis cinerea</i> • 1,2 L/ha Se aplică (BBCH 53-89) de la a 3 a înflorescență până la maturitatea fructelor. CĂPSUN: <i>Botrytis cinerea</i> • 1,5 L/ha Se aplică de la începutul înfloritului și după fiecare recoltare (BBCH 55-89). CRIZANTEME, LALELE: <i>Botrytis</i> spp. • 0,8 L/ha Se aplică 3 tratamente la avertizare.	— UTILIZARE PROFESIONALĂ ȘI NEPROFESIONALĂ



10.	FIAMBOYA 62,5 g/L fluopicolide + 625 g/L clorhidrat de propamocarb	Sharda Cropchem España S.L., Spania Autorizație nr.: 1181PC/08.06.2026	SMRZ: ROMÂNIA	CARTOF: <i>Phytophthora infestans</i> • 1,4 L/ha Se aplică începând cu fenofaza de întrepătrundere a frunzelor din același bilon până când 20% dintre fructele de pe a 3-a ramură de fructificare au atins mărimea completă (BBCH 31-79), 1 - 3 tratamente preventive la interval de 7-10 zile. CASTRAVETI: <i>Pseudoperonospora cubensis</i> • 1,4 L/ha Se aplică de la formarea primilor lăstari laterali până la apariția primelor flori pe tulpina principală (BBCH 21-49), 1 - 2 tratamente preventive la interval de 7 - 10 zile. SALATĂ* (SOLARII): <i>Bremia lactucae</i> • 1,4 L/ha Se aplică de la desfacerea completă a celei de a treia frunze adevărate până la momentul în care căpățâna este formată în proporție de 70% (BBCH 13-47), 1 - 2 tratamente preventive pe vegetație la interval de 7 zile. CEAPĂ: <i>Peronospora destructor</i> • 1,4 L/ha Se aplică din fenofaza de 9 frunze adevărate până când 50% din frunze s-au culcat (BBCH 19-48), 1 - 2 tratamente preventive, pe vegetație, la interval de minim 7-10 zile. *Utilizări minore în România, conform Ordinului MADR nr. 200/2020 pentru care nu s-au efectuat teste de eficacitate.	ATENȚIE UTILIZARE PROFESIONALĂ
11.	TWINKLE 128 g/kg piraclostrobin + 252 g/kg boscalid	Sharda Cropchem España S.L., Spania Autorizație nr.: 1182PC/08.06.2026	SMRZ: ROMÂNIA	MĂR ȘI PĂR (PLANTATII PE ROD ȘI PEPINIERE): <i>Venturia inaequalis</i> , <i>Venturia pirina</i> , <i>Podosphaera leucotricha</i> , <i>Gloeosporium</i> spp., <i>Penicillium</i> spp., <i>Botrytis</i> spp., <i>Alternaria</i> spp. • 0,8 kg/ha	PERICOL UTILIZARE PROFESIONALĂ



NEMATOCIDE, DEZINFECTANȚI AI SOLULUI

1.	DAZZLE 965 g/kg dazomet	Sharda Cropchem España S.L., Spania Autorizație nr.: 1183PC/08.06.2026	<u>SMRZ:</u> ROMÂNIA	<u>LEGUME ÎN SOLARI ÎNFIINTATE PRIN RĂSAD</u> <i>Grylotalpa grylotalpa</i> • 250 kg/ha <u>TOMATE SERĂ</u> <i>Phytophthora parasitica</i>, <i>Fusarium spp.</i>, <i>Verticillium dahliae</i> • 500 kg/ha <u>TOMATE SERĂ</u> <i>Meloidogyne incognito</i> • 500 kg/ha	<u>ATENȚIE</u> <u>UTILIZARE PROFESIONALĂ</u>
----	-----------------------------------	---	-------------------------	--	--

RECUNOAȘTERE RECIPROCĂ (art. 40 – 42 – Reg.(CE) nr. 1107/2009)

ERBICIDE

1.	EL CAMINO 30SL 30 g/L aminopirid	INNIGO Sp.z.o.o., Polonia Autorizație nr.: 1184PC/08.06.2026	AUTORIZARE DUPA OMOLOGARE DIN <u>POLONIA</u>	<u>RAPITĂ DE TOAMNĂ:</u> Buruieni dicotiledonate: (ex. <i>Centaurea cyanus</i>, <i>Viola tricolor</i> <i>Papaver rhoeas</i>, <i>Tripleurospermum</i> <i>inodorum</i>, <i>Matricaria chamomilla</i>, <i>Capsella bursa-pastoris</i>) • 0,2 – 0,267 L/ha Se aplică de la stadiul de cotiledon complet dezvoltat până la stadiul de 8 frunze (BBCH 10-18); Max. 1 tratament în perioada de vegetație.	<u>PERICOL</u> <u>UTILIZARE PROFESIONALĂ</u>
2.	BENTA SUPER 480 g/L bentazona	Sharda Cropchem España S.L., Spania Autorizație nr.: 1185PC/08.06.2026	AUTORIZARE DUPA OMOLOGARE DIN <u>Republica Cehă</u>	<u>CARTOF:</u> Buruieni dicotiledonate anuale: <i>Galium aparine</i>, <i>Capsella bursa-pastoris</i>, <i>Tripleurospermum inodorum</i>, <i>Stellaria media</i>, <i>Chenopodium album</i>, <i>Fumaria officinalis</i>, <i>Polygonum convolvulus</i> • 2,0 L/ha Se aplică postemergent, înainte ca plantele de cartof să atingă 15 cm înălțime. <u>MAZĂRE:</u> Buruieni dicotiledonate anuale: <i>Galium aparine</i>, <i>Capsella bursa-pastoris</i>, <i>Tripleurospermum inodorum</i>, <i>Stellaria media</i>, <i>Chenopodium album</i>, <i>Fumaria officinalis</i>, <i>Polygonum convolvulus</i> • 2,0 L/ha Se aplică postemergent, înainte de apariția bobocilor floralii. <u>BOB:</u> Buruieni dicotiledonate anuale: <i>Galium aparine</i>, <i>Capsella bursa-pastoris</i>, <i>Tripleurospermum inodorum</i>, <i>Stellaria media</i>, <i>Chenopodium album</i>, <i>Fumaria officinalis</i>, <i>Polygonum convolvulus</i>	<u>ATENȚIE</u> <u>UTILIZARE PROFESIONALĂ</u>



				• 2,0 L/ha Se aplică postemergent până înaintea formării celei de a 5-a perechi de frunze. IN: Buruieni dicotiledonate anuale: <i>Galium aparine, Capsella bursa-pastoris, Tripleurospermum inodorum, Stellaria media, Chenopodium album, Fumaria officinalis, Polygonum convolvulus</i> • 2,0 L/ha Se aplică postemergent la înălțimea inului de 2,5 - 30 cm, dar înainte de apariția bobocilor florali. FASOLE: Buruieni dicotiledonate anuale: <i>Galium aparine, Capsella bursa-pastoris, Tripleurospermum inodorum, Stellaria media, Chenopodium album, Fumaria officinalis, Polygonum convolvulus</i> • 2,0 L/ha Se aplică postemergent înainte de apariția bobocilor florali. NARCISE ÎN SPATII LIBERE (NEPROTEJATE) CU EXCEPTIA ZONELOR UTILIZATE DE PUBLICUL LARG SAU DE GRUPURILE VULNERABILE: Buruieni dicotiledonate anuale: <i>Galium aparine, Capsella bursa-pastoris, Tripleurospermum inodorum, Stellaria media, Chenopodium album, Fumaria officinalis, Polygonum convolvulus</i> • 2,0 L/ha Se aplică de la răsărire până la alungirea tulpinii florale, înainte de înflorire (BBCH 10-39).	
3.	MAISTER POWER 57,5 OD 31,5 g/L foramsulfuron + 1,0 g/L iodosulfuron metil sodiu + 10,0 g/L tiencarbazon-metil + 15,0 g/L ciprosulfamida (safener)	BAYER SRL, România Autorizație nr.: 1186PC/08.06.2026	AUTORIZARE DUPA OMOLOGARE DIN AUSTRIA	PORUMB*: Buruieni monocotiledonate și dicotiledonate anuale și perene: Monocotiledonate: <i>Sorghum halepense, Elymus repens, Apera spica-venti, Avena fatua, Echinochloa crus-gali, Setaria spp., etc.</i> Dicotiledonate: <i>Cirsium arvense, Xanthium strumarium, Ambrosia artemisiifolia, Convolvulus arvensis, Polygonum convolvulus, Sinapis arvensis, Capsella bursa-pastoris, Senecio vulgaris, Stellaria media, Chenopodium spp., Solanum nigrum, Galium aparine, Matricaria spp. Brassica napus, Polygonum aviculare, Thlaspi arvense, Viola arvensis, Amaranthus spp., etc.</i> • 1,5 L/ha	PERICOL UTILIZARE PROFESIONALA



				Se aplică postemergent în faza de 2 - 8 frunze ale culturii de porumb (BBCH 12-18); Max. 1 tratament. • 0,75 L/ha Se aplică postemergent. Primul tratament în faza de 2 - 3 frunze ale culturii de porumb la (BBCH 12-13), iar cel de al doilea după 7 zile în faza de 5 - 8 frunze ale culturii de porumb (BBCH 15-18); Max. 2 tratamente la interval de 7 zile. *Cu excepția porumbului zaharat și a liniilor de selecție.	
4.	XERTON 417 g/L etofumesat	UPL HOLDINGS COOPERATIEF U.A., Olanda Autorizație nr.: 1187PC/08.06.2026	AUTORIZARE DUPA OMOLOGARE DIN POLONIA	GRĂU DE TOAMNĂ: Buruieni combătute: <i>Poa annua, Apera spica-venti</i> • 0,6 L/ha Se aplică începând cu frunză desfășurată până la faza de maximum 3 frați (BBCH 11-23); Max. 1 tratament pe sezon.	ATENȚIE UTILIZARE PROFESIONALĂ
5.	BASAGRAN SG 870 g/kg bentazona	BASF SE, Germania Autorizație nr.: 1188PC/08.06.2026	AUTORIZARE DUPA OMOLOGARE DIN BELGIA	FASOLE VERDE (RECOLTATĂ ÎN STARE PROASPĂTĂ, CU PĂSTAIE): Buruieni dicotiledonate anuale: (<i>Matricaria chamomilla, Matricaria inodora, Matricaria maritima, Datura stramonium, Stellaria media, Anthemis arvensis, Polygonum persicaria, Sinapis alba, Sinapis arvensis, Galium aparine, Solanum nigrum, Thlaspi arvense, Capsella bursa-pastoris</i>) • 1,1 kg/ha Se aplică de la 3-5 frunze adevărate (BBCH 13-15); Max. 1 tratament. MAZĂRE VERDE (CU PĂSTAI SAU BOABE): Buruieni dicotiledonate anuale: (<i>Matricaria chamomilla, Matricaria inodora, Matricaria maritima, Datura stramonium, Stellaria media, Anthemis arvensis, Polygonum persicaria, Sinapis alba, Sinapis arvensis, Galium aparine, Solanum nigrum, Thlaspi arvense, Capsella bursa-pastoris</i>) • 1,1 kg/ha Se aplică de la 1-2 frunze adevărate sau în perioada formării de 1-2 cârcei (BBCH 11-12); Max. 1 tratament. MAZĂRE RECOLTATĂ USCATĂ (BOABE): Buruieni dicotiledonate anuale: (<i>Matricaria chamomilla, Matricaria inodora, Matricaria maritima, Datura stramonium, Stellaria media, Anthemis arvensis, Polygonum persicaria, Sinapis alba,</i>	PERICOL UTILIZARE PROFESIONALĂ



				<i>Sinapis arvensis</i>, <i>Galium aparine</i>, <i>Solanum nigrum</i>, <i>Thlaspi arvense</i>, <i>Capsella bursa-pastoris</i>) • 1,1 kg/ha Se aplică de la 1-2 frunze adevărate sau în perioada formării de 1-2 cărcei (BBCH 11-12); Max. 1 tratament. <u>MAZĂRE FURAJERĂ (BOABE):</u> Buruieni dicotiledonate anuale: (<i>Matricaria chamomilla</i>, <i>Matricaria inodora</i>, <i>Matricaria maritima</i>, <i>Datura stramonium</i>, <i>Stellaria media</i>, <i>Anthemis arvensis</i>, <i>Polygonum persicaria</i>, <i>Sinapis alba</i>, <i>Sinapis arvensis</i>, <i>Galium aparine</i>, <i>Solanum nigrum</i>, <i>Thlaspi arvense</i>, <i>Capsella bursa-pastoris</i>) • 1,1 kg/ha Se aplică de la 1-2 frunze adevărate sau în perioada formării de 1-2 cărcei (BBCH 11-12); Max. 1 tratament.	
6.	ROXY XL 900 g/L prosulfocarb	GLOBALCHEM NV, BELGIA Autorizație nr.: 1189PC/08.06.2026	AUTORIZARE DUPA OMOLOGARE DIN <u>POLONIA</u>	<u>CEREALE DE TOAMNĂ (GRÂU, ORZ, TRITICALE, SECARĂ):</u> Buruieni dicotiledonate si monocotiledonate anuale: Exemple de buruieni sensibile: <i>Geranium pusillum</i>, <i>Fumaria officinalis</i>, <i>Stellaria media</i>, <i>Lamium purpureum</i>, <i>Myosotis arvensis</i>, <i>Apera spica-venti</i>, <i>Veronica hederifolia</i>, <i>Veronica persica</i>, <i>Thlaspi arvense</i>, <i>Poa annua</i> • 3,5 L/ha Se aplică preemergent, după semănat înainte de răsărire (BBCH 00-09) sau se aplică după răsărire până la sfârșitul înfrățirii (BBCH 10- 29); Max. 1 tratament. <u>GRÂU DURUM DE TOAMNĂ:</u> Buruieni dicotiledonate si monocotiledonate anuale: Exemple de buruieni sensibile: <i>Geranium pusillum</i>, <i>Fumaria officinalis</i>, <i>Stellaria media</i>, <i>Lamium purpureum</i>, <i>Myosotis arvensis</i>, <i>Apera spica-venti</i>, <i>Veronica hederifolia</i>, <i>Veronica persica</i>, <i>Thlaspi arvense</i>, <i>Poa annua</i> • 2,6 L/ha Se aplică preemergent, după semănat înainte de răsărire (BBCH 00-09) sau se aplică după răsărire până la sfârșitul înfrățirii (BBCH 10- 29); Max. 1 tratament.	<u>ATENȚIE</u> <u>UTILIZARE</u> <u>PROFESIONALĂ</u>



				CARTOF: Buruieni dicotiledonate și monocotiledonate anuale: Exemple de buruieni sensibile: <i>Geranium pusillum</i> , <i>Fumaria officinalis</i> , <i>Stellaria media</i> , <i>Lamium purpureum</i> , <i>Myosotis arvensis</i> , <i>Apera spica-venti</i> , <i>Veronica hederifolia</i> , <i>Veronica persica</i> , <i>Thlaspi arvense</i> , <i>Poa annua</i> • 3,5 - 4,4 L/ha Se aplică preemergent, după plantat, înainte de răsărire (BBCH 01-08); Max. 1 tratament.	
7.	JURA MAX 14 g/L diflufenican + 667 g/L prosulfocarb	GLOBACHEM NV, BELGIA Autorizație nr.: 1013PC/07.11.2024	AUTORIZARE DUPA OMOLOGARE DIN Republica Cehă	EXTINDEREA DOMENIULUI DE UTILIZARE: FLOAREA SOARELUI: Buruieni monocotiledonate anuale și dicotiledonate (<i>Poa annua</i> , <i>Galeopsis tetrahit</i> , <i>Viola arvensis</i> , <i>Persicaria lapathifolium</i> , <i>Thlaspi arvense</i> , <i>Fallopia convolvulus</i> , <i>Veronica persica</i> , <i>Tripleurospermum inodorum</i> , <i>Chenopodium album</i> , <i>Solanum nigrum</i> , <i>Mercurialis annua</i> , <i>Echinochloa crus-galli</i>) • 3,0 L/ha Se aplică preemergent, după semănat înainte de răsărire (BBCH 01-09).	PERICOL UTILIZARE PROFESIONALĂ

INSECTICIDE

1.	PHEROMAZE TUTA Amestec de (E,Z,Z)-3,8,11-tetradecatrien-1-yl acetate + (E,Z)-3,8-tetradecadien-1-yl acetate Max. 0,208 g/ dispenser (17,6%, w/w)	Upper International Regulations S.L, Spania Autorizație nr.: 1190PC/08.06.2026	AUTORIZARE DUPA OMOLOGARE DIN MALTA	TOMATE, VINETE* (SERE, SPATII PROTEJATE): <i>Tuta absoluta</i> • 250 - 300 dozatoare/ha Aplicare la plantare, la primele semne de infestare sau la începutul primului zbor adult. *Utilizări minore în România conform Ordinului 200/2020 al MADR pentru care nu s-au efectuat teste de eficacitate.	ATENȚIE UTILIZARE PROFESIONALĂ
2.	ACELEPRYN 200 g/L clorantniliprol	Syngenta Agro SRL, România Autorizație nr.: 1191PC/08.06.2026	AUTORIZARE DUPA OMOLOGARE DIN FRANTA	GAZON ȘI SPATII VERZI (DE AGREMENT): <i>Melolontha sp.</i> , <i>Tipula sp.</i> • 0,6 L/ha Se aplică din februarie până în octombrie; Max. 1 tratament.	ATENȚIE UTILIZARE PROFESIONALĂ
3.	LASER GR 4 g/kg spinosad	SBM Développement Autorizație nr.: 1192PC/08.06.2026	AUTORIZARE DUPA OMOLOGARE DIN FRANTA	PORUMB, PORUMB DULCE*: <i>Agriotes sp.</i> • 12 L/ha Se aplică în brazdă la însămânțare (BBCH 00); Max. 1 tratament. CARTOF: <i>Agriotes sp.</i> • 12 L/ha Se aplică în brazdă la plantare (BBCH 00); Max. 1 tratament.	UTILIZARE PROFESIONALĂ/ NEPROFESIONAL



				*Utilizări minore în România, conform Ordinului MADR nr. 200/2020 pentru care nu s-au efectuat teste de eficacitate.	
4.	SANKARI 650 g/L acid pelargonic	GLOBACHEM NV, BELGIA Autorizație nr.: 1193PC/08.06.2026	AUTORIZARE DUPA OMOLOGARE DIN <u>POLONIA</u>	<u>GRÂU DE TOAMNĂ ȘI PRIMĂVARĂ:</u> Afide (<i>Rhopalosiphum padi</i>, <i>Sitobion avenae</i>) • 1,5 - 2,0 L/ha Se aplică de la înspicare până la faza de lapte-ceara a boabelor (BBCH 51-77). <u>ORZ DE TOAMNĂ:</u> Afide (<i>Rhopalosiphum padi</i>, <i>Sitobion avenae</i>) • 1,5 - 2,0 L/ha Se aplică de la formarea primelor frunze până la sfârșitul înfrățitului (BBCH 10-29). <u>GRÂU DURUM DE TOAMNĂ ȘI PRIMĂVARĂ*:</u> Afide (<i>Rhopalosiphum padi</i>, <i>Sitobion avenae</i>) • 1,5 - 2,0 L/ha Se aplică de la înspicare până la faza de lapte - ceara a boabelor (BBCH 51-77). *Utilizări minore în România conform Ordinului 200/2020 al MADR pentru care nu s-au efectuat teste de eficacitate.	<u>PERICOL</u> <u>UTILIZARE PROFESIONALĂ</u>
5.	LUMIPOSA 625 FS/ (LUMIPOSA Xtra OSR - a doua denumire comercială) 625 g/L ciantraniliprol	CORTEVA AGRISCIENCE ROMANIA SRL Autorizație nr.: 363PC/ 29.11.2017	AUTORIZARE DUPA OMOLOGARE DIN <u>POLONIA</u>	<u>EXTINDEREA DOMENIULUI DE UTILIZARE:</u> <u>PORUMB, PORUMB ZAHARAT*:</u> <i>Agriotes</i> spp. • 54 mL/ 90 000 de semințe/ha (0,6 mL/1 000 semințe) Tratament la sămânță (BBCH 00) <i>Diabrotica virgifera</i> • 90 mL/90.000 (1,0 mL/1 000 semințe) • 96 mL/80 000 de semințe/ha (1,2 mL/1 000 semințe) Tratament la sămânță (BBCH 00) *Utilizări minore în România conform Ordinului 200/2020 al MADR pentru care nu s-au efectuat teste de eficacitate.	<u>ATENȚIE</u> <u>UTILIZARE PROFESIONALĂ</u>



FUNGICIDE

1.	FORESIGHT 72 SL 722 g/L propamocarb	Sharda Cropchem España S.L., Spania Autorizație nr.: 1194PC/08.06.2026	AUTORIZARE DUPA OMOLOGARE DIN POLONIA	CARTOF: <i>Phytophthora infestans</i> • 1,4 L/ha Se aplică de la primii lastari vizibili pana la uscarea a 50% dintre frunze (BBCH 21-95). Max. 5 tratamente la interval de minim 10 zile între tratamente. CASTRAVETI (SERE SI SOLARII): <i>Pseudoperonospora cubensis</i> • 4,0 L/ha Se aplică de la aparitia primelor flori pe tulpina principala pana la primele fructe au dimensiunea caracteristica (BBCH 50-70); Max. 1 tratament. SALATA VERDE (CÂMP): <i>Bremia lactucae</i> • 1,5 L/ha Se aplică de la inceputul formării capatanei pana la dimensiunea carateristica (BBCH 40-49). Max. 3 tratamente la interval de minim 10 zile între tratamente. SALATA VERDE (SERE): <i>Pythium spp.</i> • 0,1 - 0,2% (6 mL/m²) Se aplică de la semănat până la apariția cotiledoanelor (BBCH 00-09); Max. 1 tratament. TOMATE (SERE): <i>Pythium spp.</i> • 0,1 - 0,2% (6 mL/m²) Se aplică de la semănat până la apariția cotiledoanelor (BBCH 00-09); Max. 1 tratament. PLANTE ORNAMENTALE (SERE): <i>Pythium spp.</i> • 0,1 - 0,2% (6 mL/m²) Se aplică de la semănat până la apariția cotiledoanelor (BBCH 00-09); Max. 1 tratament. ARDEI, TOMATE, CASTRAVETI (SERE): Oomicete (<i>Pythium spp.</i>, <i>Phytophthora spp.</i>, <i>Peronospora spp.</i>, <i>Pseudoperonospora spp.</i>) • 0,15% Se aplică prin irigare inainte sau după plantat; Max. 2 tratamente la interval de 7-10 zile între tratamente.	ATENȚIE UTILIZARE PROFESIONALĂ
----	---	---	--	---	---



				ARDEI, TOMATE, CASTRAVETI (SERE): Oomicete (<i>Pythium</i> spp., <i>Phytophthora</i> spp., <i>Peronospora</i> spp., <i>Pseudoperonospora</i> spp.) • 0,25% Se aplică prin irigare înainte sau după semănat; Max. 2 tratamente la interval de 7-10 zile între tratamente. ARDEI, TOMATE, CASTRAVETI (SERE): Oomicete (<i>Pythium</i> spp., <i>Phytophthora</i> spp., <i>Peronospora</i> spp., <i>Pseudoperonospora</i> spp.) • 1,5 - 2,0% Se aplică prin încorporare în substratul de semănat; Max. 2 tratamente la interval de 7-10 zile între tratamente.	
2.	LALSTOP CONTANS WG 1x10 ¹² CFU/kg <i>Coniothyrium minitans</i> tulpina CON/M/91-08	Lallemand Finland Oy, Finlanda Autorizație nr.: 1195PC/08.06.2026	AUTORIZARE DUPA OMOLOGARE DIN <u>OLANDA</u>	CULTURI ORNAMENTALE (GERBERĂ, CRIZANTEME*) (SPATII PROTEJATE): <i>Sclerotinia sclerotiorum</i>, <i>Sclerotinia minor</i> • 2 - 4 kg/ha Se aplică înainte sau în timpul semănatului/ plantatului, prin încorporare în sol la 5-10 cm; Max. 1 tratament/ an. CICOARE RĂDĂCINI (CÂMP): <i>Sclerotinia sclerotiorum</i>, <i>Sclerotinia minor</i> • 50 g /tona Se aplică după recoltarea rădăcinilor, înainte de depozitarea la rece; Max. 1 tratament/ an. MORCOV (TRATAMENT POST-RECOLTARE) (CÂMP): <i>Sclerotinia sclerotiorum</i>, <i>Sclerotinia minor</i> • 50 g /tona Se aplică după recoltare, înainte de depozitarea la rece; Max. 1 tratament/ an. LEGUME (FASOLE) (CÂMP): <i>Sclerotinia sclerotiorum</i>, <i>Sclerotinia minor</i> • 2 - 4 kg/ha Se aplică înainte sau în timpul semănatului/ plantatului, prin încorporare în sol la 5-10 cm; Max. 1 tratament/ an. LEGUME (FASOLE BOB*, SALATĂ*) (SERĂ): <i>Sclerotinia sclerotiorum</i>, <i>Sclerotinia minor</i> • 2 - 4 kg/ha	<u>UTILIZARE PROFESIONALA/ NEPROFESIONAL</u>



				Se aplică înainte sau în timpul semănatului/ plantatului, prin încorporare în sol la 5-10 cm; Max. 1 tratament/ an. *Utilizări minore în România conform Ordinului 200/2020 al MADR pentru care nu s-au efectuat teste de eficacitate.	
3.	HERITAGE 500 g/kg azoxistrobin	Syngenta Agro SRL, România Autorizație nr.: 1196PC/08.06.2026	AUTORIZARE DUPA OMOLOGARE DIN FRANTA	GAZON: <i>Colletotrichum graminicola</i>, <i>Drechslera poae</i>, <i>Fusarium</i> spp., <i>Gaeumannomyces graminis</i>, <i>Sclerotium rolfsii</i>, <i>Puccinia</i> spp., <i>Rhizoctonia solani</i>, <i>Uromyces</i> spp., <i>Monographella nivalis</i> • 500 g/ha Se aplică de la înfrățire până la intrarea în repaus (BBCH 21-95); Se aplică astfel: Max. 2 tratamente/an la interval de minim 14 zile între aplicări (aplicate primăvara sau vara); Max. 1 tratament aplicat primăvara + 1 tratament aplicat toamna.	ATENȚIE UTILIZARE PROFESIONALĂ
4.	FLINT 50 WG 500 g/kg trifloxistrobin	BAYER SRL, România Autorizație nr.: 1197PC/08.06.2026	AUTORIZARE DUPA OMOLOGARE DIN BELGIA	MĂR (CÂMP): <i>Podosphaera leucotricha</i>, <i>Venturia inaequalis</i> • 0,15 kg/ha (echivalent cu 0,088 g/ha LWA) Se aplică de la faza de buton alb/roz și până la pârguitul fructelor (BBCH 59-85); Max. 3 tratamente/an. PĂR* (CÂMP): <i>Stemphylium vesicarium</i>, <i>Gymnosporangium fuscum</i> • 0,15 kg/ha (echivalent cu 0,088 g/ha LWA) Se aplică de la scuturatul petalelor și până la pârguitul fructelor (BBCH 67-85); Max. 3 tratamente/an. PĂR* (CÂMP): <i>Podosphaera leucotricha</i>, <i>Venturia pirina</i> • 0,15 kg/ha (echivalent cu 0,088 g/ha LWA) Se aplică de la faza de buton alb/roz și până la pârguitul fructelor (BBCH 59-85); Max. 3 tratamente/an. CĂPSUN* (CÂMP ȘI SPATII PROTEJATE): <i>Podosphaera aphanis</i> • 0,15 kg/ha Se aplică de la formarea stolonului și până la primul cules (BBCH 41-87); Max. 2 tratamente/an.	ATENȚIE UTILIZARE PROFESIONALĂ



				<u>PLANTE ORNAMENTALE*</u> <i>(Chrysanthellum, Buxus, Ranunculus, Prunus laurucerasus, Rosier, Kalanchoe si Aster)</i> <u>(CÂMP SI SPATII PROTEJATE):</u> Complex de boli foliare <i>(Calonectria spp., Stigmata carpophila, Erysiphaceae, Puccinia spp., Uromyces spp., Phragmidium spp)</i> • 0,15 kg/ha (15 g/100 L apa) Se aplică preventiv sau la apariția primei infectări; Max. 2 tratamente/an. <u>AFIN*, MERISOR*, COACĂZ* (ALB, ROȘU, NEGRU), AGRISE* (SPATII PROTEJATE):</u> <i>Sphaerotheca mors-uvae</i> • 0,075 kg/ha Max. 2 tratamente/an. <u>KIWI* (CÂMP):</u> <i>Sphaerotheca mors-uvae</i> • 0,083 kg/ha Max. 3 tratamente/an. <u>FASOLE VERDE PĂSTĂI* (CÂMP):</u> <i>Erysiphe pisi</i> • 0,15 kg/ha Max. 2 tratamente/an. <u>FASOLE VERDE PĂSTĂI* (SPATII PROTEJATE):</u> <i>Erysiphe pisi</i> • 0,15 kg/ha (echivalent cu 0.06 kg/ha) Max. 2 tratamente/an. <u>MĂRAR* (CÂMP):</u> <i>Erysiphe heraclei</i> • 0,15 kg/ha Max. 3 tratamente/an. <u>ANGELICĂ* (CÂMP):</u> <i>Septoria apiicola</i> • 0,15 kg/ha Max. 3 tratamente/an. <u>HASMATUCHI*, TELINA*, CHIMEN*, CORIANDRU*, LEUSTEAN*, SMIRNĂ*, PĂTRUNJEL*, ROINITĂ*, MENTĂ*, MAGHIRAN*, CIMBRU*, ROZMARIN* (CÂMP):</u> <i>Erysiphe heraclei</i> • 0,15 kg/ha Max. 3 tratamente/an.
--	--	--	--	---



				BUSUIOC*, SALVIE*, FLORI COMESTIBILE, (PLANTE AROMATICE ȘI MEDICINALE)* (CÂMP): <i>Peronospora</i> spp. • 0,15 kg/ha Max. 3 tratamente/an. *Utilizări minore în România conform Ordinului 200/2020 al MADR pentru care nu s-au efectuat teste de eficacitate.	
5.	AMMARI 200 g/L piraclostrobin	Albaugh TKI d.o.o., Slovenia Autorizație nr.: 1198PC/08.06.2026	AUTORIZARE DUPA OMOLOGARE DIN <u>Republica Cehă</u>	GRÂU DE TOAMNĂ, GRÂU DE PRIMĂVARĂ: <i>Puccinia triticina, Puccinia striiformis</i> • 1,25 L/ha Se aplică primăvara de la începutul alungirii paiului până când primele boabe au ajuns la jumătate din dimensiunea lor finală (BBCH 30-71); Max. 2 tratamente/perioada de vegetație; ORZ DE TOAMNĂ, ORZ DE PRIMĂVARĂ: <i>Puccinia hordei, Rhynchosporium secalis, Pyrenophora teres</i> • 1,25 L/ha Se aplică primăvara de la începutul alungirii paiului până la sfârșitul înspicării: inflorescență complet emergentă (BBCH 30-59); Max. 2 tratamente/perioada de vegetație; SECARĂ DE TOAMNĂ*, SECARĂ DE PRIMĂVARĂ*, TRITICALE*: <i>Puccinia recondita</i> • 1,25 L/ha Se aplică primăvara de la începutul alungirii paiului până când primele boabe au ajuns la jumătate din dimensiunea lor finală (BBCH 30-71); Max. 2 tratamente/perioada de vegetație; GRÂU SPELTA*, GRÂU DURUM*: <i>Puccinia recondita, Puccinia striiformis</i> • 1,25 L/ha Se aplică primăvara de la începutul alungirii paiului până când primele boabe au ajuns la jumătate din dimensiunea lor finală (BBCH 30-71); Max. 2 tratamente/perioada de vegetație; *Utilizări minore în România conform Ordinului 200/2020 al MADR pentru care nu s-au efectuat teste de eficacitate	PERICOL UTILIZARE PROFESIONALĂ



6.	CARIAL PRO 40 g/L propamocarb-HCl + 75 g/L mandipropamid	GLOBACHEM NV, BELGIA Autorizație nr.: 1199PC/08.06.2026	AUTORIZARE DUPA OMOLOGARE DIN <u>Republica Cehă</u>	CARTOF: <i>Phytophthora infestans</i> • 1,9 L/ha Se aplică după răsărire (primul lăstar lateral bazal vizibil) până înainte de recoltare (BBCH 21-89); Max. 3 tratamente la interval de minim 7 zile între tratamente.	ATENȚIE UTILIZARE PROFESIONALĂ
7.	TELARON SUPRA 50 g/L protioconazol + 625 g/L sulf	UPL Holdings Coöperatief U.A. Autorizație nr.: 1200PC/08.06.2026	AUTORIZARE DUPA OMOLOGARE DIN <u>POLONIA</u>	GRÂU DE TOAMNĂ: <i>Zymoseptoria tritici</i> , <i>Puccinia striiformis</i> , <i>Puccinia triticina</i> • 4 L/ha Se aplică de la începutul alungirii tulpinii până la sfârșitul înfloririi, când tot spicul este deschis (BBCH 30-69); Max. 2 tratamente. GRÂU DE PRIMĂVARĂ: <i>Zymoseptoria tritici</i> , <i>Puccinia striiformis</i> , <i>Puccinia triticina</i> • 4 L/ha Se aplică de la începutul alungirii tulpinii până la sfârșitul înfloririi, când tot spicul este deschis (BBCH 30-69); Max. 2 tratamente. TRITICALE DE TOAMNĂ*: <i>Zymoseptoria tritici</i> , <i>Puccinia striiformis</i> , <i>Puccinia triticina</i> • 4 L/ha Se aplică de la începutul alungirii tulpinii până la sfârșitul înfloririi, când tot spicul este deschis (BBCH 30-69); Max. 2 tratamente. TRITICALE DE PRIMĂVARĂ*: <i>Zymoseptoria tritici</i> , <i>Puccinia striiformis</i> , <i>Puccinia triticina</i> • 4 L/ha Se aplică de la începutul alungirii tulpinii până la sfârșitul înfloririi, când tot spicul este deschis (BBCH 30-69); Max. 2 tratamente. SECARĂ DE TOAMNĂ*: <i>Puccinia recondita f. sp. recondita</i> • 4 L/ha Se aplică de la începutul alungirii tulpinii până la sfârșitul înfloririi, când tot spicul este deschis (BBCH 30-69); Max. 2 tratamente. GRÂU DURUM*, GRÂU SPELTA*: <i>Zymoseptoria tritici</i> , <i>Puccinia striiformis</i> , <i>Puccinia triticina</i> • 4 L/ha Se aplică de la 7 sau mai mulți frați până la sfârșitul înfloririi, când tot spicul este deschis (BBCH 27-69); Max. 2 tratamente. SECARĂ DE PRIMĂVARĂ*: <i>Puccinia recondita f. sp. recondita</i> • 4 L/ha	ATENȚIE UTILIZARE PROFESIONALĂ



				Se aplică de la 7 sau mai mulți frați până la sfârșitul înfloririi, când tot spicul este deschis (BBCH 27-69); Max. 2 tratamente. *Utilizări minore în România, conform Ordinului MADR nr. 200/2020 pentru care nu s-au efectuat teste de eficacitate.	
8.	AMISTAR GOLD/ (PRIORI GOLD - a doua denumire comercială) 125 g/L azoxistrobin + 125 g/L difenoconazol	Syngenta Agro SRL, ROMANIA Autorizație nr.: 424PC/ 05.06.2018	AUTORIZARE DUPA OMOLOGARE DIN CROATIA	<u>EXTINDEREA DOMENIULUI DE UTILIZARE:</u> <u>GRÂU DE TOAMNĂ, GRÂU DE PRIMĂVARĂ:</u> <i>Septoria tritici, Puccinia recondita, Puccinia striiformis</i> • 0,6-1,0 L/ha Se aplică de la începutul alungirii tulpinii până la înflorirea deplină (BBCH 31-69); Max. 1 tratament. <u>SECARĂ DE TOAMNĂ, SECARĂ DE PRIMĂVARĂ*:</u> <i>Septoria tritici, Puccinia recondita</i> • 0,6-1,0 L/ha Se aplică de la începutul alungirii tulpinii până la înflorirea deplină (BBCH 31-69); Max. 1 tratament. <u>TRITICALE DE TOAMNĂ, TRITICALE DE PRIMĂVARĂ*:</u> <i>Septoria tritici, Puccinia recondita, Puccinia striiformis</i> • 0,6-1,0 L/ha Se aplică de la începutul alungirii tulpinii până la înflorirea deplină (BBCH 31-69); Max. 1 tratament. <u>GRÂU SPELTA DE TOAMNĂ, GRÂU DE PRIMĂVARĂ*:</u> <i>Septoria tritici, Puccinia recondita, Puccinia striiformis</i> • 0,6-1,0 L/ha Se aplică de la începutul alungirii tulpinii până la înflorirea deplină (BBCH 31-69); Max. 1 tratament. *Utilizări minore în România conform Ordinului 200/2020 al MADR pentru care nu s-au efectuat teste de eficacitate.	<u>ATENȚIE</u> <u>UTILIZARE PROFESIONALĂ</u>
9.	RELENYA 50 g/L mefentrifluconazol	BASF AGRO BV, Arnhem (NL), Freienbach Branch, Elvetia Autorizație nr.: 824PC/ 07.12.2022	AUTORIZARE DUPA OMOLOGARE DIN Republica Cehă	<u>EXTINDEREA DOMENIULUI DE UTILIZARE:</u> <u>GRÂU DE TOAMNĂ:</u> <i>Fusarium spp., Microdochium nivale/ Monographella nivalis</i> • 0,1 L/100 kg semințe Tratament sămânță (BBCH 00). <u>SECARĂ DE TOAMNĂ:</u> <i>Urocystis occulta</i> • 0,1 L/100 kg semințe Tratament sămânță (BBCH 00).	<u>ATENȚIE</u> <u>UTILIZARE PROFESIONALĂ</u>



10.	T34 BIOCONTROL/ (IDEMIO -a doua denumire comercială) 12% (minim 1 x 10 ⁹ cfu/g) <i>Trichoderma asperellum</i> , tulpina T34	Biocontrol Technologies, S.L., Spania Autorizație nr.: 350PC/ 29.11.2017	AUTORIZARE DUPA OMOLOGARE DIN <u>GERMANIA</u>	<u>EXTINDEREA DOMENIULUI DE UTILIZARE:</u> <u>CARTOF:</u> <i>Rhizoctonia solani</i> • 0, 250 kg/ha Se aplică la plantare (în brazdă); Max. 1 tratament/cultură/sezon. <u>SFECLĂ FURAJERĂ*, RIDICHE DE ULEI*, PĂSTÂRNAC*, RIDICHI ROSII*, SALATĂ*, BARBA CAPREI*, NAPI COMESTIBILI* (NAPI DE MIRISTE, NAPI DE MAI, ETC.), PĂTRUNJEL RĂDĂCINĂ*:</u> <i>Rhizoctonia solani</i> • 0, 250 kg/ha Se aplică la plantare sau însămânțare; Max. 1 tratament/cultură/sezon. *Utilizări minore în România conform Ordinului 200/2020 al MADR pentru care nu s-au efectuat teste de eficacitate.	<u>ATENȚIE</u> <u>UTILIZARE PROFESIONALĂ</u>
11.	HERA 300 EC 300 g/L protioconazol	Pestila Sp. z o. o., Polonia Autorizație nr.: 1201PC/08.06.2026	AUTORIZARE DUPA OMOLOGARE DIN <u>Republica Cehă</u>	<u>GRÂU DE TOAMNĂ:</u> <i>Septoria tritici /Zymoseptoria tritici</i>, <i>Blumeria graminis</i> • 0,5 - 0,65 L/ha Se aplică primăvara de la sfârșitul înfrățitului până la înflorirea completă (BBCH 29-65); Max. 2 tratamente la interval de 14 zile între tratamente. <u>GRÂU DE PRIMĂVARĂ:</u> <i>Septoria tritici /Zymoseptoria tritici</i>, • 0,5 - 0,65 L/ha Se aplică primăvara de la sfârșitul înfrățitului până la înflorirea completă (BBCH 29-65); Max. 2 tratamente la interval de 14 zile între tratamente. <u>TRITICALE DE TOAMNĂ*, TRITICALE DE PRIMĂVARĂ*:</u> <i>Septoria tritici /Zymoseptoria tritici</i>, <i>Blumeria graminis</i> • 0,5 - 0,65 L/ha Se aplică primăvara de la sfârșitul înfrățitului până la înflorirea completă (BBCH 29-65); Max. 2 tratamente la interval de 14 zile între tratamente. <u>ORZ DE TOAMNĂ*, ORZ DE PRIMĂVARĂ:</u> <i>Pyrenophora teres</i> • 0,5 - 0,65 L/ha Se aplică primăvara de la sfârșitul înfrățitului până la înflorirea completă (BBCH 29-65); Max. 2 tratamente la interval de 14 zile între tratamente.	<u>PERICOL</u> <u>UTILIZARE PROFESIONALĂ</u>



				RAPITĂ DE TOAMNĂ: <i>Alternaria brassicae</i>, <i>Plenodomus lingam</i> • 0,6 L/ha Se aplică toamna în stadiul de 3 până la 9 frunze ale culturii (BBCH 13-19); Max. 1 tratament la interval de 21 zile între tratamente. <i>Alternaria brassicae</i>, <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> • 0,5 - 0,6 L/ha Se aplică primăvara, când 10% din florile de pe racemul principal se deschid, racemul principal se alungește până când 20% din păstăi au atins dimensiunea finală (BBCH 61-72); Max. 2 tratamente la interval de 21 zile între tratamente. *Utilizări minore în România, conform Ordinului MADR nr. 200/2020 pentru care nu s-au efectuat teste de eficacitate.	
--	--	--	--	--	--

REGULATORI DE CREȘTERE

1.	HEKSAL 100 WG 100 g/kg prohexadion de calciu (compus din grupul de ciclohexandionelor)	Innvigo Sp. z.o.o., Polonia Autorizație nr.: 1202PC/08.06.2026	AUTORIZARE DUPA OMOLOGARE DIN POLONIA	MĂR: Regulator de creștere și dezvoltare - reducere dezvoltarea lăstarilor • 1,25 L/ha Se aplică de la începutul creșterii lăstarilor (axele lăstarilor în curs de dezvoltare) până la aproximativ jumătate din dimensiunea finală a fructelor (BBCH 31-75); Max. 2 tratamente. GRÂU DE TOAMNĂ: Regulator de creștere și dezvoltare -reduce tulpina internodala și prevenirea căderii plantelor • 0,6 L/ha Se aplică de la începutul alungirii tulpinii până la deschiderea completă a frunzei stindard (BBCH 30-39); Max. 1 tratament. PĂR*, PĂR ASIATIC*: Regulator de creștere și dezvoltare -reducere dezvoltarea lăstarilor • 1,25 L/ha Se aplică de la începutul creșterii lăstarilor (axele lăstarilor în curs de dezvoltare) până la aproximativ jumătate din dimensiunea finală a fructelor (BBCH 31-75); Max. 2 tratamente.	ATENȚIE UTILIZARE PROFESIONALĂ
----	---	---	--	--	--



				MĂR PĂDURET*: Regulator de creștere și dezvoltare -reducere dezvoltarea lăstarilor • 1,25 L/ha Se aplică de la începutul creșterii lăstarilor (axele lăstarilor în curs de dezvoltare) până la aproximativ jumătate din dimensiunea finală a fructelor (BBCH 31-75); Max. 2 tratamente. GUTUI*: Regulator de creștere și dezvoltare -reducere dezvoltarea lăstarilor • 1,25 L/ha Se aplică de la începutul creșterii lăstarilor (axele lăstarilor în curs de dezvoltare) până la aproximativ jumătate din dimensiunea finală a fructelor (BBCH 31-75); Max. 2 tratamente. MOȘMON*: Regulator de creștere și dezvoltare -reducere dezvoltarea lăstarilor • 1,25 L/ha Se aplică de la începutul creșterii lăstarilor (axele lăstarilor în curs de dezvoltare) până la aproximativ jumătate din dimensiunea finală a fructelor (BBCH 31-75); Max. 2 tratamente. SECARĂ DE PRIMĂVARĂ*: Regulator de creștere și dezvoltare -reduce tulpina internodala și prevenirea căderii plantelor • 0,6 L/ha Se aplică de la începutul alungirii tulpinii până la deschiderea completă a frunzei stindard (BBCH 30-39); Max. 1 tratament. *Utilizări minore în România conform Ordinului 200/2020 al MADR pentru care nu s-au efectuat teste de eficacitate.	
--	--	--	--	--	--

REÎNNOIREA AUTORIZAȚIILOR – (ART. 43 – Reg. (CE) nr. 1107/2009)

ERBICIDE

1.	STOMP AQUA/ (PROWL AQUA - a doua denumire comercială) 455 g/L pendimetalin	BASF AGRO BV, Arnhem (NL), Freienbach Branch, Elvetia Autorizație nr.: 015PC/ 14.12.2012	SMRZ: OLANDA	FLOAREA-SOARELUI: Buruieni monocotiledonate anuale: (<i>Setaria</i>, <i>Echinochloa</i>, <i>Digitaria</i>, <i>Sorghum halepense</i> din sămânță) și unele dicotiledonate anuale • 2,0 - 2,6 L/ha Se aplică preemergent.	ATENȚIE UTILIZARE PROFESIONALĂ
----	--	---	-----------------	---	---



				<u>PORUMB:</u> Buruieni monocotiledonate anuale și unele dicotiledonate • 2,0 - 2,6 L/ha Se aplică preemergent. <u>SOIA:</u> Buruieni monocotiledonate anuale și unele dicotiledonate • 2,0 - 2,6 L/ha Se aplică preemergent. <u>GRÂU, ORZ, SECARĂ:</u> Buruieni monocotiledonate anuale și unele dicotiledonate • 2,0 - 2,4 L/ha Se aplică preemergent. <u>CARTOF:</u> Buruieni monocotiledonate anuale și unele dicotiledonate • 2,0 - 2,6 L/ha Se aplică preemergent. <u>ARPAGIC, CEAPĂ SEMĂNATĂ DIRECT (CULTURI IRIGATE):</u> Buruieni monocotiledonate anuale și unele dicotiledonate • 1,5 - 2,6 L/ha Se aplică preemergent. <u>USTUROI:</u> Buruieni monocotiledonate anuale și unele dicotiledonate • 2,0 - 2,6 L/ha Se aplică preemergent. <u>TOMATE:</u> Buruieni monocotiledonate anuale și unele dicotiledonate • 1,0 - 2,6 L/ha Se aplică preemergent. <u>VINETE:</u> Buruieni monocotiledonate anuale și unele dicotiledonate • 2,0 - 2,6 L/ha Se aplică preemergent. <u>ARDEI:</u> Buruieni monocotiledonate anuale și unele dicotiledonate: • 1,5 - 2,6 L/ha Se aplică preemergent. <u>VITĂ DE VIE, LIVEZI PE ROD:</u> Buruieni monocotiledonate anuale și unele dicotiledonate • 2,0 - 2,6 L/ha Se aplică preemergent. <u>TUTUN:</u> Buruieni monocotiledonate anuale și unele dicotiledonate • 2,0 - 2,6 L/ha Se aplică preemergent.	
--	--	--	--	---	--



2.	CLERAVO 35 g/L imazamox + 250 g/L quinmerac	BASF SE, GERMANIA Autorizație nr.: 107PC/ 22.07.2015	SMRZ: Republica Cehă	RAPITĂ DE TOAMNĂ: (HIBRIZI CLEARFIELD): Buruieni dicotiledonate și monocotiledonate: (<i>Anthemis</i> spp., <i>Brassica napus</i>, <i>Capsela bursa-pastoris</i>, <i>Cirsium arvense</i>, <i>Descuriana sophia</i>, <i>Chenopodium</i> spp., <i>Galium aparine</i>, <i>Matricaria</i> spp., <i>Papaver rhoeas</i>, <i>Polygonum</i> spp., <i>Stellaria media</i>, <i>Veronica</i> spp., <i>Sinapis arvensis</i>, <i>Viola arvensis</i>, samulastra etc.) • 0,7 l/ha cu sau fără adjuvant DASH HC 1 - 1,4 L/ha Se aplică postemergent toamna de la cotiledoane complet dezvoltate - 8 frunze (BBCH 10-18). RAPITĂ DE TOAMNĂ (HIBRIZI CLEARFIELD): Buruieni dicotiledonate și monocotiledonate: (<i>Anthemis</i> spp., <i>Brassica napus</i>, <i>Capsela bursa-pastoris</i>, <i>Cirsium arvense</i>, <i>Descuriana sophia</i>, <i>Chenopodium</i> spp., <i>Galium aparine</i>, <i>Matricaria</i> spp., <i>Papaver rhoeas</i>, <i>Polygonum</i> spp., <i>Stellaria media</i>, <i>Veronica</i> spp., <i>Sinapis arvensis</i>, <i>Viola arvensis</i>, samulastra etc.) • 0,8 - 1 L/ha cu sau fără adjuvant DASH HC 1 L/ha Se aplică postemergent primăvara de la faza de rozeta - înaintea apariției primilor boboci florali BBCH (30-50). RAPITĂ DE PRIMĂVARĂ (HIBRIZI CLEARFIELD): Buruieni dicotiledonate și monocotiledonate: (<i>Anthemis</i> spp., <i>Brassica napus</i>, <i>Capsela bursa-pastoris</i>, <i>Cirsium arvense</i>, <i>Descuriana sophia</i>, <i>Chenopodium</i> spp., <i>Galium aparine</i>, <i>Matricaria</i> spp., <i>Papaver rhoeas</i>, <i>Polygonum</i> spp., <i>Stellaria media</i>, <i>Veronica</i> spp., <i>Sinapis arvensis</i>, <i>Viola arvensis</i>, samulastra etc.) • 0,8 - 1 L/ha cu sau fără adjuvant DASH HC 1 L/ha Se aplică postemergent de la cotiledoane complet dezvoltate până la 8 frunze (BBCH 10-18). Se aplică o dată la 3 ani pe aceeași suprafață.	ATENȚIE UTILIZARE PROFESIONALĂ
3.	MAJOR 300 SL / (CLOE 300 SL - a doua denumire comercială) 300 g/L clopiralid	Innvigo Sp. z.o.o.. Polonia Autorizație nr.: 431PC/ 05.06.2018	SMRZ: POLONIA	RAPITĂ DE TOAMNĂ: Buruieni controlate: (<i>Centaurea cyanus</i>, <i>Matricaria inodora</i>, <i>Cirsium arvensis</i>, <i>Anthemis arvensis</i>, <i>Matricaria chamomilla</i>) • 0,3 - 0,4 L/ha	ATENȚIE UTILIZARE PROFESIONALĂ



				Se aplică primăvara după încetarea vegetației însă nu mai târziu de începutul formării bobocilor floriali (BBCH 50). Buruieni controlate: (<i>Centaurea cyanus</i>, <i>Matricaria inodora</i>, <i>Cirsium arvensis</i>, <i>Anthemis arvensis</i>, <i>Matricaria chamomilla</i>, <i>Galium aparine</i>) • 0,3 L/ha Major 300 SL (CLOE 300 SL - a doua denumire comercială) + 0,078 L/ha Zorro 300 SL/ Raldico 300 SL - a doua denumire comercială) Se aplică toamna în faza de 3-4 frunze ale culturii de rapiță (BBCH 13-14) sau Se aplică primăvara după începerea vegetației, însă, nu mai târziu de începutul formării bobocilor floriali (BBCH 50). Buruieni controlate: (<i>Centaurea cyanus</i>, <i>Matricaria inodora</i>, <i>Cirsium arvensis</i>, <i>Anthemis arvensis</i>, <i>Matricaria chamomilla</i>, <i>Galium aparine</i>) • 0,3 L/ha Major 300 SL (CLOE 300 SL - a doua denumire comercială) + 0,078 L/ha Zorro 300 SL/ Raldico 300 SL - a doua denumire comercială) + 1,5 L/ha Mezotop 500 SC/ Metax 500 SC SL - a doua denumire comercială) Se aplică toamna în faza de 3-4 frunze ale culturii de rapiță (BBCH 13-14). Buruieni controlate: (<i>Centaurea cyanus</i>, <i>Matricaria inodora</i>) • 0,2 L/ha Se aplică toamna de la începutul dezvoltării lăstarilor laterali până la faza primului lăstar lateral (BBCH 20-21). Buruieni controlate: (<i>Centaurea cyanus</i>, <i>Matricaria inodora</i>) • 0,2 L/ha Major 300 SL (CLOE 300 SL - a doua denumire comercială) + 0,1 L/ha Asystent+ (adjuvant)) Se aplică toamna de la începutul dezvoltării lăstarilor laterali până la faza primului lăstar lateral (BBCH 20-21).
--	--	--	--	---



				Buruieni controlate: <i>(Centaurea cyanus, Matricaria inodora, Galium aparine)</i> • 0,2 L/ha Major 300 SL (CLOE 300 SL - a doua denumire comercială) + 0,078 L/ha Zorro 300 SL/ Raldico 300 SL - a doua denumire comercială) Se aplică toamna de la începutul dezvoltării lăstarilor laterali până la faza primului lăstar lateral (BBCH 20-21). Se aplică un singur tratament odată la 3 ani în perioada de vegetație a culturii (fie toamna fie primăvara). GRÂU DE TOAMNĂ: Buruieni controlate: <i>(Matricaria inodora, Solanum nigrum, Anthemis arvensis, Galinsoga parviflora, Cirsium arvense, Matricaria chamomilla)</i> • 0,3 - 0,4 L/ha Se aplică primăvara de la începutul înfrățirii până la sfârșitul fazei de înfrățire a cerealelor (BBCH 20-29). Se aplică un singur tratament odată la 2 ani. SFECLA DE ZAHĂR: Buruieni controlate: <i>(Centaurea cyanus, Matricaria inodora, Cirsium arvensis, Anthemis arvensis, Matricaria chamomilla, Galinsoga parviflora, Fallopia convolvulus)</i> • 0,3 - 0,4 L/ha Se aplică în faza de 2-4 frunze ale cuturii de sfeclă (BBCH 12-14). Se aplică un singur tratament odată la 2 ani. Buruieni controlate: <i>(Centaurea cyanus, Matricaria inodora, Cirsium arvensis, Anthemis arvensis, Matricaria chamomilla, Galinsoga parviflora, Fallopia convolvulus)</i> • 0,2 L/ha x 3 Se aplică 3 tratamente la fiecare 3 ani, fiecare a câte 0,2 L/ha, după cum urmează: primul tratament se aplică în faza de 2-4 frunze de sfeclă (BBCH 12-14), iar următoarele tratamente se aplică după apariția ulterioară a buruienilor, la interval minim de 6 - 10 zile. Se aplică o dată la 3 ani pe aceeași suprafață.
--	--	--	--	--



INSECTICIDE

1.	CARPOVIRUSINE 1x10 ¹³ CpGV-M/L <i>Cydia pomonella</i> Granulovirus M (CpGV)	UPL Holdings Cooperatief UA, Olanda Autorizație nr.: 2792/ 14.08.2008	SMRZ: GERMANIA	MĂR: <i>Cydia pomonella</i> • 1 L/ha Se aplică de la începutul formării fructelor până la maturare (BBCH 71 – 89).	ATENȚIE UTILIZARE PROFESIONALĂ
----	--	---	--------------------------	--	---

FUNGICIDE

1.	VITRA 50 WP/ (CUPRIDIN - a doua denumire comercială) 500 g/kg cupru metalic - sub forma de hidroxid de cupru	Industrias Químicas del Vallés (IQV), SPANIA Autorizație nr.: 2095/ 14.02.2001	SMRZ: AUSTRIA	CAIS, CIRES, PIERSIC, NECTARIN, PRUN: <i>Taphrina</i> spp., <i>Monlinia</i> spp., <i>Stigmia carpophila</i>, <i>Pseudomonas</i> spp., <i>Blumeriella</i> spp., <i>Cytospora leucostoma</i> • 1,5 - 2,0 kg/ha Se aplică când 50 % din frunze au căzut până la apariția mugurilor floralii (BBCH 95-53). Max. 4 tratamente la interval de 7 zile între tratamente. MĂR, PĂR, GUTUI, MOSMON, MOSMONUL JAPONEZ: <i>Venturia</i> spp., <i>Nectria</i> spp., <i>Monilinia</i> spp., <i>Erwininia</i> spp., <i>Pseudomonas</i> spp. • 1,5 - 2,0 kg/ha Se aplică de la începutul căderii frunzelor până la apariția mugurilor floralii (BBCH 91-53); Max. 4 tratamente la interval de 7 zile între tratamente. VITA DE VIE: <i>Plasmopara viticola</i>, <i>Elsinoe</i> spp., <i>Colletotrichum</i> spp., <i>Xanthomonas</i> spp. • 1,5 - 2,0 kg/ha Se aplică înainte de înflorit până la coacerea în pârgă și după recoltare la sfârșitul maturării lemnului BBCH (15-83 și 89); Max. 5 tratamente la interval de 7 zile între tratamente. TOMATE, VINETE (CÂMP ȘI SERE): <i>Phytophthora infestans</i>, <i>Alternaria solani</i>, <i>Colletotrichum</i> spp., <i>Pseudomonas</i> spp., <i>Xanthomonas</i> spp. • 1,5 - 2,0 kg/ha Se aplică de la stadiul de 5 frunze adevărate pe tulpina principală până la coacerea deplină (BBCH 15-89); Max. 5 tratamente la interval de 7 zile între tratamente.	ATENȚIE UTILIZARE PROFESIONALĂ
----	---	---	-------------------------	--	---



				CASTRAVETI, DOVLECEI (ZUCCHINI), CASTRAVECIORI (CORNICHON) (CÂMP ȘI SERE): <i>Pseudoperonospora</i> spp., <i>Alternaria</i> spp., <i>Colletotrichum</i> spp. <i>Pseudomonas</i> spp., <i>Xanthomonas</i> spp. • 1,5 - 2,0 kg/ha Se aplică de la apariția primei frunze adevărate pe tulpina principală până la coacerea deplină (BBCH 10-89); Max. 5 tratamente la interval de 7 zile între tratamente. Cantitatea totală de cupru nu trebuie să depășească 28 de kg de cupru/ha în cursul unei perioade de 7 ani.	
2.	ARMETIL COBRE/ (MEVAXIL COBRE - a doua denumire comercială) 80 g/kg metalaxil + 400 g/kg cupru sub formă de oxiclurură de cupru	Industrias Químicas del Vallés (IQV), SPANIA Autorizație nr.: 2077/ 19.12.2000	SMRZ: AUSTRIA	VITA DE VIE: <i>Plasmopara viticola</i> • 2,5 kg/ha Se aplică începând cu apariția celei de a 4-a frunze până când ciorchinii au început să se coloreze (în culoarea specifică varietății/ soiului) (BBCH 14-81); Max. 4 tratamente la interval de 10 zile între tratamente. TOMATE, VINETE (CÂMP ȘI SERE): <i>Phytophthora infestans</i> • 2,5 kg/ha Se aplică de la stadiul de 4 frunze adevărate pe tulpina principală până când 70% din fructe prezintă culoarea tipică de coacere completă (BBCH 14-87); Max. 4 tratamente la interval de 10 zile între tratamente. CARTOF: <i>Phytophthora infestans</i>, <i>Alternaria solani</i> • 2,5 kg/ha Se aplică de la a patra frunză a tulpinii principale desfășurate (> 4 cm) până la sfârșitul înfloririi în prima inflorescență (BBCH 14-69); Max. 4 tratamente la interval de 10 zile între tratamente. Cantitatea totală de cupru nu trebuie să depășească 28 de kg de cupru/ha în cursul unei perioade de 7 ani.	PERICOL UTILIZARE PROFESIONALĂ
3.	CURENOX 50 500 g/kg cupru sub formă de oxiclurură de cupru	Industrias Químicas del Vallés (IQV), SPANIA Autorizație nr.: 2079/ 19.12.2000	SMRZ: AUSTRIA	CAIS, CIREȘ, PIERSIC, NECTARIN, PRUN: <i>Taphrina</i> spp., <i>Monilinia</i> spp., <i>Stigmina carpophila</i>, <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>syringae</i>, <i>Blumeriella jaapii</i>, <i>Cytospora leucostoma</i>, <i>Polystigma rubrum</i> • 1,5 - 2,0 kg/ha	ATENȚIE UTILIZARE PROFESIONALĂ



			Se aplică când 50 % din frunze au căzut până la apariția mugurilor floralii (BBCH 95-53); Max. 4 tratamente la interval de 7 zile între tratamente. <u>MĂR, PĂR, GUTUI, MOSMON, MOSMONUL JAPONEZ:</u> <i>Venturia</i> spp., <i>Nectria galigena</i>, <i>Monilinia</i> spp., <i>Erwinia amylovora</i>, <i>Pseudomonas</i> spp. • 1,5 - 2,0 kg/ha Se aplică de la începutul căderii frunzelor până la apariția mugurilor floralii (BBCH 91-53); Max. 4 tratamente la interval de 7 zile între tratamente. <u>VITA DE VIE:</u> <i>Plasmopara viticola</i>, <i>Elsinoe ampelina</i>, <i>Colletotrichum</i> spp., <i>Xanthomonas ampelina</i> • 1,5 - 2,0 kg/ha Se aplică înainte de înflorit până la coacerea în părgă și după recoltare la sfârșitul maturării lemnului BBCH (15-81 și 91); Max. 5 tratamente la interval de 7 zile între tratamente. <u>TOMATE, VINETE (CÂMP ȘI SERE):</u> <i>Phytophthora infestans</i>, <i>Alternaria solani</i>, <i>Colletotrichum</i> spp., <i>Pseudomonas</i> spp., <i>Xanthomonas</i> spp. • 1,5 - 2,0 kg/ha Se aplică de la stadiul de 5 frunze adevărate pe tulpina principală până la coacerea deplină (BBCH 15-89); Max. 5 tratamente la interval de 7 zile între tratamente. <u>CASTRAVETI, DOVLECEI (ZUCCHINI), CASTRAVETI (CORNICHON) (CÂMP ȘI SERE):</u> <i>Pseudoperonospora</i> spp., <i>Alternaria</i> spp., <i>Colletotrichum</i> spp., <i>Pseudomonas</i> spp., <i>Xanthomonas</i> spp. • 1,5 - 2,0 kg/ha Se aplică de la apariția primei frunze adevărate pe tulpina principală până la coacerea deplină (BBCH 10-89); Max. 5 tratamente la interval de 7 zile între tratamente. Cantitatea totală de cupru nu trebuie să depășească 28 de kg de cupru/ha în cursul unei perioade de 7 ani.	
--	--	--	---	--

CNAPPP a aprobat acordarea unei perioade de grație de 6 luni de la data sedinței (până la data de 08.12.2026) pentru stocurile de produse și etichetele vechi, ca urmare a modificărilor din autorizațiile produselor de protecție a plantelor, după reînnoirea conform art. 43 din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009.



**EXTINDEREA AUTORIZAȚIILOR PENTRU UTILIZĂRI MINORE
(ART. 51 - Reg. (CE) nr. 1107/2009)**

ERBICIDE

1.	HAKSAR TURBO 340 SL 300 g/L MCPA + 40 g/L dicamba	QEMETICA Agricultural Solutions Poland S.A., Polonia Autorizație nr.: 591PC/ 03.02.2020	AUTORIZARE DUPA OMOLOGARE DIN <u>POLONIA</u>	PORUMB: Buruieni dicotiledonate anuale • 1,5 L/ha (aplicare individuală unică) Se aplică postemergent, de la fenofaza de prima frunză desfăcută până la fenofaza de 5 frunze desfăcute (BBCH 11-15); Max. 1 tratament/sezon. • 1,0 - 1,25 L/ha (aplicare unică în amestec cu Nikosar 060 OD – 0,7 L/ha) Se aplică postemergent, de la fenofaza de prima frunză desfăcută până la fenofaza de 5 frunze desfăcute (BBCH 11-15); Max. 1 tratament/sezon. • a) 0,75 – 1,0 L/ha • b) 0,75 – 1,0 L/ha (aplicare divizată) Se aplică astfel: a) fenofaza de 1 frunză -2 frunze desfăcute (BBCH 11-12) b) până la fenofaza de 5 frunze desfăcute (BBCH <15); Max. 2 tratamente/sezon. PORUMB POPCORN*, SORG*, MEI*: Buruieni dicotiledonate anuale • 1,5 L/ha (aplicare individuală unică) Se aplică postemergent, de la fenofaza de prima frunză desfăcută până la fenofaza de 5 frunze desfăcute (BBCH 11-15); Max. 1 tratament/sezon. • a) 0,75 – 1,0 L/ha • b) 0,75 – 1,0 L/ha (aplicare divizată) Se aplică astfel: a) fenofaza de 1 frunză -2 frunze desfăcute (BBCH 11-12) b) până la fenofaza de 5 frunze desfăcute (BBCH <15); Max. 2 tratamente/sezon. TUTUN*: Buruieni dicotiledonate anuale • 2,5 L/ha Se aplică după înflorit până la sfârșitul perioadei de vegetație (BBCH 69 - 99); Max. 1 tratament/sezon. *Utilizări minore în România, conform Ordinului MADR nr. 200/2020 pentru care nu s-au efectuat teste de eficacitate	<u>ATENȚIE</u> <u>UTILIZARE</u> <u>PROFESIONALĂ</u>
----	--	---	---	--	---



INSECTICIDE

1.	TEPPEKI / (AFINTO - a doua denumire comercială) 500 g/kg flonicamid	ISK BIOSCIENCES EUROPE SA, BELGIA Autorizație nr.: 2263/ 01.04.2004	AUTORIZARE DUPA OMOLOGARE DIN GERMANIA + BELGIA	VINETE* (SPATII PROTEJATE): Afide (ex: <i>Myzus persicae</i>) • 0,08 kg/ha Talia plantelor < 50cm • 0,12 kg/ha Talia plantelor 50 - 125 cm • 0,16 kg/ha Talia plantelor > 125 cm PEPENE GALBEN* (SPATII PROTEJATE): Afide (ex: <i>Myzus persicae</i>) • 0,08 kg/ha Talia plantelor < 50cm • 0,12 kg/ha Talia plantelor 50 - 125 cm • 0,16 kg/ha Talia plantelor > 125 cm CĂPSUN* (CÂMP SI SPATII PROTEJATE): Afide (ex: <i>Aphis gossypii</i>, <i>Myzus persicae</i>) • 0,14 kg/ha Se aplică când primele flori sunt în stadiul de rozetă până la recoltare (BBCH 55-87) ZMEUR*, MUR* (CÂMP SI SPATII PROTEJATE) Afide (ex: <i>Aphis gossypii</i>, <i>Myzus persicae</i>) • 0,14 kg/ha Se aplică de la apariția primelor frunze până la coacerea primelor fructe (BBCH 10-89) ALTI ARBUȘTI FRUCTIFERI* (AFIN, COACĂZ, MERISOR, AGRIS) (CÂMP SI SPATII PROTEJATE) Afide (ex: <i>Aphis gossypii</i>, <i>Myzus persicae</i>) • 0,14 kg/ha Se aplică de la apariția primelor frunze până la coacerea primelor fructe (BBCH 10-89) DOVLEAC* (CÂMP): Afide • 0,16 kg/ha Se aplică la începutul infestării, de la stadiul de 5 frunze adevărate formate (BBCH 15). DOVLEAC* (SPATII PROTEJATE): Afide, <i>Trialeurodes vaporariorum</i> • 0,04 kg/ha Înălțimea plantei până la 50 cm.	ATENȚIE UTILIZARE PROFESIONALĂ
----	--	--	---	--	---



Se aplică de la apariția dăunătorului, până înainte de recoltare cu cu 1 zi.

- 0,08 kg/ha

Înălțimea plantei > 125cm.

Se aplică de la apariția dăunătorului, până înainte de recoltare cu cu 1 zi..

MORCOV, TELINA DE RĂDĂCINA*, HREAN, TOPINAMBUR*, PĂSTÂRNAC*, PĂTRUNJEL DE RĂDĂCINA*, BARABOI*, RIDICHI*, RIDICHE NEAGRĂ*, NAP*, NAP SUEDEZ*, SCORTONERA* (CÂMP):

Afide

- 0,14 kg/ha

Se aplică la începutul infestării, de la stadiul de 2 frunze adevărate formate (BBCH 12).

VARZĂ FĂRĂ CĂPĂTÂNĂ (KALE), VARZĂ CHINEZEASCĂ (CÂMP):

Afide

- 0,14 kg/ha

Se aplică la începutul infestării, de la stadiul de 2 frunze adevărate formate (BBCH 12).

FASOLE VERDE (PĂSTĂI), FASOLE VERDE OLOAGA (CÂMP):

Afide

- 0,14 kg/ha

Se aplică de la apariția dăunătorului, până înainte de recoltare cu 14 zile.

TELINĂ DE PETIOL*, FENICUL*, RUBARBĂ* (CÂMP):

Afide

- 0,14 kg/ha

Se aplică de la apariția dăunătorului, până înainte de recoltare cu 21 zile.

GRÂU MOALE- EMMER, ALAC, GRÂU MARE- KHORASAN, GRÂU DURUM:

Afide

- 0,16 kg/ha

Se aplică de la stadiul de frunza stindard complet desfășurată până la dimensiunea medie a bobului lăptos (BBCH 39-75).

PLANTE AROMATICE SI CONDIMENTARE CULTIVATE PENTRU FRUNZE (ASMĂTUI*, CEAPĂ VERDE*, ARPAGIC*, TELINA DE FRUNZE*, MĂRAR*, ANGELICA*, CHIMEN*, CORIANDRU*, LEUSTEAN*, SMIRNA*, MACRIS*, PĂTRUNJEL



			<u>SALVIE*, ROZMARIN*, CIMBRISOR*, MĂGHIRAN*, OREGANO*, CIMBRU*, BUSUIOC*, ROINIȚĂ*, MENTĂ*, DAFIN*, TARHON*, HISOP*), FLORI COMESTIBILE* (SPATII PROTEJATE):</u> Afide • 0,16 kg/ha Se aplică de la începutul infestării și/sau când primele simptome devin vizibile. <u>GULIE* (CÂMP):</u> Afide • 0,14 kg/ha Se aplică la începutul infestării, de la stadiul de 2 frunze adevărate formate (BBCH 12). <u>SFECLĂ* (ROSIE, GALBENĂ, ALBĂ) (CÂMP):</u> Afide • 0,14 kg/ha Se aplică de la stadiul de 2 frunze până la rădăcina de sfeclă a ajuns la mărimea de recoltare (BBCH 12 – 49). <u>SEMINTE - VARZĂ DE CĂPĂȚÂNĂ, SEMINTE-VARZĂ CHINEZEASCĂ, SEMINTE - VARZĂ KALE, SEMINTE - ALTE VĂRZOASE DE TIP PAK CHOI, TAT SOI, SEMINTE - KOMATSUNA, SEMINTE - GULIE, SEMINTE - TELINA DE PETIOL, SEMINTE - FENICUL (SPATII PROTEJATE):</u> Afide • 2 g/1000 semințe Se aplică prin picurare pe semințe, pe rând, în timpul semănatului.** <u>SALATA VERDE*, ANDIVE*, SEMINTE – CICOARE (SPATII PROTEJATE):</u> Afide • 2 g/1000 semințe Se aplică prin picurare pe semințe, pe rând, în timpul semănatului.** *Utilizări minore în România conform Ordinului 200/2020 al MADR pentru care nu s-au efectuat teste de eficacitate. **Răsadurile obținute în spații protejate, pot fi transplantate în câmp.
--	--	--	---



2.	FOUNTAIN 5 SC 51,2 g/L fenpiroximat	Sharda Cropchem Espana SL, Spania Autorizație nr.: 980PC/07.11.2024	SMRZ: ROMÂNIA	PORUMB* (PRODUCERE DE SĂMÂNȚĂ): <i>Tetranychus urticae</i> • 0,5-0,75 L/ha Se aplică de la începutul alungirii paiului până la sfârșitul înfloririi: antere uscate vizibile (BBCH 30-69) *Utilizări minore în România, conform Ordinului MADR nr. 200/2020 pentru care nu s-au efectuat teste de eficacitate.	ATENȚIE UTILIZARE PROFESIONALĂ
3.	LEPTOSTAR 200 SL/ (TALENT BLUE – a doua denumire comercială 200 g/L acetamiprid	QEMETICA Agricultural Solutions Poland S.A., Polonia Autorizație nr.: 966PC/25.04.2024	SMRZ: ROMÂNIA	SECARĂ DE TOAMNĂ, TRITICALE DE TOAMNĂ, TRITICALE DE PRIMĂVARĂ: <i>Oulema melanopus</i> • 0,2 L/ha Se aplică odată cu apariția dăunătorilor, de la faza de frunză stindard până la faza de înflorire completă când se formează 50% din antere (BBCH 37- 65). Se aplică 1 tratament/cultura/an.	ATENȚIE UTILIZARE PROFESIONALĂ

FUNGICIDE

1.	KENJA 400 g/L isofetamid	ISK Biosciences Europe NV Autorizație nr.: 548PC/20.11.2019	SMRZ: ROMÂNIA	FETICA*, CICOARE*, SCAROLA*, CRESON SI ALTE MICROPLANTE*, BARBAREA, RUCOLA*, MUSTAR sp.*, CULTURI PENTRU FRUNZE TIP "BABY LEAF" INCLUSIV SPECII CRUCIFERE (CÂMP ȘI SPATII PROTEJATE): <i>Botrytis cinerea, Sclerotinia sp.</i> • 1 L/ha Se aplică după plantare până când se ating frunzele plantelor individuale de pe rând, cu respectarea PHI 21 zile până la recoltare (BBCH 12-26). *Utilizări minore în România, conform Ordinului MADR nr. 200/2020 pentru care nu s-au efectuat teste de eficacitate.	ATENȚIE UTILIZARE PROFESIONALĂ
2.	BOTECTOR 1000 g/kg Aureobasidium pullulans	SAN Agrow Holding GmbH, Austria Autorizație nr.: 651PC/24.11.2020	SMRZ: ROMÂNIA	FRUCTE DE PĂDURE (ZMEURĂ*, MURE*, COACĂZE*, AFINE*, MERISOARE*): <i>Botrytis cinerea</i> • 1kg/ha Se aplică de la prima inflorescență vizibilă - coacere deplină (BBCH 51-89). *Utilizări minore în România, conform Ordinului MADR nr. 200/2020 pentru care nu s-au efectuat teste de eficacitate.	UTILIZARE PROFESIONALĂ



B. APROBAREA CELEI DE - A DOUA DENUMIRI COMERCIALE

Nr. crt.	PRIMA DENUMIRE COMERCIALĂ	A DOUA DENUMIRE COMERCIALĂ	NR. AUTORIZAȚIE/ DATA	DEȚINĂTORUL AUTORIZAȚIEI
1.	INAZUMA	LUTADOR	127PC/22.07.2015	SUMI AGRO EUROPE LIMITED, MAREA BRITANIE
2.	FENUXAR 69 EW	FENOXAGUARD	689PC/22.04.2021	QEMETICA Agricultural Solutions Poland S.A., Polonia
3.	BILLOUX 50 EC	MASSARAT	1117PC/02.12.2025	JT Agro Europe sp. z.o.o., Poland
4.	SOLONTUS	MELIDONI	1125PC/02.12.2025	JT Agro Europe sp. z.o.o., Poland
5.	GRETEG	ULTRACA	776PC/ 23.08.2022	Syngenta Agro SRL, România
6.	XILIVERT	WIKVERT	819PC/07.12.2022	ARVENSIS AGRO S.A., Spania
7.	COSAYR 200 SC	DETRIDO	1099PC/16.06.2025	Adama Agricultural Solutions SRL, România
8.	AGROSAN B	MELCOCID	2722/25.10.2007	KOLLANT S.r.l., ITALIA
9.	BENEVIA	PREZA	501PC/14.03.2019	FMC Agro Operational România
10.	BOOGIE XPRO 400 EC	INPUT XPRO	1005PC/07.11.2024	BAYER SRL, România
11.	ALTIVATE	PROZENIS	953PC/07.03.2024	CAC Chemical GmbH, Germania
12.	DAGONIS	FARVANA	438PC/15.11.2018	BASF AGRO BV, Arnhem (NL), Freienbach Branch, Elveția
13.	OpteraPro	INSEKTRA	1124PC/ 02.12.2025	Nufarm Romania, SRL

C. APROBAREA PERMISELOR DE COMERT PARALEL CONFORM ORDINULUI MADR NR. 60/2013

NR. CRT.	DENUMIRE PRODUS	SOLICITANT	NR. PERMIS DE COMERT PARALEL (PCP)	CULTURI	AGENȚI DE DĂUNARE	DOZA DE APLICARE
1.	ZENIT PRO 250 g/L tebuconazol	S.C. ALCEDO S.R.L.	PCP NR.: 47/08.06.2026	SFECLĂ DE ZAHĂR	Buruieni monocotiledonate anuale	0,8 L/ha - 1,0 L/ha Se aplică postemergent.
					<i>Sorghum halepense</i> (din rizomi)	1,0 L/ha - 1,5 L/ha
					<i>Agropyron repens</i>	1,5 L/ha - 2,0 L/ha
				TOMATE (transplantate), ARDEI, FASOLE DE GRĂDINĂ, CEAPĂ (semănată direct)	Buruieni monocotiledonate anuale	0,8 L/ha Se aplică postemergent.
					<i>Sorghum halepense</i> (din rizomi)	1,0 L/ha Se aplică postemergent.



				CARTOF	Buruieni monocotiledonate anuale	0,7 L/ha - 1,0 L/ha Se aplică postemergent.
					Buruieni monocotiledonate perene	1,5 L/ha Se aplică postemergent.
				SOIA, FASOLE DE CÂMP, FLOAREA SOARELUI	Buruieni monocotiledonate anuale	0,8 L/ha Se aplică postemergent.
					<i>Sorghum halepense</i> (din rizomi)	1,5 L/ha Se aplică postemergent.
				IN	<i>Sorghum halepense</i> (din rizomi)	1,0 L/ha - 1,5 L/ha
				LUCERNĂ	Buruieni monocotiledonate anuale, samulastră	0,5 L/ha Se aplică postemergent.
					<i>Sorghum halepense</i> (din rizomi)	1,0 L/ha - 1,5 L/ha Se aplică postemergent.
				TRIFOI	Buruieni monocotiledonate anuale, samulastră	0,5 L/ha Se aplică postemergent.
					<i>Elymus repens</i>	1,5 L/ha Se aplică postemergent.
				MAZĂRE	Buruieni monocotiledonate anuale (<i>Setaria, Echinochloa</i>)	0,8 L/ha Se aplică postemergent.
					<i>Sorghum halepense</i> (din rizomi)	1,0 L/ha - 1,5 L/ha Se aplică postemergent.
				VIȚA DE VIE	Buruieni monocotiledonate anuale și perene	1,5 L/ha Se aplică postemergent.
				PEPINIERE ȘI CULTURI SILVICE	Buruieni monocotiledonate anuale și perene	1,5 L/ha - 2,0 L/ha
				TUTUN	Buruieni monocotiledonate anuale și perene, inclusiv <i>Sorghum halepense</i> (din rizomi)	1,0 L/ha Se aplică postemergent.
				RAPIȚĂ	Buruieni monocotiledonate anuale, inclusiv samulastră înainte de înfrățire	0,5 L/ha Se aplică postemergent.



2.	SALVATOR AZO 250 g/L azoxistrobin	S.C. ALCEDO S.R.L.	PCP NR.: 48/08.06.2026	CASTRAVEȚI (CÂMP ȘI SPAȚII PROTEJATE)	<i>Erysiphe</i> spp., <i>Oidiopsis</i> spp., <i>Sphaerotheca fuliginea</i> , <i>Pseudoperonospora cubensis</i>	0,75 - 1,0 L/ha (în funcție de gradul de infecție) De la 9 frunze formate până când 80% din fructe s-au maturat (BBCH 19-88).
				TOMATE (CÂMP ȘI SPAȚII PROTEJATE)	<i>Alternaria</i> spp., <i>Leveillula taurica</i> , <i>Phytophthora infestans</i> , <i>Cladosporium</i> spp.	0,75 - 1,0 L/ha (în funcție de gradul de infecție) De la apariția primei inflorescențe până când 80% din fructe s-au maturat (BBCH 51-88).
				ARDEI (CÂMP ȘI SPAȚII PROTEJATE)	<i>Alternaria capsici annui</i> , <i>Alternaria solani</i> , <i>Leveillula taurica</i> , <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> , <i>Botrytis cinerea</i>	0,75 - 1,0 L/ha (în funcție de gradul de infecție) De la apariția primei inflorescențe până când 80% din fructe s-au maturat (BBCH 51-88).
				ARPAGIC* (CÂMP)	<i>Sclerotinia cepivorum</i> , <i>Puccinia allii</i> , <i>Cladosporium allii-porri</i> , <i>Peronospora destructor</i> , <i>Alternaria porri</i>	0,75 - 1,0 L/ha (în funcție de gradul de infecție) De la formarea primelor 3 frunze până la formarea completa a bulbului (BBCH 13-50).
				CEAPĂ (CÂMP)	<i>Sclerotinia cepivorum</i> , <i>Alternaria porri</i> , <i>Peronospora destructor</i> , <i>Cladosporium allii-porri</i> , <i>Puccinia allii</i>	0,75 - 1,0 L/ha (în funcție de gradul de infecție) De la 4 frunze formate până la 50% frunze aplicate (BBCH 14-48).
				CEAPĂ VERDE* (CÂMP)	<i>Sclerotinia cepivorum</i> , <i>Alternaria porri</i> , <i>Peronospora destructor</i> , <i>Cladosporium allii-porri</i> , <i>Puccinia allii</i>	0,75 - 1,0 L/ha (în funcție de gradul de infecție) De la 4 frunze formate până la 50% frunze aplicate (BBCH 14-48).
				MORCOV (CÂMP)	<i>Alternaria dauci</i> , <i>Erysiphe</i> spp.	0,75 - 1,0 L/ha (în funcție de gradul de infecție) De la stadiul de 9 frunze până când 50% din rădăcini s-au maturat (BBCH 19-85).



				CARTOF (CÂMP)	<i>Alternaria spp.</i>	0,75 - 1,0 L/ha (în funcție de gradul de infecție) De la apariția primelor ramificații bazale până la îngălbenirea frunzelor (BBCH 21-91).
				CARTOF (CÂMP)	<i>Rhizoctonia solani</i>	3,0 L/ha (în funcție de gradul de infecție) La plantare sau înainte de plantare, aplicare pe rând prin încorporare în sol (BBCH 00).
				BROCCOLI*	<i>Alternaria brassicae</i> , <i>Albugo candida</i>	0,75 - 1,0 L/ha (în funcție de gradul de infecție) De la 6 frunze formate până la formarea completă a inflorescenței (BBCH 16-49).
				DOVLEAC* ȘI DOVLECEL* (CÂMP ȘI SPAȚII PROTEJATE)	<i>Colletotrichum lagenarium</i> , <i>Erysiphe cichoracearum</i> , <i>Cladosporium cucumerinum</i> , <i>Peronospora spp.</i>	0,75 - 1,0 L/ha (în funcție de gradul de infecție) De la 9 frunze formate până la 80% din fructe s-au maturat (BBCH 16-88).
				CÂPȘUN* (SPAȚII PROTEJATE)	<i>Sphaerotheca macularis</i> , <i>Colletotrichum acutatum</i>	0,75 - 1,0 L/ha (în funcție de gradul de infecție) De la apariția primei inflorescențe până la a 2- a recoltare (BBCH 55-89).
				CONOPIDĂ* (CÂMP ȘI SPAȚII PROTEJATE)	<i>Albugo candida</i> , <i>Alternaria brassicae</i> , <i>Botrytis cinerea</i>	0,75 - 1,0 L/ha (în funcție de gradul de infecție) De la 6 frunze formate până la formarea completă a inflorescenței (BBCH 16-49).
				GRÂU	<i>Alternaria spp.</i> , <i>Fusarium spp.</i> , <i>Erysiphe graminis</i> , <i>Puccinia recondita</i> , <i>Septoria tritici</i> , <i>Septoria nodorum</i> , <i>Pyrenophora tritici- repentis</i>	0,75 - 1,0 L/ha (în funcție de gradul de infecție) De la începutul alungirii paiului până la sfârșitul înfloritului (BBCH 30-69).



				FASOLE (CÂMP)	<i>Ascochyta spp.</i> , <i>Colletotrichum lindemuthianum</i> , <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> , <i>Botrytis cinerea</i> , <i>Uromyces viciae-fabae</i>	0,75 - 1,0 L/ha (în funcție de gradul de infecție) De la apariția primilor lastari până când 20% păstai au dimensiune normală (BBCH 21-72).
				MAZĂRE (CÂMP)	<i>Ascochyta pisi</i> , <i>Peronospora viciae</i> , <i>Botrytis cinerea</i> , <i>Mycosphaerella pinodes</i> ,	0,75 - 1,0 L/ha (în funcție de gradul de infecție) De la faza de buton floral până la sfârșitul perioadei de înflorit (BBCH 51-69).
				ORZ	<i>Rhynchosporium secalis</i> , <i>Fusarium spp.</i> , <i>Erysiphe graminis</i> , <i>Puccinia hordei</i> , <i>Pyrenophora teres</i>	0,75 - 1,0 L/ha (în funcție de gradul de infecție) De la începutul alungirii paiului până la sfârșitul perioadei de înspicare/spicul este complet vizibil (BBCH 30-59).
				PEPENE GALBEN*, PEPENE VERDE (CÂMP ȘI SPAȚII PROTEJATE)	<i>Erysiphe cichoracearum</i> , <i>Spaerotheca fuliginea</i>	0,75 - 1,0 L/ha (în funcție de gradul de infecție) De la stadiul de 9 frunze până când 80% din fructe s-au maturat (BBCH 19-88).
				PORUMB (PRODUCERE DE SĂMÂNȚĂ)	<i>Helminthosporium spp.</i> , <i>Puccinia sorghi</i>	0,75 - 1,0 L/ha (în funcție de gradul de infecție) De la stadiul de alungire a tulpinii de porumb, când internodiile încep să fie vizibile până la sfârșitul perioadei de înflorit (BBCH 30-69).
				RAPIȚĂ	<i>Alternaria brassicae</i> , <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> , <i>Botrytis cinerea</i> , <i>Leptosphaeria maculans</i>	0,75 - 1,0 L/ha (în funcție de gradul de infecție) De la începutul înfloritului până la sfârșitul perioadei de înflorit (BBCH 60-69).



				PLANTE ORNAMENTALE* (CÂMP ȘI SPAȚII PROTEJATE)	<i>Microsphaera spp., Podosphaera xanthii, Puccinia horiana, Sphaerotheca pannosa, Albugo candida, Alternaria spp., Ascochyta sp., Botrytis spp, Cladosporium spp., Colletotrichum spp., Glomerella cingulate, Peronospora spp., Phoma spp., Phytophthora infestans, Plasmopara spp., Septoria spp., Pythium spp., Stemphylium spp.</i>	0,8 - 1,0 L/ha (în funcție de gradul de infecție) În a doua parte a perioadei de vegetație.
				PLANTE ORNAMENTALE* (CÂMP ȘI SPAȚII PROTEJATE)	<i>Rhizoctonia spp.</i>	3,0 L/ha (în funcție de gradul de infecție) Prin încorporare în sol în prima parte a perioadei de vegetație.
				PEPINIERE FORESTIERE	<i>Melampsora capraearum, Colletotrichum trifolii, Glomerella cingulata, Phoma spp., Septoria spp., Lophodermella concolor, Lophodermium pinastri</i>	0,8 - 1,0 L/ha (în funcție de gradul de infecție) În a doua parte a perioadei de vegetație.
				PRAZ (CÂMP)	<i>Alternaria porri, Phytophthora porri, Cladosporium allii-porri, Puccinia allii</i>	0,75 - 1,0 L/ha (în funcție de gradul de infecție) De la stadiul de 6 frunze până când 50% din frunze sunt aplecate (îndoite) (BBCH 14-48).
				SALATĂ* (CÂMP ȘI SPAȚII PROTEJATE)	<i>Erysiphe spp., Bremia lactucae, Sclerotinia sclerotiorum, Botrytis cinerea, Rhizoctonia solani</i>	0,75 - 1,0 L/ha (în funcție de gradul de infecție) De la stadiul de 4 frunze până când căpățâna are mărimea caracteristică soiului (BBCH14-49).
				SECARĂ*	<i>Rhynchosporium secalis, Puccinia recondita</i>	0,75 - 1,0 L/ha (în funcție de gradul de infecție) De la începutul alungirii paiului, până la sfârșitul înfloririi (BBCH 30-69).



				TRITICALE*	<i>Rhynchosporium secalis</i> , <i>Fusarium spp.</i> , <i>Erysiphe graminis</i> , <i>Puccinia recondita</i> , <i>Septoria tritici</i> , <i>Septoria nodorum</i> , <i>Pyrenophora tritici-repentis</i>	0,75 - 1,0 L/ha (în funcție de gradul de infecție) De la începutul alungirii paiului, până la sfârșitul înfloriturii (BBCH 30-69).
				VINETE* (CÂMP ȘI SPAȚII PROTEJATE)	<i>Alternaria solani</i> , <i>Leveillula taurica</i> , <i>Phytophthora infestans</i>	0,75 - 1,0 L/ha (în funcție de gradul de infecție) De la apariția primei inflorescențe până când 80% din fructe s-au maturat (BBCH 51-88).
				VARZĂ (CÂMP ȘI SPAȚII PROTEJATE)	<i>Alternaria brassicicola</i> , <i>Botrytis cinerea</i> , <i>Albugo candida</i>	0,75 - 1,0 L/ha (în funcție de gradul de infecție) De la stadiul de 6 frunze până la formarea completă a căpățânii (BBCH 16-49).
				VARZĂ DE BRUXELLES* (CÂMP ȘI SPAȚII PROTEJATE)	<i>Alternaria brassicae</i> , <i>Albugo candida</i>	0,75 - 1,0 L/ha (în funcție de gradul de infecție) De la stadiul de 6 frunze până la formarea completă a căpățânii (BBCH 16-49).
				*Utilizări minore în România, conform Ordinului MADR nr. 200/2020 pentru care nu s-au efectuat teste de eficacitate.		
3.	SALVATOR ULTRA 125 g/L tebuconazol + 125 g/L protioconazol	S.C. ALCEDO S.R.L.	PCP NR.: 49/08.06.2026	GRÂU	<i>Erysiphe graminis</i> , <i>Septoria tritici</i> , <i>Puccinia recondita</i> , <i>Helminthosporium spp.</i>	0,75 L/ha Se aplică de la începutul alungirii paiului până la sfârșitul înfloriturii (BBCH 30-69).
					<i>Fusarium spp.</i>	0,9 L/ha Se aplică în timpul înfloriturii (BBCH 61-69).
				ORZ	<i>Erysiphe graminis f. sp. hordei</i> , <i>Rhynchosporium secalis</i> , <i>Pyrenophora teres</i> , (sin. <i>Drechslera teres</i>), <i>Helminthosporium sativum</i>	0,75 L/ha Se aplică de la începutul alungirii paiului până la sfârșitul înfloriturii (BBCH 30-69).
				PORUMB	<i>Fusarium spp.</i>	1,0 L/ha Se aplică în timpul înfloriturii (BBCH 61-69).



4.	TEPYKAMID 500 g/kg flonicamid	THE NET CONNECTION SOLUTIONS SRL	PCP NR.: 50/08.06.2026	MĂR	<i>Dysaphis plantaginea</i>	0,15 kg/ha Se aplică de la finalul înfloririi până la dezvoltarea fructului (BBCH 69-75).
				PIERSIC*	<i>Myzus persicae</i>	0,120 - 0,140 kg/ha Se aplică de la finalul înfloririi până la dezvoltarea fructului (BBCH 69-75), în funcție de gradul de infestare.
				PRUN	<i>Hyalopterus pruni</i>	0,120 - 0,140 kg/ha Se aplică de la sfârșitul înfloririi până la dezvoltarea fructului (BBCH 69-75), în funcție de gradul de infestare.
				ARDEI (CÂMP)	<i>Myzus persicae</i>	0,120-0,140 kg/ha Se aplică de la 6-8 frunze până la recoltare (BBCH 16/18-99).
				PLANTE ORNAMENTALE DIN PARCURI ȘI GRĂDINI*	<i>Macrosiphon rosae</i>	0,120-0,140 kg/ha Se aplică în funcție de gradul de infestare.
				CARTOF (INDUSTRIE, AMIDON, CONSUM)	<i>Afide</i>	0,160 kg/ha Se aplică de la apariția primelor frunze până la înflorire (de la BBCH 10- 11 până la BBCH 51). Nu se aplică împreună cu uleiuri minerale sau adjuvanți pe bază de ulei.
				CARTOF PENTRU SĂMÂNȚĂ	<i>Afide</i>	0,160 kg/ha Se aplică de la apariția primelor frunze până la apariția celei de-a 5-a frunze (de la BBCH 10-11 până la BBCH 15).
				CAIS*	<i>Myzus persicae</i> , <i>Brachycaudus schwartzi</i>	0,140 kg/ha Se aplică de la prima frunză desfăcută până la căderea fructelor după înflorire (BBCH 11-71).



				CIREȘ*	<i>Myzus cerasi</i> , <i>Myzus persicae</i>	0,140 kg/ha Se aplică de la prima frunză desfăcută până la căderea fructelor după înflorire (BBCH 11-71).
				VARZA ALBA, VARZA DE BRUXELLES*	Afide (ex. <i>Brevicoryne brassicae</i>) <i>Aleyrodes proletella</i>	0,140 kg/ha Se aplică de la prima frunză desfăcută până la căderea fructelor după înflorire (BBCH 11-71).
				MAZARE VERDE*	<i>Myzus persicae</i>	0,140 kg/ha Se aplică din aprilie până în iunie, de la sase frunze formate (cu stipele) sau trei cârcei dezvoltate până la 10% din păstai au atins mărimea caracteristică (BBCH 16-71).
				ORZ, OVĂZ, SECARĂ*	Afide (ex. <i>Schizaphis graminum</i> , <i>Macrosiphum avenae</i> , <i>Rhopalosiphum padi</i>)	0,140 kg/ha Toamna: De la prima frunză desfăcută până la înfrățire (BBCH 11-25). Primăvara: De la stadiul de frunză stindard complet dezvoltată până la maturitate în lapte (BBCH 39-77).
				*Utilizări minore în România, conform Ordinului MADR nr. 200/2020 pentru care nu s-au efectuat teste de eficacitate.		
5.	AMAZO TOP 250 g/L azoxistrobin	THE NET CONNECTION SOLUTIONS SRL	PCP NR.: 51/08.06.2026	CASTRAVEȚI (CÂMP ȘI SPAȚII PROTEJATE)	<i>Erysiphe spp.</i> , <i>Oidiopsis spp.</i> , <i>Sphaerotheca fuliginea</i> , <i>Pseudoperonospora cubensis</i>	0,75 - 1,0 L/ha (în funcție de gradul de infecție) De la 9 frunze formate până când 80% din fructe s-au maturat (BBCH 19-88).
				TOMATE (CÂMP ȘI SPAȚII PROTEJATE)	<i>Alternaria spp.</i> , <i>Leveillula taurica</i> , <i>Phytophthora infestans</i> , <i>Cladosporium spp.</i>	0,75 - 1,0 L/ha (în funcție de gradul de infecție) De la apariția primei inflorescențe până când 80% din fructe s-au maturat (BBCH 51-88).



				ARDEI (CÂMP ȘI SPAȚII PROTEJATE)	<i>Alternaria capsici annui</i> , <i>Alternaria solani</i> , <i>Leveillula taurica</i> , <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> , <i>Botrytis cinerea</i>	0,75 - 1,0 L/ha (În funcție de gradul de infecție) De la apariția primei inflorescențe până când 80% din fructe s-au maturat (BBCH 51-88).
				ARPAGIC* (CÂMP)	<i>Sclerotinia cepivorum</i> , <i>Puccinia allii</i> , <i>Cladosporium allii-porri</i> , <i>Peronospora destructor</i> , <i>Alternaria porri</i>	0,75 - 1,0 L/ha (În funcție de gradul de infecție) De la formarea primelor 3 frunze până la formarea completa a bulbului (BBCH 13-50).
				CEAPĂ (CÂMP)	<i>Sclerotinia cepivorum</i> , <i>Alternaria porri</i> , <i>Peronospora destructor</i> , <i>Cladosporium allii-porri</i> , <i>Puccinia allii</i>	0,75 - 1,0 L/ha (În funcție de gradul de infecție) De la 4 frunze formate până la 50% frunze aplicate (BBCH 14-48).
				CEAPĂ VERDE* (CÂMP)	<i>Sclerotinia cepivorum</i> , <i>Alternaria porri</i> , <i>Peronospora destructor</i> , <i>Cladosporium allii-porri</i> , <i>Puccinia allii</i>	0,75 - 1,0 L/ha (În funcție de gradul de infecție) De la 4 frunze formate până la 50% frunze aplicate (BBCH 14-48).
				MORCOV (CÂMP)	<i>Alternaria dauci</i> , <i>Erysiphe spp.</i>	0,75 - 1,0 L/ha (În funcție de gradul de infecție) De la stadiul de 9 frunze până când 50% din rădăcini s-au maturat (BBCH 19-85).
				CARTOF (CÂMP)	<i>Alternaria spp.</i>	0,75 - 1,0 L/ha (În funcție de gradul de infecție) De la apariția primelor ramificații bazale până la îngălbenirea frunzelor (BBCH 21-91).
				CARTOF (CÂMP)	<i>Rhizoctonia solani</i>	3,0 L/ha (În funcție de gradul de infecție) La plantare sau înainte de plantare, aplicare pe rând prin încorporare în sol (BBCH 00).



				BROCCOLI*	<i>Alternaria brassicae</i> , <i>Albugo candida</i>	0,75 - 1,0 L/ha (în funcție de gradul de infecție) De la 6 frunze formate până la formarea completă a inflorescenței (BBCH 16-49).
				DOVLEAC* ȘI DOVLECEL* (CÂMP ȘI SPAȚII PROTEJATE)	<i>Colletotrichum lagenarium</i> , <i>Erysiphe cichoracearum</i> , <i>Cladosporium cucumerinum</i> , <i>Peronospora</i> spp.	0,75 - 1,0 L/ha (în funcție de gradul de infecție) De la 9 frunze formate până la 80% din fructe s-au maturat (BBCH 16-88).
				CĂPȘUN* (SPAȚII PROTEJATE)	<i>Sphaerotheca macularis</i> , <i>Colletotrichum acutatum</i>	0,75 - 1,0 L/ha (în funcție de gradul de infecție) De la apariția primei inflorescențe până la a 2- a recoltare (BBCH 55-89).
				CONOPIDĂ* (CÂMP ȘI SPAȚII PROTEJATE)	<i>Albugo candida</i> , <i>Alternaria brassicae</i> , <i>Botrytis cinerea</i>	0,75 - 1,0 L/ha (în funcție de gradul de infecție) De la 6 frunze formate până la formarea completă a inflorescenței (BBCH 16-49).
				GRÂU	<i>Alternaria</i> spp., <i>Fusarium</i> spp., <i>Erysiphe graminis</i> , <i>Puccinia recondita</i> , <i>Septoria tritici</i> , <i>Septoria nodorum</i> , <i>Pyrenophora tritici-repentis</i>	0,75 - 1,0 L/ha (în funcție de gradul de infecție) De la începutul alungirii paiului până la sfârșitul înfloriturii (BBCH 30-69).
				FASOLE (CÂMP)	<i>Ascochyta</i> spp., <i>Colletotrichum lindemuthianum</i> , <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> , <i>Botrytis cinerea</i> , <i>Uromyces viciae-fabae</i>	0,75 - 1,0 L/ha (în funcție de gradul de infecție) De la apariția primilor lastari până când 20% păstai au dimensiune normală (BBCH 21-72).
				MAZĂRE (CÂMP)	<i>Ascochyta pisi</i> , <i>Peronospora viciae</i> , <i>Botrytis cinerea</i> , <i>Mycosphaerella pinodes</i> ,	0,75 - 1,0 L/ha (în funcție de gradul de infecție) De la faza de buton floral până la sfârșitul perioadei de înflorit (BBCH 51-69).



				ORZ	<i>Rhynchosporium secalis</i> , <i>Fusarium spp.</i> , <i>Erysiphe graminis</i> , <i>Puccinia hordei</i> , <i>Pyrenophora teres</i>	0,75 - 1,0 L/ha (în funcție de gradul de infecție) De la începutul alungirii paiului până la sfârșitul perioadei de înspicare/spicul este complet vizibil (BBCH 30-59).
				PEPENE GALBEN*, PEPENE VERDE (CÂMP ȘI SPAȚII PROTEJATE)	<i>Erysiphe cichoracearum</i> , <i>Spaerotheca fuliginea</i>	0,75 - 1,0 L/ha (în funcție de gradul de infecție) De la stadiul de 9 frunze până când 80% din fructe s-au maturat (BBCH 19-88).
				PORUMB (PRODUCERE DE SĂMÂNȚĂ)	<i>Helminthosporium spp.</i> , <i>Puccinia sorghi</i>	0,75 - 1,0 L/ha (în funcție de gradul de infecție) De la stadiul de alungire a tulpinii de porumb, când internodiile încep să fie vizibile până la sfârșitul perioadei de înflorit (BBCH 30-69).
				RAPIȚĂ	<i>Alternaria brassicae</i> , <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> , <i>Botrytis cinerea</i> , <i>Leptosphaeria maculans</i>	0,75 - 1,0 L/ha (în funcție de gradul de infecție) De la începutul înfloriturii până la sfârșitul perioadei de înflorit (BBCH 60-69).
				PLANTE ORNAMENTALE* (CÂMP ȘI SPAȚII PROTEJATE)	<i>Microsphaera spp.</i> , <i>Podosphaera xanthii</i> , <i>Puccinia horiana</i> , <i>Sphaerotheca pannosa</i> , <i>Albugo candida</i> , <i>Alternaria spp.</i> , <i>Ascochyta sp.</i> , <i>Botrytis spp.</i> , <i>Cladosporium spp.</i> , <i>Colletotrichum spp.</i> , <i>Glomerella cingulate</i> , <i>Peronospora spp.</i> , <i>Phoma spp.</i> , <i>Phytophthora infestans</i> , <i>Plasmopara spp.</i> , <i>Septoria spp.</i> , <i>Pythium spp.</i> , <i>Stemphylium spp.</i>	0,8 - 1,0 L/ha (în funcție de gradul de infecție) În a doua parte a perioadei de vegetație.
				PLANTE ORNAMENTALE* (CÂMP ȘI SPAȚII PROTEJATE)	<i>Rhizoctonia spp.</i>	3,0 L/ha (în funcție de gradul de infecție) Prin încorporare în sol în prima parte a perioadei de vegetație.



				PEPINIERE FORESTIERE	<i>Melampsora capraearum</i> , <i>Colletotrichum trifolii</i> , <i>Glomerella cingulata</i> , <i>Phoma spp.</i> , <i>Septoria spp.</i> , <i>Lophodermella concolor</i> , <i>Lophoderminum pinastri</i>	0,8 - 1,0 L/ha (în funcție de gradul de infecție) În a doua parte a perioadei de vegetație.
				PRAZ (CÂMP)	<i>Alternaria porri</i> , <i>Phytophthora porri</i> , <i>Cladosporium allii-porri</i> , <i>Puccinia allii</i>	0,75 - 1,0 L/ha (în funcție de gradul de infecție) De la stadiul de 6 frunze până când 50% din frunze sunt aplecate (îndoite) (BBCH 14-48).
				SALATĂ* (CÂMP ȘI SPAȚII PROTEJATE)	<i>Erysiphe spp.</i> , <i>Bremia lactucae</i> , <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> , <i>Botrytis cinerea</i> , <i>Rhizoctonia solani</i>	0,75 - 1,0 L/ha (în funcție de gradul de infecție) De la stadiul de 4 frunze până când căpățâna are marimea caracteristică solului (BBCH14-49).
				SECARĂ*	<i>Rhynchosporium secalis</i> , <i>Puccinia recondita</i>	0,75 - 1,0 L/ha (în funcție de gradul de infecție) De la începutul alungirii paiului, până la sfârșitul înfloritului (BBCH 30-69).
				TRITICALE*	<i>Rhynchosporium secalis</i> , <i>Fusarium spp.</i> , <i>Erysiphe graminis</i> , <i>Puccinia recondita</i> , <i>Septoria tritici</i> , <i>Septoria nodorum</i> , <i>Pyrenophora tritici-repentis</i>	0,75 - 1,0 L/ha (în funcție de gradul de infecție) De la începutul alungirii paiului, până la sfârșitul înfloritului (BBCH 30-69).
				VINETE* (CÂMP ȘI SPAȚII PROTEJATE)	<i>Alternaria solani</i> , <i>Leveillula taurica</i> , <i>Phytophthora infestans</i>	0,75 - 1,0 L/ha (în funcție de gradul de infecție) De la apariția primei inflorescențe până când 80% din fructe s-au maturat (BBCH 51-88).
				VARZĂ (CÂMP ȘI SPAȚII PROTEJATE)	<i>Alternaria brassicicola</i> , <i>Botrytis cinerea</i> , <i>Albugo candida</i>	0,75 - 1,0 L/ha (în funcție de gradul de infecție) De la stadiul de 6 frunze până la formarea completă a căpățânii (BBCH 16-49).



				VARZĂ DE BRUXELLES* (CÂMP ȘI SPAȚII PROTEJATE)	<i>Alternaria brassicae</i> , <i>Albugo candida</i>	0,75 - 1,0 L/ha (în funcție de gradul de infecție) De la stadiul de 6 frunze până la formarea completă a căpățânii (BBCH 16-49).
*Utilizări minore în România, conform Ordinului MADR nr. 200/2020 pentru care nu s-au efectuat teste de eficacitate.						
6.	QUIZIL 100 g/L propaquizafop	THE NET CONNECTION SOLUTIONS SRL	PCP NR. : 52/08.06.2026	SFECLĂ DE ZAHĂR	Buruieni monocotiledonate anuale	0,8 L/ha - 1,0 L/ha Se aplică postemergent.
					<i>Sorghum halepense</i> (din rizomi)	1,0 L/ha - 1,5 L/ha
					<i>Agropyron repens</i>	1,5 L/ha - 2,0 L/ha
				TOMATE (transplantate), ARDEI, FASOLE DE GRĂDINĂ, CEAPĂ (semănată direct)	Buruieni monocotiledonate anuale	0,8 L/ha Se aplică postemergent.
					<i>Sorghum halepense</i> (din rizomi)	1,0 L/ha Se aplică postemergent.
				CARTOF	Buruieni monocotiledonate anuale	0,7 L/ha - 1,0 L/ha Se aplică postemergent.
					Buruieni monocotiledonate perene	1,5 L/ha Se aplică postemergent.
				SOIA, FASOLE DE CÂMP, FLOAREA SOARELUI	Buruieni monocotiledonate anuale	0,8 L/ha Se aplică postemergent.
					<i>Sorghum halepense</i> (din rizomi)	1,0 L/ha - 1,5 L/ha Se aplică postemergent.
				IN	<i>Sorghum halepense</i> (din rizomi)	1,0 L/ha - 1,5 L/ha
				LUCERNĂ	Buruieni monocotiledonate anuale, samulastră	0,5 L/ha Se aplică postemergent.
					<i>Sorghum halepense</i> (din rizomi)	1,0 L/ha - 1,5 L/ha Se aplică postemergent.
				TRIFOI	Buruieni monocotiledonate anuale, samulastră	0,5 L/ha Se aplică postemergent.
					<i>Elymus repens</i>	1,5 L/ha Se aplică postemergent.



				MAZĂRE	Buruieni monocotiledonate anuale (<i>Setaria</i> , <i>Echinochloa</i>)	0,8 L/ha Se aplică postemergent.
					<i>Sorghum halepense</i> (din rizomi)	1,0 L/ha - 1,5 L/ha Se aplică postemergent.
				VIȚA DE VIE	Buruieni monocotiledonate anuale și perene	1,5 L/ha Se aplică postemergent.
				PEPINIERE ȘI CULTURI SILVICE	Buruieni monocotiledonate anuale și perene	1,5 L/ha - 2,0 L/ha
				TUTUN	Buruieni monocotiledonate anuale și perene, inclusiv <i>Sorghum halepense</i> (din rizomi)	1,0 L/ha Se aplică postemergent.
				RAPIȚĂ	Buruieni monocotiledonate anuale, inclusiv samulastră înainte de înfrățire	0,5 L/ha Se aplică postemergent.
7.	TEPROZOL 125 g/L tebuconazol + 125 g/L protioconazol	THE NET CONNECTION SOLUTIONS SRL	PCP NR.: 53/08.06.2026	GRÂU	<i>Erysiphe graminis</i> , <i>Septoria tritici</i> , <i>Puccinia recondita</i> , <i>Helminthosporium spp.</i>	0,75 L/ha Se aplică de la începutul alungirii paiului până la sfârșitul înfloririi (BBCH 30-69).
					<i>Fusarium spp.</i>	0,9 L/ha Se aplică în timpul înfloririi (BBCH 61-69).
				ORZ	<i>Erysiphe graminis f. sp. hordei</i> , <i>Rhynchosporium secalis</i> , <i>Pyrenophora teres</i> , (sin. <i>Drechslera teres</i>), <i>Helminthosporium sativum</i>	0,75 L/ha Se aplică de la începutul alungirii paiului până la sfârșitul înfloririi (BBCH 30-69).
				PORUMB	<i>Fusarium spp.</i>	1,0 L/ha Se aplică în timpul înfloririi (BBCH 61-69).
8.	KAISO 10 CS 100 g/L lambda cihalotrin	S.C. NETAGRO S.R.L.	PCP NR.: 54/08.06.2026	TOMATE (CÂMP)	Afide: <i>Myzus persicae</i> , <i>Macrosiphum euphorbiae</i> , <i>Aulacorthum solani</i> , etc.	0,075 L/ha Se aplică de la apariția primei inflorescențe până când 50% din fructe au culoare tipică (BBCH 51-85); max. 1 tratament/sezon.



				TOMATE (SPAȚII PROTEJATE)	<i>Trialeurodes vaporarium</i>	0,075 L/ha Se aplică de la apariția primei inflorescențe până când 50% din fructe au culoare tipică (BBCH 51-85); max. 1 tratament/sezon.
				GRÂU DE TOAMNĂ	Afide: <i>Sitobion avenae</i> , <i>Rhopalosiphum padi</i> , etc.	0,075 L/ha Se aplică de la începutul stadiului de burduf (teaca frunzei steag se extinde) până în stadiul de lapte când boabele au ajuns la dimensiunea finală dar încă sunt verzi (BBCH 41-75); max. 1 tratament/sezon.
				RAPIȚĂ DE TOAMNĂ	<i>Meligethes aeneus</i> , <i>Ceutorhynchus napi</i>	0,075 L/ha Se aplică de la apariția bobocilor floralți închiși până la momentul în care petalele devin vizibile, dar bobocii rămân închiși (BBCH 50-59); max. 1 tratament/sezon.

2. REGULAMENTE PUBLICATE ÎN JURNALUL OFICIAL AL UNIUNII EUROPENE ÎN PERIOADA 02.12.2025 - 29.05.2026

1. Regulamentul (UE) 2025/2473 al Comisiei din 5 decembrie 2025 de modificare a anexei IV la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime de reziduuri pentru Betabaculovirus phoperculellae, fier elementar și ulei de rapiță din sau de pe anumite produse.
2. Regulamentul (UE) 2026/140 al Comisiei din 22 ianuarie 2026 de modificare a anexelor II și III la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime pentru reziduurile de acequinocil, clomequat, metalaxil-M, piraclostrobin, sulfoxaflor și trifloxistrobin din sau de pe anumite produse.
3. Regulamentul (UE) 2026/147 al Comisiei din 22 ianuarie 2026 de modificare a anexelor II și V la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime pentru reziduurile de benfluralin, bentiavalicarb și penflufen din sau de pe anumite produse.
4. Regulamentul (UE) 2026/215 al Comisiei din 29 ianuarie 2026 de modificare a anexelor II și V la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime pentru reziduurile de dimoxistrobin, etefon și propamocarb din sau de pe anumite produse.



5. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2026/312 al Comisiei din 10 februarie 2026 de reînnoire a aprobării substanței active maltodextrină ca substanță activă cu risc redus, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului, și de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei.
6. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2026/321 al Comisiei din 12 februarie 2026 de modificare a Regulamentelor de punere în aplicare (UE) 2017/1506 și (UE) nr. 540/2011 în ceea ce privește condițiile de aprobare a substanței active hidrazidă maleică.
7. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2026/351 al Comisiei din 18 februarie 2026 de reînnoire a aprobării substanței active spinosad, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului, și de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei.
8. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2026/355 al Comisiei din 18 februarie 2026 de reînnoire a aprobării substanței active primetanil în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului și de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei.
9. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2026/398 al Comisiei din 18 februarie 2026 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 686/2012 în ceea ce privește alocarea către statele membre, în scopul procedurii de reînnoire, a evaluării substanțelor metconazol și chinolin-8-ol.
10. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2026/372 al Comisiei din 20 februarie 2026 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 în ceea ce privește prelungirea perioadelor de aprobare a substanțelor active 1-decanol, 1-naftilacetamidă, acid 1-naftilacetic, 6-benziladenină, sulfat de aluminiu, boscalid, dodină, esfenvalerat, eugenol, fenpiroximat, fluazifop-P, fluazinam, fluometuron, fluopiram, flutolanil, geraniol, malation, penoxsulam, pinoxaden, prohexadion, proquinazid, prosulfuron, piretrine, piridaben, pirimetanil, sintofen, spiroxamină, sulf și timol.
11. Regulamentul (UE) 2026/742 al Comisiei din 30 martie 2026 de modificare a anexelor II și III la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime pentru reziduurile de ciflufenamid, fenazaquin și nicotină din sau de pe anumite produse.
12. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2026/747 al Comisiei din 31 martie 2026 de aprobare a substanței active bixlozonă în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului, și de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei.
13. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2026/748 al Comisiei din 31 martie 2026 privind un program de control multianual coordonat al Uniunii pentru 2027, 2028 și 2029 vizând asigurarea respectării limitelor maxime de reziduuri de pesticide și evaluarea expunerii consumatorilor la reziduurile de pesticide din și de pe alimentele de origine vegetală și animală și de abrogare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2025/854.
14. Regulamentul (UE) 2026/751 al Comisiei din 31 martie 2026 de rectificare a Regulamentului (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime de reziduuri pentru flupiradifuron și fosfonat de potasiu din sau de pe anumite produse.
15. Regulamentul (UE) 2026/752 al Comisiei din 31 martie 2026 de modificare a anexei IV la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime de reziduuri pentru *Allium fistulosum*, prelucrat, lizat de *Willaertia magna*, hidroxid de magneziu E528, *Onobrychis viciifolia* (sparceta) sub formă de granule uscate și extract din semințe de *Vitis vinifera* L. (extract din semințe de struguri) din sau de pe anumite produse.
16. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2026/765 al Comisiei din 1 aprilie 2026 privind metodele de prelevare de probe și de analizare, și interpretarea rezultatelor, în contextul controalelor oficiale vizând reziduurile de pesticide din și de pe produse alimentare și hrană animală de origine vegetală și animală și de abrogare a Directivei 2002/63/CE.



17.Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2026/824 al Comisiei din 14 aprilie 2026 de rectificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2025/854 în ceea ce privește definiția reziduurilor pentru fosetil-Al și lista produselor care trebuie analizate pentru cationul trimetilsulfoni.

18.Regulamentul (UE) 2026/840 al Comisiei din 15 aprilie 2026 de modificare a anexelor II și III la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime de reziduuri aplicabile compușilor de cupru din sau de pe anumite produse.

19.Rectificare la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2026/351 al Comisiei din 18 februarie 2026 de reînnoire a aprobării substanței active spinosad, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului, și de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei (JO L, 2026/351, 19.2.2026).

20.Regulamentul (UE) 2026/876 al Comisiei din 21 aprilie 2026 de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime de reziduuri pentru acetamiprid, aclonifen, deltametrin, oxatiapiprolin și fosfonați de potasiu din sau de pe anumite produse.

21.Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2026/870 al Comisiei din 21 aprilie 2026 de reînnoire a aprobării substanței active ulei de parafină (CAS 8042-47-5), în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului, și de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei.

22.Rectificare la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2026/312 al Comisiei din 10 februarie 2026 de reînnoire a aprobării substanței active maltodextrină ca substanță activă cu risc redus, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului, și de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei.

23.Rectificare la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2026/355 al Comisiei din 18 februarie 2026 de reînnoire a aprobării substanței active primetanil în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului și de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei.

24.Regulamentul (UE) 2026/1120 al Comisiei din 26 mai 2026 de modificare a anexei III la Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului prin adăugarea a doisprezece coformulanți care nu pot intra în compoziția produselor de protecție a plantelor;

25.Regulamentul (UE) 2026/1123 al Comisiei din 26 mai 2026 de stabilire a cerințelor de etichetare pentru produsele de protecție a plantelor și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 547/2011;

26.Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2026/1154 al Comisiei din 29 mai 2026 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 în ceea ce privește eliminarea substanțelor metoxifenoizid, pentiopirad și amestec de terpenoide QRD 460 din lista substanțelor active aprobate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului.

3. DIVERSE

1. CNAPPP a retras autorizarea produsului de protecție a plantelor **CLERANDA** (autorizație nr. 008PC/ 28.05.2012) cu data de **08.06.2026**, **fără acordarea unei perioade de grație**, ca urmare a solicitării deținătorului de omologare, companiei **BASF Agrochemical Products B.V., Puerto Rico**.

2. CNAPPP a retras autorizarea produsului de protecție a plantelor **ALIOS** (autorizație nr. 019PC/ 11.07.2013) cu data de **08.06.2026**, **fără acordarea unei perioade de grație**, ca urmare a solicitării deținătorului de omologare, compania **BASF SE, GERMANIA**.

3. CNAPPP a retras autorizarea produselor de protecție a plantelor **PREMIS/ (REAL 25 FS - a doua denumire comercială)** (autorizație nr. 231PC/ 20.10.2016) cu data de **08.06.2026**, **fără acordarea unei perioade de grație**, ca urmare a solicitării deținătorului de omologare, compania **BASF SE, GERMANIA**.



4. CNAPPP a retras autorizarea produsului de protecție a plantelor **MIRALON** (autorizație nr. 1028PC/ 17.03.2025) cu data de 08.06.2026, fără acordarea unei perioade de grație, ca urmare a solicitării deținătorului de omologare, compania **BASF SE, GERMANIA**.
5. Ca urmare a nesustinerii, conform art. 43 din Reg. (CE) nr.1107/2009, a produsului de protecție a plantelor **SCALA**, de către deținătorul autorizării, compania **BASF AGRO BV, Arnhem (NL), Freienbach Branch, Elvetia, autorizația nr. 601PC/ 30.06.2020** se retrage de la data de **01.05.2027**, iar pentru stocurile existente pe teritoriul României se acordă din momentul retragerii omologării o perioadă de grație de 6 luni pentru comercializare și distribuire (până la data de **01.11.2027**), la care se adaugă o perioadă de grație de 12 luni pentru depozitare, utilizare și eliminare stocuri de produs la utilizatori (până la data de **01.11.2028**).
6. CNAPPP a respins solicitarea **BIOCHEM S.R.L.** privind asumarea de către România a rolului de stat membru raportor zonal pentru autorizarea unui produs de protecție a plantelor;
7. CNAPPP a aprobat solicitarea **CORTEVA AGRISCIENCE ROMANIA SRL**, privind acordarea unei perioade de grație conform art. 46 din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 pentru stocurile de produse și etichetele vechi, ca urmare a transferului de la deținătorul de autorizație actual **CORTEVA AGRISCIENCE ROMANIA SRL** către noul deținător de autorizație **CORTEVA Crop Solutions ROM SRL**, respectiv se acordă o perioadă de grație de 6 luni de la data sedinței (până la data de **08.12.2026**).
8. Ca urmare a aplicării prevederilor Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2026/1154 al Comisiei din 29 mai 2026 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 în ceea ce privește eliminarea substanțelor metoxifenoimid, pentiopirad și amestec de terpenoide **QRD 460** din lista substanțelor active aprobate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului, autorizația produsului de protecție a plantelor **REQUIEM PRIME** (autorizație nr. 520PC/ 12.07.2019) se retrage la data expirării aprobării substanței active amestec de terpenoide **QRD 460 (10.08.2025)** și se acordă o perioadă de grație de 6 luni pentru comercializare și distribuire (până la data de **10.02.2026**), la care se adaugă o perioadă de grație de 6 luni pentru depozitare, utilizare și eliminare stocuri de produs la utilizatori (până la data de **10.08.2026**).
9. CNAPPP a aprobat recertificarea laboratorului de bune practici experimentale (BPE) pentru compania **SC BASF SRL - Centrul de Competențe Tehnice BASF Romania**.
10. CNAPPP a luat nota de informarea ANF privind nominalizarea doamnei **Georgiana PAȘOI** în calitate de membru titular al Comisiei Naționale de Autorizare a Produselor de Protecție a Plantelor.

3a. SCHIMBĂRI DE DENUMIRI COMERCIALE

11. CNAPPP a aprobat schimbarea celei de - a doua denumiri comerciale **DORALTES 100FS**, a produsului **GAMELAN 100FS** (autorizația nr. 939PC/07.03.2024), în **CELEST NEXT**, ca urmare a solicitării deținătorului autorizației, compania companiei **Innvigo Sp. z.o.o., Polonia**.

3b. SCRISORI DE REPREZENTARE

12. CNAPPP a luat notă de informarea companiei **CAC Chemical GmbH, Germania**, privind desemnarea companiei **Bird & Bird (Belgium) LLP ("Bird & Bird")**, prin domnul **Claudio Mereu** pentru reprezentare și comunicare cu autoritățile române implicate în procesul de autorizare a produselor de protecție a plantelor.
13. CNAPPP a luat notă de informarea companiei **SUMI AGRO EUROPE Limited**, privind desemnarea companiei **RIFCON GmbH, Germania** pentru reprezentare și comunicare cu autoritățile române implicate în procesul de autorizare a unui produs de protecție a plantelor.
14. CNAPPP a luat notă de informarea companiei **SEIPASA SA, Spania**, privind desemnarea doamnei **Andreea Dinu** pentru reprezentare și comunicare cu autoritățile române implicate în procesul de autorizare pentru produsul de protecție a plantelor autorizat în România cu denumirea comercială **FUNGISEI**, conform autorizației nr. 1100PC/ 16.06.2025.



15.CNAPPP a luat notă de informarea companiei **Oro Agri Europe S.A, Portugalia**, privind desemnarea companiei **Artemisa d.o.o., Slovenia**, prin doamna **Bojana ZGONEC** pentru reprezentare și comunicare cu autoritățile române implicate în procesul de autorizare a unui produs de protecție a plantelor.

16.CNAPPP a luat notă de informările companiei **CROP ALLIANCE UNIPESOAL LDA, Portugalia** privind desemnarea companiei **Artemisa d.o.o., Slovenia**, prin doamna **Bojana ZGONEC** pentru reprezentare și comunicare cu autoritățile române implicate în procesul de autorizare a trei produse de protecție a plantelor.

17.CNAPPP a luat notă de informarea companiei **Evergreen Garden Care Poland Sp. z.o.o,Polonia**, privind desemnarea companiei **Artemisa d.o.o., Slovenia**, prin doamna **Bojana ZGONEC** pentru reprezentare și comunicare cu autoritățile române implicate în procesul de autorizare pentru produsul de protecție a plantelor autorizat în România cu denumirea comercială **POLYSECT NATURAL**, conform autorizației nr. 888PC/ 28.09.2023.

18.CNAPPP a luat notă de informarea companiei **SP SOURCON PADENA GmbH, Germania**, privind desemnarea companiei **Artemisa d.o.o., Slovenia**, prin doamna **Bojana ZGONEC** pentru reprezentare și comunicare cu autoritățile române în vederea prelungirii administrative a autorizației produsului de protecție a plantelor autorizat în România cu denumirea comercială **PRORADIX WP**, conform autorizației nr. 346PC/ 29.11.2017.

19.CNAPPP a luat notă de informarea companiei **Tellurium Chemical CO S.R.L., Timisoara**, privind desemnarea companiei **SC Glissando S.R.L., prin doamna Teodora IURAȘCU** pentru reprezentare și comunicare cu autoritățile române implicate în procesul de autorizare a produselor de protecție a plantelor.

20.CNAPPP a luat notă de informarea companiei **Nufarm România SRL**, privind desemnarea doamnei **Cristina OBREJA** pentru reprezentare și comunicare cu autoritățile române implicate în procesul de autorizare a produselor de protecție a plantelor.

21.CNAPPP a luat notă de informarea companiei **Certis Belchim BV, Olanda**, privind desemnarea companiei **Artemisa d.o.o., Slovenia**, prin doamna **Bojana ZGONEC** pentru reprezentare și comunicare cu autoritățile române implicate în procesul de autorizare a produselor de protecție a plantelor.

22.CNAPPP a luat notă de informarea companiei **SINON EU GmbH, GERMANIA**, privind desemnarea companiei **SC Glissando S.R.L., prin doamna Teodora IURAȘCU** pentru reprezentare și comunicare cu autoritățile române implicate în procesul de autorizare pentru produsele de protecție a plantelor autorizate în România cu denumirile comerciale **GLIFOTIM/ (GLADIATOR - a doua denumire comercială)**, conform autorizației nr. 2011 A/ 16.12.2002.

23.CNAPPP a luat notă de informarea companiei **SC ALCEDO SRL**, privind desemnarea companiei **SC ATOZ STYLE SRL prin doamna Andreea ZAMFIRESCU** pentru reprezentare și comunicare cu autoritățile române implicate în procesul de autorizare a produselor de protecție a plantelor.

24.CNAPPP a luat notă de informarea companiei **COPYR S.p.A., Italia**, privind desemnarea companiei **NITA-DRAGOMIR Margarint P.F.A., prin domnul Mărgărint NIȚĂ-DRAGOMIR** pentru reprezentare și comunicare cu autoritățile române implicate în procesul de autorizare a produselor de protecție a plantelor.

25.CNAPPP a luat notă de informarea companiei **Clayton Plant Protection Ltd., Irlanda**, privind desemnarea companiei **Artemisa d.o.o., Slovenia**, prin doamna **Bojana ZGONEC** pentru reprezentare și comunicare cu autoritățile române implicate în procesul de autorizare a unui produs de protecție a plantelor.

26.CNAPPP a luat notă de informarea companiei **PROBELTE S.A.U., SPANIA**, privind desemnarea companiei **Artemisa d.o.o., Slovenia**, prin doamna **Bojana ZGONEC** pentru reprezentare și comunicare cu autoritățile române în vederea prelungirii administrative a autorizației produsului de protecție a plantelor autorizat în România cu denumirea comercială **BELTHIRUL**, conform autorizației nr. 020PC/ 11.07.2013.



27.CNAPPP a luat notă de informarea companiei **W. Neudorff GmbH KG, Germania**, privind desemnarea companiei **Artemisa d.o.o., Slovenia**, prin doamna **Bojana ZGONEC** pentru reprezentare și comunicare cu autoritățile române în vederea prelungirii administrative a autorizațiilor produselor de protecție a plantelor autorizate în România cu denumirile comerciale **PROMANAL AGRO**, conform autorizației nr. 889PC/ 28.09.2023 și **RAPTOL HP**, conform autorizației nr. 1097PC/ 16.06.2025.

28.CNAPPP a luat notă de informarea companiei **Action PIN, Franța**, privind desemnarea companiei **Artemisa d.o.o., Slovenia**, prin doamna **Bojana ZGONEC** pentru reprezentare și comunicare cu autoritățile române implicate în procesul de autorizare pentru produsul de protecție a plantelor autorizat în România cu denumirea comercială **HELIOSULF**, conform autorizației nr. 397PC/28.02.2018.

29.CNAPPP a luat notă de informarea companiei **BARCLAY CHEMICALS R&D Ltd., IRLANDA**, privind desemnarea companiei **Artemisa d.o.o., Slovenia**, prin doamna **Bojana ZGONEC** pentru reprezentare și comunicare cu autoritățile române în vederea prelungirii administrative a autorizațiilor produselor de protecție a plantelor autorizate în România cu denumirile comerciale **BOLT 250/ (CORRIB 250** - a doua denumire comercială), conform autorizației nr. 883PC/ 28.09.2023.

30.CNAPPP a luat notă de informarea companiei **SBM DEVELOPPEMENT S.A.S, FRANTA**, privind desemnarea domnului **Marc Pascal HUOT** pentru reprezentare și comunicare cu autoritățile române implicate în procesul de autorizare a produselor de protecție a plantelor.

31.CNAPPP a luat notă de informarea companiei **Mitsui AgriScience International SA/NV, Belgia**, privind desemnarea companiei **Artemisa d.o.o., Slovenia**, prin doamna **Bojana ZGONEC** pentru reprezentare și comunicare cu autoritățile române în vederea prelungirii administrative a autorizației produsului de protecție a plantelor autorizat în România cu denumirea comercială **AGREE 50 WG**, conform autorizației nr. 730PC/ 07.12.2021.

32.CNAPPP a luat notă de informarea companiei **SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE S.A.S., FRANTA**, privind desemnarea companiei **Artemisa d.o.o., Slovenia**, prin doamna **Gloria - Silvana DUȚU** și domnul **Marius - Sebastian BRATĂȘANU** pentru reprezentare și comunicare cu autoritățile române implicate în procesul de autorizare pentru produsul de protecție a plantelor autorizat în România cu denumirea comercială **PROLIANT**, conform autorizației nr. 1022PC/ 07.11.2024.

33.CNAPPP a luat notă de informarea companiei **CORTEVA Crop Solutions ROM SRL**, privind desemnarea doamnei **Ana Maria PASCARIU** și a doamnei **Vica BONDOC** pentru reprezentare și comunicare cu autoritățile române implicate în procesul de autorizare a produselor de protecție a plantelor.

34.CNAPPP a luat notă de informarea companiei **Nichino Europe Co Ltd., Marea Britanie**, privind desemnarea companiei **Artemisa d.o.o., Slovenia**, prin doamna **Bojana ZGONEC** pentru reprezentare și comunicare cu autoritățile române implicate în procesul de autorizare pentru produsul de protecție a plantelor autorizat în România cu denumirea comercială **MONCUT**, conform autorizației nr. 360PC/ 29.11.2017.

35.CNAPPP a luat notă de informarea companiei **Luxembourg PAMOL (Cyprus) Ltd., Cipru**, privind desemnarea companiei **Artemisa d.o.o., Slovenia**, prin doamna **Bojana ZGONEC** pentru produsele de protecție a plantelor autorizate în România cu denumirea comercială **LBG - 01F34/ (SORIALE LX** - a doua denumire comercială), conform autorizației nr. 258PC/ 19.12.2016.

36.CNAPPP a luat notă de informarea companiei **QEMETICA Agricultural Solutions Poland S.A., Polonia**, privind desemnarea companiei **Artemisa d.o.o., Slovenia**, prin doamna **Bojana ZGONEC** pentru reprezentare și comunicare cu autoritățile române implicate în procesul de autorizare a unui produs de protecție a plantelor.



37. CNAPPP a luat notă de informarea companiei **2022 Environmental Science FR SAS, Franța**, privind desemnarea companiei **LL GREENHOUSE CONSULTING SRL**, prin domnul **Eugeniu-Laurențiu VRÎNCEANU** pentru reprezentare și comunicare cu autoritățile române implicate în procesul de autorizare a produselor de protecție a plantelor.

3c. NOTIFICĂRI TRANSFER PRODUSE

38. La solicitarea companiei **VIVAGRO SARL, FRANȚA**, produsul de protecție a plantelor **LIMOCIDE** (autorizație nr. 658PC/ 24.11.2020), va fi transferat de la deținătorul de autorizație /producătorul **VIVAGRO SARL, FRANȚA** către **VIVAGRO SAS, FRANȚA**.

39. La solicitarea companiei **Ascenza Agro SA, Portugalia**, produsul de protecție a plantelor **ERUNE** (autorizație nr. 771PC/ 23.08.2022), va fi transferat de la deținătorul de autorizație /producătorul **Ascenza Agro SA, Portugalia** către **Globachem NV, Belgia**.

40. La solicitarea companiei **BASF SE, GERMANIA**, următoarele produse de protecție a plantelor, vor fi transferate de la deținătorul de autorizație/producătorul **BASF SE, GERMANIA** către **BASF Agricultural Solutions Deutschland GmbH, GERMANIA**:

Nr. crt.	Denumire produs	Număr autorizație	Detinător de autorizație	Producător
1.	MEDAX TOP/ TAPINIO - a doua denumire comercială)	248PC/20.10.2016	BASF SE, Germania	BASF SE, Germania
2.	KUMULUS DF	1368/21.12.1992	BASF SE, Germania	BASF SE, Germania
3.	BASAGRAN SL/ FIGHTER - a doua denumire comercială)	433PC/05.06.2018	BASF SE, Germania	BASF SE, Germania
4.	BUTISAN S	238PC/20.10.2016	BASF SE, Germania	BASF SE, Germania
5.	RETENGO/ COMET - a doua denumire comercială)	184PC/03.06.2016	BASF SE, Germania	BASF SE, Germania
6.	CANTUS/ LIRASON - a doua denumire comercială)	2760/27.03.2008	BASF SE, Germania	BASF SE, Germania
7.	PICTOR ACTIVE/ CAPARTIS - a doua denumire comercială)	640PC/24.11.2020	BASF SE, Germania	BASF SE, Germania
8.	EMPARTIS/ EMPONOR - a doua denumire comercială)	698PC/09.09.2021	BASF SE, Germania	BASF SE, Germania
9.	STRATOS ULTRA/ FOCUS - a doua denumire comercială)	1372/21.12.1992	BASF SE, Germania	BASF SE, Germania



10.	FLEXITY/ ACRISIO - a doua denumire comercială)	454PC/15.11.2018	BASF SE, Germania	BASF SE, Germania
11.	VIVANDO/ ATTENZO STAR 50 SC - a doua denumire comercială)	071PC/21.01.2015	BASF SE, Germania	BASF SE, Germania
12.	FRONTIER FORTE/ SPECTRUM - a doua denumire comercială)	2089/19.12.2000	BASF SE, Germania	BASF SE, Germania
13.	AKRIS	2742/19.12.2007	BASF SE, Germania	BASF Agricultural Solutions US LLC
14.	WING P	021PC/11.07.2013	BASF SE, Germania	BASF Agricultural Solutions US LLC
15.	EFILOR/ HIGHGATE - a doua denumire comercială)	161PC/16.03.2016	BASF SE, Germania	BASF SE, Germania
16.	ARCHITECT/ ARODARIS - a doua denumire comercială)	775PC/23.08.2022	BASF SE, Germania	BASF SE, Germania
17.	SERCADIS	339PC/28.08.2017	BASF SE, Germania	BASF SE, Germania
18.	IMTREX XE	706PC/09.09.2021	BASF SE, Germania	BASF SE, Germania
19.	PRIAXOR EC/ IMPERIS ULTRA - a doua denumire comercială)	273PC/28.02.2017	BASF SE, Germania	BASF SE, Germania
20.	INOVOR/ MIZONA - a doua denumire comercială)	671PC/22.04.2021	BASF SE, Germania	BASF SE, Germania
21.	SICARIS/ LASONA - a doua denumire comercială)	851PC/25.04.2023	BASF SE, Germania	BASF SE, Germania
22.	LIBRAX/ RIVEXO - a doua denumire comercială)	384PC/28.02.2018	BASF SE, Germania	BASF SE, Germania
23.	PASSAT/ BEYOND - a doua denumire comercială)	864PC/25.04.2023	BASF SE, Germania	BASF Agrochemical Products B.V. Puerto-Rico Branch
24.	MIRALON	1028PC/17.03.2025	BASF SE, Germania	BASF SE, Germania
25.	CLERAVO	107PC/22.07.2015	BASF SE, Germania	BASF Agrochemical Products B.V. Puerto-Rico Branch



26.	CLENTIGA	737PC/07.12.2021	BASF SE, Germania	BASF Agrochemical Products B.V. Puerto-Rico Branch
27.	ALIOS	019PC/11.07.2013	BASF SE, Germania	BASF SE, Germania
28.	BELLIS	036PC/27.02.2014	BASF SE, Germania	BASF SE, Germania
29.	INTEGRAL PRO	437PC/15.11.2018	BASF SE, Germania	BASF Agricultural Solutions US LLC
30.	PASSAT PLUS/ FASTICO PLUS - a doua denumire comercială)	282PC/28.02.2017	BASF SE, Germania	BASF Agrochemical Products B.V. Puerto-Rico Branch
31.	SERIFEL	853PC/25.04.2023	BASF SE, Germania	BASF Agricultural Solutions US LLC
32.	SIGNUM/ SYREX STAR - a doua denumire comercială)	2758/27.03.2008	BASF SE, Germania	BASF SE, Germania
33.	SYSTIVA 333 FS	058PC/29.09.2014	BASF SE, Germania	BASF SE, Germania
34.	MEDAX MAX	341PC/28.08.2017	BASF SE, Germania	BASF SE, Germania
35.	REGALIS PLUS	417PC/28.02.2018	BASF SE, Germania	BASF SE, Germania
36.	CONAXIS	-	BASF SE, Germania	BASF Agricultural Solutions US LLC
37.	BASAGRAN SG	-	BASF SE, Germania	BASF SE, Germania

41. La solicitarea companiei **Agronaturalis Ltd., Anglia**, produsul de protecție a plantelor **KARBICURE/ (IDEUS** - a doua denumire comercială) (autorizație nr. 600PC/ 30.06.2020), va fi transferat de la deținătorul de autorizație **Agronaturalis Ltd., Anglia**, către **DE SANGOSSE S.A.S., FRANȚA**.

42. La solicitarea companiei **CORTEVA AGRISCIENCE ROMANIA SRL**, următoarele produse de protecție a plantelor vor fi transferate, de la deținătorul de autorizație **CORTEVA AGRISCIENCE ROMANIA SRL** către **CORTEVA Crop Solutions ROM S.R.L.:**

Nr. crt.	Denumire produs	Număr autorizație
1.	ARIGO/ COLOMBUS - a doua denumire comercială)	031PC/17.12.2013
2.	BELKAR	469PC/15.11.2018
3.	BELKAR SUPER	972PC/07.11.2024
4.	BASIS	1875/ 15.12.1998
5.	BASIS FORTE	973PC/ 07.11.2024
6.	BIZON/ VIPER COMPACT - a doua denumire comercială)	371PC/29.11.2017
7.	CERLIT SUPER/ STARANE SUPER - a doua denumire comercială)	294PC/ 28.02.2017
8.	CLOSER	537PC/12.07.2019
9.	CURZATE	422PC/05.06.2018
10.	DMA EXTRA 600 SL	2746/19.12.2007



11.	ESTERON EXTRA 600 EC	2655/01.11.2006
12.	FLORAMIX/ BROADWAY STAR - a doua denumire comercială)	2868/11.07.2013
13.	GALERA SUPER/ EFFIGO S - a doua denumire comercială)	2862/18.04.2011
14.	KORVETTO	559PC/20.11.2019
15.	LANCELOT SUPER	2861/18.04.2011
16.	LASER 240 SC/ NEXSUBA - a doua denumire comercială)	2155/11.10.2002
17.	LONTREL 600	509PC/14.03.2019
18.	LUMISENA 200 FS/ PLENARIS - a doua denumire comercială)	747PC/24.03.2022
19.	LUMIPOSA 625 FS/ LUMIPOSA Xtra OSR - a doua denumire comercială)	363PC/29.11.2017
20.	MUSTANG/ VECTOR - a doua denumire comercială)	1862/29.09.1998
21.	MUSTANG FORTE 195 SE	370PC/29.11.2017
22.	PALLAS 75 WG/ SENIOR - a doua denumire comercială)	2829/30.04.2009
23.	PIXXARO	295PC/28.02.2017
24.	PRINCIPAL/ CORDUS - a doua denumire comercială)	2819/18.12.2008
25.	PRINCIPAL PLUS/ CORDUS PLUS - a doua denumire comercială)	038PC/27.02.2014
26.	PRINCIPAL FORTE	811PC/07.12.2022
27.	QUELEX	631PC/30.06.2020
28.	QUEEN	970PC/07.11.2024
29.	QUESTAR	957PC/25.04.2024
30.	REXADE / MANHATTAN - a doua denumire comercială)	910PC/07.03.2024
31.	RINPODE	1104PC/02.12.2025
32.	STORY	1095PC/16.06.2025
33.	TALENDO/ TALIOUS - a doua denumire comercială)	2582/14.12.2005
34.	TALENDO EXTRA	197PC/03.06.2016
35.	TARZEC/ CORELLO - a doua denumire comercială)	911PC/07.03.2024
36.	TITUS 25 DF/ TAROT - a doua denumire comercială)	1312/12.11.1991
37.	TITUS PLUS	2108/11.04.2001
38.	VERBEN	723PC/07.12.2021
39.	VIBALLA	813PC/07.12.2022
40.	VICTUS OD	236PC/20.10.2016
41.	VIPER ON	470PC/15.11.2018
42.	ZORVEC ENTECTA/ ZORVEC ENMAGO - a doua denumire comercială)	833PC/25.04.2023



43.	ZORVEC ENICADE	491PC/14.03.2019
44.	ZORVEC ZELAVIN/ ORONDIS - a doua denumire comercială)	492PC/14.03.2019
45.	ZORVEC VINABEL/ ZORVEC VINATREL - a doua denumire comercială)	807PC/07.12.2022

43. La solicitarea companiei **Industrias Químicas del Vallés S.A. (IQV)**, produsul de protecție a plantelor **TRIUMF 40 WG** (autorizație nr. 2752/ 27.03.2008), va fi transferat de la deținătorul de autorizație **Summit Agro Romania SRL, ROMANIA**, către **Industrias Químicas del Vallés (IQV), SPANIA**.

44. La solicitarea companiei **AFEPASA, Spania**, produsele de protecție a plantelor **AZUMO WG** (autorizație nr. 486PC/ 14.03.2019) și **AFEPASA GREENHOUSE SULPHUR TABLETS** (autorizație nr. 1008PC/ 07.11.2024), vor fi transferate de la deținătorul de autorizație /producătorul **AZUFRERA Y FERTILIZANTES PALLARES, SAU, (AFEPASA)** către **AFEPASA GLOBAL, SAU**.

3d. NOTIFICĂRI LOCĂȚII DE FORMULARE

45. CNAPPP a aprobat noi locații de formulare pentru produsul **TARCZA LAN EXTRA 250 EW** (autorizație nr. 395PC/28.02.2018);

46. CNAPPP a aprobat noi locații de formulare pentru produsele **FORNET EXTRA 6 OD / (SAMSON EXTRA 6 OD - a doua denumire comercială)** (autorizație nr. 2706/11.06.2007) și **NISSHIN 4 SC / (MISTRAL 4 SC - a doua denumire comercială)** (autorizație nr. 1321/13.03.1992);

47. CNAPPP a aprobat o nouă locație de formulare pentru produsul **FLIPPER** (autorizație nr. 463PC/15.11.2018);

48. CNAPPP a aprobat o nouă locație de formulare pentru produsul **EPHON TOP** (autorizație nr. 529PC/12.07.2019);

49. CNAPPP a aprobat o nouă locație de formulare pentru produsele **ROYALTY 50 WG** (autorizație nr. 609PC/30.06.2020), **CASINO ROYALE/ (PROPIDIN - a doua denumire comercială)** (autorizație nr. 606PC/ 30.06.2020), **PROPIDIN ONE/ (SAGARIS PRO - a doua denumire comercială)** (autorizație nr. 931PC/07.03.2024), **ELANZA** (autorizație nr. 786PC/ 23.08.2022), **PRABHA** (autorizație nr. 790PC/23.08.2022), **BOSPIRAC** (autorizație nr. 886PC/ 28.09.2023) și **COBALT/ (PROPIDIN MAX - a doua denumire comercială)** (autorizație nr. 870PC/ 28.09.2023);

50. CNAPPP a aprobat o nouă locație de formulare pentru produsele **MILLER / (LOZZARE - a doua denumire comercială)** (autorizație nr. 862PC/25.04.2023);

51. CNAPPP a aprobat două noi locații de formulare pentru produsul **DIFENOCARE** (autorizație nr. 1050PC/17.03.2025);

52. CNAPPP a aprobat o nouă locație de formulare pentru produsele **KARBICURE/ (IDEUS - a doua denumire comercială)** (autorizație nr. 600PC/30.06.2020);

53. CNAPPP a aprobat o nouă locație de formulare pentru produsele **NASA MAX / (GLYKING - a doua denumire comercială)** (autorizație nr. 738PC/ 07.12.2021);

54. CNAPPP a aprobat o nouă locație de formulare pentru produsele **DIPIRIL/ (DEIRA - a doua denumire comercială)** (autorizație nr. 627PC/ 30.06.2020);

55. CNAPPP a aprobat o nouă locație de formulare pentru produsul **PATROL 2,5 WG** (autorizație nr. 096PC/ 21.01.2015);

56. CNAPPP a aprobat o nouă locație de formulare pentru produsele **PLANTOIL/ (MIDOS OIL - a doua denumire comercială)** (autorizație nr. 614PC/ 30.06.2020);

57. CNAPPP a aprobat o nouă locație de formulare pentru produsele **PLINTO 2,5 EC / (ALFASURE 2,5 EC- a doua denumire comercială)** (autorizație nr. 128PC/ 22.07.2015);

58. CNAPPP a aprobat o nouă locație de formulare pentru produsul **QUIMERA** (autorizație nr. 585PC/03.02.2020);



59. CNAPPP a aprobat o nouă locație de formulare pentru produsele **SATELITE/ (DOMINATOR EXTRA** - a doua denumire comercială) (autorizație nr. 135PC/ 22.07.2015);
60. CNAPPP a aprobat o nouă locație de formulare pentru produsul **BREVIS** (autorizație nr. 577PC/ 20.11.2019);
61. CNAPPP a aprobat două noi locații de formulare pentru produsul **TEBUCARE** (autorizație nr. 1135PC/02.12.2025);
62. CNAPPP a aprobat o nouă locație de formulare pentru produsele **BIZON/ (VIPER COMPACT** - a doua denumire comercială) (autorizație nr. 371PC/ 29.11. 2017);
63. CNAPPP a aprobat o nouă locație de formulare pentru produsele **MEZONIR 340 WG/ (DENAR 340 WG** - a doua denumire comercială) (autorizație nr. 691PC/22.04.2021);
64. CNAPPP a aprobat trei noi locații de formulare pentru produsele **INTEGRAL PRO** (autorizație nr. 437PC/ 15.11.2018);
65. CNAPPP a aprobat două noi locații de formulare pentru produsul **VEXTAMITRON 700 SC** (autorizație nr. 829PC/ 07.12.2022);
66. CNAPPP a aprobat două noi locații de formulare pentru produsele **VextaDim 240 EC/ (GRASP OLEO+** - a doua denumire comercială) (autorizație nr. 471PC/ 15.11.2018);
67. CNAPPP a aprobat două noi locații de formulare pentru produsele **BOOM EFEKT/ (DOMINATOR CLEAN** - a doua denumire comercială) (autorizație nr. 2622/ 02.03.2006).
68. CNAPPP a aprobat nouăsprezece noi locații de formulare pentru produsele **SACRON WG/ (SAFECAP WG** - a doua denumire comercială) (autorizație nr. 119PC/ 22.07.2015).

3e. MODIFICĂRI MAJORE:

69. CNAPPP a aprobat modificarea majoră în compoziția produselor **LYPHASE 36 SL/ (GLYGOLD 36 SL** - a doua denumire comercială) (autorizație nr. 619PC/ 30.06.2020) .

3f. MODIFICĂRI MINORE:

70. CNAPPP a aprobat o modificare minoră în compoziția produselor **DIABLO SC/ (ACAROIL SC** - a doua denumire comercială) (autorizație nr. 403PC/28.02.2018) .
71. CNAPPP a aprobat o modificare minoră în compoziția produsului **BISCONE** (autorizație nr. 989PC/07.11.2024) .
72. CNAPPP a aprobat o modificare minoră în compoziția produsului **AKRIS** (autorizație nr. 2742/19.12.2007) .
73. CNAPPP a aprobat o modificare minoră în compoziția produselor **TRIGOF 050 FS/ (MADRON 050 FS** - a doua denumire comercială) (autorizație nr. 497PC/14.03.2019) .
74. CNAPPP a aprobat o modificare minoră în compoziția produselor **MAKLER 250 SE/ (BOLID 250 SE** - a doua denumire comercială) (autorizație nr. 425PC/05.06.2018) .
75. CNAPPP a aprobat o modificare minoră în compoziția produselor **MILBEKNOCK EC/ (KOROMITE** - a doua denumire comercială) (autorizație nr. 2847/06.11.2009) .
76. CNAPPP a aprobat o modificare minoră în compoziția produsului **BRASAN** (autorizație nr. 2847/11.11.2009) .
77. CNAPPP a aprobat o modificare minoră în compoziția produsului **TRITER 050 FS** (autorizație nr. 449PC/15.11/2018) .
78. CNAPPP a aprobat o modificare minoră în compoziția **HERBOS 110 EC/ (FENOXINN 110 EC** - a doua denumire comercială) (autorizație nr. 328PC/29.06.2017) .
79. CNAPPP a aprobat o modificare minoră în compoziția produsului **INCELO 172,5 WG** (autorizație nr. 726PC/07.12.2021) .
80. CNAPPP a aprobat o modificare minoră în compoziția produsului **BERMECTINE** (autorizație nr. 569PC/20.11.2019).
81. CNAPPP a aprobat o modificare minoră în compoziția produsului **CARAMBA TURBO** (autorizație nr. 2798PC/15.10.2008) .



82.CNAPPP a aprobat o modificare minoră în compoziția produsului **VIPER ON** (autorizație nr. 470PC/ 15.11.2018) .

83.CNAPPP a aprobat o modificare minoră în compoziția produsului **KENJA** (autorizație nr. 548PC/20.11.2019) .

84.CNAPPP a aprobat o modificare minoră în compoziția produsului **ADENGO 465 SC/ (KOLOSS 465 SC** - a doua denumire comercială) (autorizație nr. 2789/ 26.06.2008) .

3g. SURSE DE SUBSTANȚE ACTIVE:

85.CNAPPP a aprobat o sursă adițională pentru substanța activă **hexitiazox** aflată în compoziția produselor **DIABLO SC/ (ACAROIL SC-** a doua denumire comercială) (autorizație nr. 403PC/28.02.2018).

86.CNAPPP a aprobat două surse adiționale pentru substanța activă **azoxistrobin** aflată în compoziția produselor **ROUBAIX/ (ZINGARO** - a doua denumire comercială) (autorizație nr. 879PC/28.09.2023).

87.CNAPPP a aprobat o sursă adițională pentru substanța activă **glifosat** aflată în compoziția produselor **NASA/ (ZENEST** - a doua denumire comercială) (autorizație nr. 368PC/ 29.11.2017).

88.CNAPPP a aprobat o sursă adițională pentru substanța activă **glifosat** aflată în compoziția produselor **NASA MAX/ (GLYKING** - a doua denumire comercială) (autorizație nr. 738PC/ 07.12.2021).

89.CNAPPP a aprobat o sursă adițională pentru substanța activă **azoxistrobin** aflată în compoziția produselor **LEGADO/ (DIAGONAL** - a doua denumire comercială) (autorizație nr. 394PC/ 28.02.2018).

90.CNAPPP a aprobat o sursă adițională pentru substanța activă **clorantraniliprol** aflată în compoziția produsului **VOCASAD** (autorizație nr. 1086PC/16.06.2025).

91.CNAPPP a aprobat o sursă adițională pentru substanța activă **protioconazol** aflată în compoziția produselor **LS INSTINCT PRO** (autorizație nr. 982PC/07.11.2024) și **LS PROTHIO-TEBUC** (autorizație nr. 767PC/23.08.2022).

92.CNAPPP a aprobat o sursă adițională pentru substanța activă **deltametrin** aflată în compoziția produselor **K-OBIOL EC 25** (autorizație nr. 1075/08.11.1984) și **K-OBIOL ULV6** (autorizație nr. 570PC/20.11.2019).

93.CNAPPP a aprobat o sursă adițională pentru substanța activă **mandipropamid**, aflată în compoziția produsului **MAGNAMUS** (autorizație nr. 816PC/07.12.2022).

94.CNAPPP a aprobat o sursă adițională pentru substanța activă **clopirialid** aflată în compoziția produselor **BARILOCHE** (autorizație nr. 466PC/15.11.2018) și **FAWORYT 300 SL/ (DICOSUN** - a doua denumire comercială) (autorizație nr. 466PC/15.11.2018).

95.CNAPPP a aprobat unele surse adiționale pentru substanța activă **captan** aflată în compoziția produselor **CAPTAN 80 WDG/ (CAPTADIN** - a doua denumire comercială) (autorizație nr. 2664/19.12.2006;

96.CNAPPP a aprobat trei surse adiționale pentru substanța activă **protioconazol** și sursă adițională pentru substanța activă **tebuconazol** aflate în compoziția produsului **TOKAMA** (autorizație nr. 933PC/07.03.2024).

97.CNAPPP a aprobat o sursă adițională pentru substanța activă **boscalid** aflată în compoziția produselor **ROYALTY 50 WG/ (SAGARIS** - a doua denumire comercială) (autorizație nr. 609PC/ 30.06.2020), **CASINO ROYALE/ (PROPIDIN** - a doua denumire comercială) (autorizație nr. 606PC/ 30.06.2020), **PROPIDIN ONE/ (SAGARIS PRO** - a doua denumire comercială) (autorizație nr. 931PC/ 07.03.2024), **ELANZA** (autorizație nr. 786PC/23.08.2022), **PRABHA** (autorizație nr. 790PC/ 23.08.2022), **BOSPIRAC** (autorizație nr. 886PC/28.09.2023) și **COBALT/ (PROPIDIN MAX-** a doua denumire comercială) (autorizație nr. 870PC/28.09.2023).



98. CNAPPP a aprobat o sursă adițională pentru substanța activă **pirimetanil** aflată în compoziția produselor **AVALON/ (PYROGAL - a doua denumire comercială)** (autorizație nr. 770PC/23.08.2022).
99. CNAPPP a aprobat o sursă adițională pentru substanța activă **fluroxipir** aflată în compoziția produsului **BONACA** (autorizație nr. 528PC/12.07.2019).
100. CNAPPP a aprobat o sursă adițională pentru substanța activă **dicamba** aflată în compoziția produsului **MURAL** (autorizație nr. 317PC/29.06.2017).
101. CNAPPP a aprobat o sursă adițională pentru substanța activă **azoxistrobin** aflată în compoziția produsului **PROMESA** (autorizație nr. 774PC/ 23.08.2022).
102. CNAPPP a aprobat o sursă adițională pentru substanța activă **emamectin benzoat** aflată în compoziția produselor **AFFIRM** (autorizație nr. 2857/15.02.2019), **AFFIRM TOP** (autorizație nr. 758PC/24.03.2022) și **AFFIRM OPTI** (autorizație nr. 316PC/29.06.2017).
103. CNAPPP a aprobat o sursă adițională pentru substanța activă **etefon** aflată în compoziția produsului **EPHON TOP** (autorizație nr. 529PC/12.0.2019).
104. CNAPPP a aprobat o sursă adițională pentru substanța activă **florpirauxifen-benzil** aflată în compoziția produsului **RINPODE** (autorizație nr. 1104PC/02.12.2025).
105. CNAPPP a aprobat o sursă adițională pentru substanța activă **fosetil de aluminiu** aflată în compoziția produselor **ALFIL WP** (autorizație nr. 112PC/22.07.2015), **ALFIL WG/ ALLEATO WG - a doua denumire comercială)** (autorizație nr. 113PC/22.07.2015) și **MAGMA TRIPLE WG/ ALLEATO TRIPLE WG - a doua denumire comercială)** (autorizație nr. 482PC/14.03.2019).
106. CNAPPP a aprobat o sursă adițională pentru substanța activă **boscalid** aflată în compoziția produsului **LS BOSCALID 500** (autorizație nr. 871PC/ 28.09.2023).
107. CNAPPP a aprobat o sursă adițională pentru safener **mefenpir-dietil** aflată în compoziția produsului **NIANTIC OD** (autorizație nr. 1139PC/02.12.2025).
108. CNAPPP a aprobat o sursă adițională pentru substanța activă **tebuconazol** aflată în compoziția produsului **CLAYTON TEBUCON 250 EW** (autorizație nr. 773PC/23.08.2022).
109. CNAPPP a aprobat o sursă adițională pentru substanța activă **piriproxifen** aflată în compoziția produselor **PROXIMO/ (TALSIO - a doua denumire comercială)** (autorizație nr. 308PC/10.04.2017).
110. CNAPPP a aprobat o sursă adițională pentru substanța activă **metconazol** aflată în compoziția produselor **METSO 60 EC** (autorizație nr. 754PC/24.03.2022), **CAMBIO 60 SL** (autorizație nr. 926PC/07.03.2024) și **MENTOR** (autorizație nr. 873PC/28.09.2023).
111. CNAPPP a aprobat o sursă adițională pentru substanța activă **imazamox** aflată în compoziția produselor **DAVAI/ (SALTUS 80 SL - a doua denumire comercială)** (autorizație nr. 796PC/23.08.2022).
112. CNAPPP a aprobat o sursă adițională pentru substanța activă **piriproxifen** aflată în compoziția produselor **CUSTODIA 320 SC/ (SALVATOR MAX - a doua denumire comercială)** (autorizație nr. 258PC/19.12.2016) și **MAXENTIS/ (KARDAX - a doua denumire comercială)** (autorizație nr. 965PC/25.04.2024).
113. CNAPPP a aprobat trei surse adiționale pentru substanța activă **fluopiram** și pentru substanța activă **protioconazol** aflate în compoziția produsului **LS FLUOP PROTHIO** (autorizație nr. 1132PC/ 02.12.2025);
114. CNAPPP a aprobat o sursă adițională pentru substanța activă **MCPA din sare de dimetilamină** aflată în compoziția produsului **DICOPUR M** (autorizație nr. 1782/ 13.03.1997).
115. CNAPPP a aprobat o sursă adițională pentru substanța activă **fluazinam** aflată în compoziția produselor **SHIRLAN 500 SC/ (DALIMO - a doua denumire comercială)** (autorizație nr. 1881/15.12.1998).
116. CNAPPP a aprobat o sursă adițională pentru substanța activă **ciazofamid** aflată în compoziția produselor **MILDICUT/ (YSAYO - a doua denumire comercială)** (autorizație nr. 2515//22.02.2005).



117. CNAPPP a aprobat o sursă adițională pentru substanța activă **ciazofamid** aflată în compoziția produselor **RANMAN TOP/ (KARITSU** - a doua denumire comercială) (autorizație nr. 105PC/22.07.2015).

118. CNAPPP a aprobat o sursă adițională pentru substanța activă **ciazofamid** aflată în compoziția produsului **VIDERYO F** (autorizație nr. 208PC/20.010.2016).

119. CNAPPP a aprobat o sursă adițională pentru substanța activă **MCPA** aflată în compoziția produselor **BATTERY** (autorizație nr. 734PC/ 07.12.2021) și **EMCEE** (autorizație nr. 527PC/ 12.07.2019).

120. CNAPPP a aprobat o sursă adițională pentru substanța activă **diflufenican** aflată în compoziția produsului **FLASH 500 SC** (autorizație nr. 556PC/ 20.11.2019).

121. CNAPPP a aprobat o sursă adițională pentru substanța activă **lambda-cihalotrin** aflată în compoziția produselor **LABAMBA/ (REXARIS FORTE** - a doua denumire comercială) (autorizație nr. 1018PC/ 07.11.2024).

122. CNAPPP a aprobat o sursă adițională pentru substanța activă **mezotriona** și actualizarea adresei unei surse de formulare pentru s.a. **rim sulfuron** aflate în compoziția produselor **MEZONIR 340 WG/ (DENAR 340 WG** - a doua denumire comercială) (autorizație nr. 691PC/ 22/04/2021).

123. CNAPPP a aprobat o sursă adițională pentru substanța activă **azoxistrobin** aflată în compoziția produsului **CLAYTON AUGUSTA** (autorizație nr. 987PC/ 07.11. 2024).

124. CNAPPP a aprobat o sursă adițională pentru substanța activă **tifensulfuron-metil** aflată în compoziția produselor **OMNERA/ (PROVALIA** - a doua denumire comercială) (autorizație nr. 335PC/ 28.08.2017), **SETRALLAS/ (AMPATO LQM** - a doua denumire comercială) (autorizație nr. 912PC/ 07.03.2024), **HARMONY 50 SG** (autorizație nr.2602/14.12.2005), **TRIPALI/ (CELEXIUM** - a doua denumire comercială) (autorizație nr.181PC/16.03.2016) și **EXPRESS 50 SG/ (FLUENCE** - a doua denumire comercială) (autorizație nr. 2603/14.12.2005).

125. CNAPPP a aprobat două surse adiționale pentru substanțele active **tifensulfuron-metil** și **tribenuron-metil** aflate în compoziția produselor **EVOREL EXPRESS** (autorizație nr. 506PC/ 14.03./2019) și **GRANSTAR SUPER 50 SG/ (CAMEO MAX** - a doua denumire comercială) (autorizație nr. 2674/ 19.12.2006).

126. CNAPPP a aprobat o sursă adițională pentru substanța activă **glifosat** aflată în compoziția produselor **Clinic Xtreme 540 SL/ (URAGANE** - a doua denumire comercială) (autorizație nr. 947PC/ 07.03.2024).

127. CNAPPP a aprobat o sursă adițională pentru substanța activă **clorantraniliprol** aflată în compoziția produselor **AMPLIGO/ (CAREXO** - a doua denumire comercială) (autorizație nr. 186PC/03.06.2016).

3i. NOTIFICĂRI SCHIMBARE PRODUCĂTOR PRODUSE:

128. La solicitarea companiei **DE SANGOSSE SAS, FRANȚA**, produsul de protecție a plantelor **FLIPPER** (autorizație nr. 463PC/15.11.2018) va fi transferat de la producătorul actual **Alpha BioPesticides Limited, Anglia** către noul producător **De Sangosse S.A.S., Franța**.

129. La solicitarea companiei **CAC CHEMICAL GmbH, Germania**, următoarele produse de protecție a plantelor, vor fi transferate de la producătorul actual **HELM AG, Germania** către noul producător **CAC CHEMICAL GmbH, Germania**:

Nr. crt.	Denumire produs	Număr autorizație
1.	RIMURON 25 WG/ (ZEPELIN - a doua denumire comercială)	628PC/30.06.2020
2.	HELMSTAR 75 WG/ (TRIMEO - a doua denumire comercială)	2596/14.12.2005



3.	SIMBA/ (FALSTAR - a doua denumire comercială)	334PC/28.08.2017
4.	DIGATOR/ (GHEPARD FORTE - a doua denumire comercială)	664PC/24.11.2020
5.	ALTIVATE	953PC/07.03.2024

130. La solicitarea companiei **Adama Agricultural Solutions SRL, Romania**, denumirea producătorilor actuali de la diferite entități **ADAMA** și conexe se schimbă în **Adama Agricultural Solutions Ltd, Israel**, pentru următoarele produse de protecție a plantelor:

Nr. crt.	Denumire produs	Număr autorizație
1.	BANJO 500 SC/ CARTALA - a doua denumire comercială)	2716/ 25.10.2007
2.	AVASTEL / (VAZANTI - a doua denumire comercială)	1069PC/17.03.2025
3.	COSAYR 200SC	1099PC/16.06.2025
4.	CUSTODIA 320 SC/ (SALVATOR MAX - a doua denumire comercială)	259PC/19.12.2016
5.	FORAPRO 425 EC	1002PC/07.11.2024
6.	LEANDER 750 EC	2717/25.10.2007
7.	MAGANIC/ (PYRADRA - a doua denumire comercială)	1003PC/07.11.2024
8.	MAVRIK 2 F/ (EVURE - a doua denumire comercială)	2126 /18.12.2001
9.	MAXENTIS/ (KARDAX - a doua denumire comercială)	965PC/25.04.2024
10.	MERPAN 80 WDG/ (FLO-CAPTAN - a doua denumire comercială)	1891/17.02.1999
11.	NIMROD 250 EC	653PC/24.11.2020
12.	PHOENIX/ (STAVENTO - a doua denumire comercială)	650PC/24.11.2020
13.	SORATEL 250 EC/ (BENAFAR - a doua denumire comercială)	1004PC/07.11.2024
14.	SPYRALE	611PC/30.06.2020
15.	Activus 400 SC	327PC/29.06.2017
16.	AGIL 100 EC/ (ZETROLA - a doua denumire comercială)	1345/16.11.1992
17.	ASUNAC	750PC/24.03.2022
18.	BREVIS	577PC/20.11.2019
19.	CONCORDIA 306 SE/ (DICOTON- a doua denumire comercială)	388PC/28.02.2018
20.	DAVAI/ (SALTUS 80 SL - a doua denumire comercială)	796PC/23.08.2022
21.	DIODE 100 SC/ (KELOMAX - a doua denumire comercială)	922PC/07.03.2024
22.	DISCOVERY 250 EC/ (TOMIGAN - a doua denumire comercială)	525PC/12.07.2019



23.	EDAPTIS/ (WILDCAT - a doua denumire comercială)	1067PC/17.03.2025
24.	ETHOSAT 500 SC	945PC/07.03.2024
25.	FOLPAN 80 WDG / (FLOVINE - a doua denumire comercială)	1566/ 30.01.1995
26.	GOLTIX 70 WDG	524PC/12.07.2019
27.	GOLTIX 700 SC	212PC /20.10.2016
28.	GOLTIX GOLD	542PC/12.07.2019
29.	GOLTIX SUPER	669PC/24.11.2020
30.	GOLTIX TITAN	409PC/28.02.2018
31.	KALIF 360 CS/ (AFAENA - a doua denumire comercială)	540PC/12.07.2019
32.	KALIF 480 EC	079PC/21.01.2015
33.	LEOPARD 5 EC/ (ERBISTAR - a doua denumire comercială)	1874/15.12.1998
34.	MODOWN 4 F	831PC/07.12.2022
35.	NICOGAN 40 OD/ (TEFLUREX 40 OD - a doua denumire comercială)	2605/14.12.2005
36.	POWERTWIN SC	2193/12.03.2003
37.	RACER 25 EC	1069/08.11.1984
38.	SHOGUN	PCP nr.17/23.08.2022
39.	STEMPER/ (PIMIENTO TOP - a doua denumire comercială)	705PC/09.09.2021
40.	SULCOTREK 500 SC	284PC/28.02.2017
41.	SULTAN 50 SC/ (MAGISTRAL 50 SC - a doua denumire comercială)	2159/11.10.2002
42.	SULTAN COMPLET/ (BENGALA - a doua denumire comercială)	378PC/29.11.2017
43.	SULTAN TOP/ (TOLMER TOP - a doua denumire comercială)	032PC/17.12.2013
44.	SUNBRIGHT	795PC/23.08.2022
45.	TOLUREX 50 SC	1734/22.02.1996
46.	TOMAHAWK 200 EC/ (TOMIGAN 200 EC - a doua denumire comercială)	668PC/24.11.2020
47.	TOMIGAN XL 102,5 SE/ (TOMAHAWK XL 102,5 SE - a doua denumire comercială)	108PC/22.07.2015
48.	TORNADO SC	2182/16.12.2002
50.	TRIMMER 50 WG/ (TRIBERON - a doua denumire comercială)	215PC/20.10.2016
51.	TRINITY SC	309PC/10.04.2017
52.	ORMET PLUS	719PC/09.09.2021
53.	ORMET	478PC/15.11.2018

131. La solicitarea companiei **Nufarm Romania, SRL**, produsele de protecție a plantelor **KYLEO** (autorizație nr. 862PC/25.04.2023) și **Clinic Xtreme 540 SL/(URAGANE** - a doua denumire comercială) (autorizație nr. 947PC/07.03.2024) vor fi transferate de la producătorului actual **Nufarm GmbH & Co. KG, Austria** către noul producător **Nufarm Crop Products UK limited, UK**.



3j. NOTIFICĂRI MODIFICĂRI ADRESE/DENUMIRI COMPANII:

132. CNAPPP a luat notă de solicitarea companiei **BASF** privind schimbarea denumirii companiei **BASF S.A. în BASF Agricultural Solutions Brasil Ltda.**

133. CNAPPP a luat notă de solicitarea companiei **Proagri Crop Protection România SRL**, privind modificarea adresei acesteia.

134. CNAPPP a luat notă de solicitarea companiei **BASF** privind schimbarea denumirii companiei din **BASF Espanola S.L.U. în BASF Agricultural Solutions Spain S.L.U.**

135. CNAPPP a luat notă de solicitarea companiei **BASF** privind schimbarea denumirii companiei din **BASF Schwarzheide GmbH în BASF Agricultural Solutions Schwarzheide GmbH.**

136. CNAPPP a luat notă de solicitarea companiei **Syngenta Agro SRL, ROMANIA**, privind modificarea adresei acesteia.

137. CNAPPP a luat notă de solicitarea companiei **ANTARIPA PPP S.R.L.**, privind modificarea adresei acesteia.

138. CNAPPP a luat notă de solicitarea companiei **Luxembourg Pamol Ltd., Cipru**, privind modificarea adresei acesteia.

3k. AMBALAJE ADIȚIONALE:

139. CNAPPP a aprobat ambalaje adiționale pentru produsele de protecție a plantelor **PULSAR PLUS/(LISTEGO PLUS - a doua denumire comercială)** (autorizație nr. 282PC/28.02.2017), conform tabelului de mai jos:

AMBALAJE AUTORIZATE			AMBALAJE ADIȚIONALE		
Capacitate	Material	Tip	Capacitate	Material	Tip
0,15 L; 0,25 L; 0,5 L; 1 L	f-HDPE	sticla	0,15 L; 0,25 L; 0,5 L; 1 L	HDPE/PA	sticla
5 L; 10 L; 50 L	f-HDPE	container	5 L; 10 L; 50 L	HDPE/PA	container

140. CNAPPP a aprobat un ambalaj adițional pentru produsul de protecție a plantelor **RIDOMIL GOLD R** (autorizație nr. 1031PC/17.03.2025), conform tabelului de mai jos:

AMBALAJE AUTORIZATE			AMBALAJE ADIȚIONALE		
Capacitate	Material	Tip	Capacitate	Material	Tip
400 g, 500 g, 1 Kg, 5 Kg, 8 Kg, 10 Kg	HDPE	Bidon	45 Kg	HDPE	Butoi
1 Kg, 5 Kg, 10 Kg	Folie hârtie/PET metalizat/PE	Cutie			

141. CNAPPP a aprobat ambalaje adiționale pentru produsul de protecție a plantelor **MISTRAL PLUS** (autorizație nr. 576PC/20/11.2019), conform tabelului de mai jos:

AMBALAJE AUTORIZATE			AMBALAJE ADIȚIONALE		
Capacitate	Material	Tip	Capacitate	Material	Tip
0,5 L, 1 L, 5 L, 10 L, 20 L	HDPE	Bidon	1 L, 3 L, 5 L, 7,5 L, 10 L	HDPE/EVOH	Bidon
0,5 L, 1 L	HDPE/PA	Bidon	5 L, 7,5 L	HDPE	Bidon
0,5 L, 1 L	PET	Bidon	3 L, 5 L, 7,5 L, 10 L	HDPE/PA	Bidon
0,5 L, 1 L, 5 L, 10 L, 20 L	f-HDPE	Bidon			



142. CNAPPP a aprobat ambalaje adiționale pentru produsele de protecție a plantelor **COPFORCE EXTRA/ (CUPMAN - a doua denumire comercială) (autorizație nr. 456PC/15.11.2018), conform tabelului de mai jos:**

AMBALAJE AUTORIZATE			AMBALAJE ADIȚIONALE		
Capacitate	Material	Tip	Capacitate	Material	Tip
50 g, 100 g, 250 g, 500 g, 1 kg	PE/ PP metalizat / PP	sac	20 g, 200 g	PE/ PP metalizat / PP	sac
10 kg, 25 kg	Hârtie /PE/Alu/ Hârtie / Pe/ Hârtie	sac			

143. CNAPPP a aprobat ambalaje adiționale pentru produsele de protecție a plantelor **SCORE 250 EC/ (MAVITA 250 EC - a doua denumire comercială) (autorizație nr. 1165/19.12.1989), conform tabelului de mai jos:**

AMBALAJE AUTORIZATE			AMBALAJE ADIȚIONALE		
Capacitate	Material	Tip	Capacitate	Material	Tip
20 mL, 25 mL, 50 mL, 250 mL, 500 mL, 1 L, 5 L, 10 L	HDPE/PA	Ampulă, Bidon	100 ml	HDPE/PA	Bidon
25 mL, 250 mL, 500 mL, 1 L, 5 L, 10L, 20L	f-HDPE	Bidon			

144. CNAPPP a aprobat ambalaje adiționale pentru produsul de protecție a plantelor **CARIAL STAR (autorizație nr. 156PC/16.03.2016), conform tabelului de mai jos:**

AMBALAJE AUTORIZATE			AMBALAJE ADIȚIONALE		
Capacitate	Material	Tip	Capacitate	Material	Tip
1 L	HDPE	Bidon	6 ml	HDPE	Ampulă
1 L	PET	Bidon	50 mL	HDPE	Bidon
5 L	HDPE	Bidon	100 mL	HDPE	Bidon
10 L	HDPE	Bidon			
20 L	HDPE	Bidon			

145. CNAPPP a aprobat ambalaje adiționale pentru produsul de protecție a plantelor **DYNALI (autorizație nr. 030PC/17.12.2013), conform tabelului de mai jos:**

AMBALAJE AUTORIZATE			AMBALAJE ADIȚIONALE		
Capacitate	Material	Tip	Capacitate	Material	Tip
50 mL, 250 mL, 500 mL, 1 L, 5 L, 10 L	HDPE	Bidon	6.5 mL	HDPE	Ampulă
220L	HDPE	Butoi	100 mL	HDPE	Bidon
1 L, 5 L, 10 L	HDPE/PA	Bidon			
1 L, 5 L, 10 L	f-HDPE	Bidon			
1 L, 5 L, 10 L	PET	Bidon			



146. CNAPPP a aprobat un ambalaj adițional pentru produsele de protecție a plantelor **SCORE 250 EC/ (MAVITA 250 EC** - a doua denumire comercială) (autorizație nr. 1165/19.12.1989), conform tabelului de mai jos:

AMBALAJE AUTORIZATE			AMBALAJE ADIȚIONALE		
Capacitate	Material	Tip	Capacitate	Material	Tip
20 mL, 25 mL, 50 mL, 250 mL, 500 mL, 1 L, 5 L, 10 L	HDPE/PA	Ampulă, Bidon	100 ml	HDPE/PA	Bidon
25 mL, 250 mL, 500 mL, 1 L, 5 L, 10L, 20L	f-HDPE	Bidon			

147. CNAPPP a aprobat ambalaje adiționale pentru produsele de protecție a plantelor **REVUS 250 SC/ (PERGADO** - a doua denumire comercială) (autorizație nr. 2706/ 11.06.2007), conform tabelului de mai jos:

AMBALAJE AUTORIZATE			AMBALAJE ADIȚIONALE		
Capacitate	Material	Tip	Capacitate	Material	Tip
250 mL; 500 mL; 1L; 5L; 10 L; 20L	HDPE	Bidon	3 L; 7,5 L	HDPE	Bidon
250 mL; 500 mL; 1L; 5L; 10L; 20L	HDPE/PA	Bidon	3 L; 7,5 L	HDPE/PA	Bidon
			1 L; 3 L; 5 L; 7,5 L; 10 L	HDPE/ EVOH	Bidon

148. CNAPPP a aprobat ambalaje adiționale pentru produsul de protecție a plantelor **GRETEG** (autorizație nr. 776PC/23.08.2022), conform tabelului de mai jos:

AMBALAJE AUTORIZATE			AMBALAJE ADIȚIONALE		
Capacitate	Material	Tip	Capacitate	Material	Tip
1 L; 5 L	HDPE/PA	Bidon	3 L; 7,5 L; 10 L	HDPE/PA	Bidon
1 L; 5 L	f-HDPE	Bidon	1 L; 3 L; 5 L; 7,5 L; 10 L	HDPE/EVOH	Bidon

149. CNAPPP a aprobat ambalaje adiționale pentru produsele de protecție a plantelor **ELUMIS/ (ELIBRA** - a doua denumire comercială) (autorizație nr. 006 PC/20.12.2011), conform tabelului de mai jos:

AMBALAJE AUTORIZATE			AMBALAJE ADIȚIONALE		
Capacitate	Material	Tip	Capacitate	Material	Tip
500 mL; 1 L; 5 L	HDPE/PA	Bidon	3 L; 7,5 L; 10 L	HDPE/PA	Bidon
500 mL; 1 L	PET	Bidon	1 L; 3 L; 5 L; 7,5 L; 10 L	HDPE /EVOH	Bidon
5 L; 10 L; 20 L	f-HDPE	Bidon	1 L	f-HDPE	Bidon



150. CNAPPP a aprobat ambalaje adiționale pentru produsele de protecție a plantelor **AXIAL 050EC/ (ELYSIAN** - a doua denumire comercială) (autorizație nr. 2748/19.12.2007), conform tabelului de mai jos:


AMBALAJE AUTORIZATE			AMBALAJE ADIȚIONALE		
Capacitate	Material	Tip	Capacitate	Material	Tip
1 L	HDPE/PA	Bidon	3 L; 5 L; 7,5 L; 10 L	HDPE/PA	Bidon
5 L; 10 L; 20 L	f-HDPE	Bidon			

151. CNAPPP a aprobat ambalaje adiționale pentru produsele de protecție a plantelor, conform tabelului de mai jos:

PRODUS	AUTORIZAȚIE	AMBALAJE AUTORIZATE			AMBALAJE ADIȚIONALE		
		Capacitate	Material	Tip	Capacitate	Material	Tip
AGRO- GLYFO/ (GLYPHO - a doua denumire comercială)	179PC / 16.03.2016	0,25 L; 1 L; 5 L; 10 L; 20 L; 200 L	HDPE	Sticlă rotundă, bidon, butoi	0,1 L; 0,5 L; 3L	HDPE	Sticlă rotundă, bidon
NICO 40 SC/ (RADIAL PRO - a doua denumire comercială)	2709/ 11.06.2007	1 L; 5 L	COEX (PE/ EVOH PE/PA)	Sticlă rotundă, bidon	0,075 L; 0,25L; 0,5 L	COEX	Sticlă rotundă
BOREAL 4 SC/ (NOVAPOWER 4 SC - a doua denumire comercială)	2609/ 14.12.2005	1 L; 5 L	COEX(PE/ EVOH PE/PA)	Sticlă rotundă, bidon	0,075 L; 0,25L; 0,5 L	COEX	Sticlă rotundă
Azuba 250 SC	876PC/ 28.09.2023	1 L, 5 L, 10 L, 20 L	HDPE	Sticlă rotundă, bidon	0,01 L; 0,1 L	HDPE	Sticlă rotundă
SPONSOR 6 FS/ (TEBUSH 6 FS - a doua denumire comercială)	2568/ 12.10.2005	0,3 L; 1 L; 5 L; 10 L; 20 L; 200 L; 1000 L	HDPE Butoi metalic	Sticlă rotundă, bidon, butoi	0,1 L	HDPE	Sticlă rotundă
KRIPTO SUPER 60 FS/ (VITADIN 6 FS - a doua denumire comercială)	2586/ 14.12.2005	0,3 L; 1 L; 5 L; 10 L; 20 L; 200 L; 1000 L	HDPE Butoi metalic	Sticlă rotundă, bidon, butoi	0,1 L	HDPE	Sticlă rotundă
GRASSROOTER/ (DRAGON - a doua denumire comercială)	446PC/ 15.11.2018	0,1 L; 0,25 L; 1 L; 5 L; 20 L	HDPE	Sticlă rotundă, bidon	0,5 L	HDPE	Sticlă rotundă
FAMOUS/ (EQUATION MAX - a doua denumire comercială)	1000PC/ 07.11.2024	1 L; 10 L	HDPE	Sticlă rotundă, bidon	0,02 L; 0,2 L; 0,5 L; 5 L	HDPE	Sticlă rotundă, bidon



CURZATE MAX/ (COMBI DUO CYFO - a doua denumire comercială)	993PC/ 07.11.2024	1 L; 5 L; 10 L; 20L	HDPE	Sticlă rotundă, bidon	0,02 L; 0,025 L; 0,1 L; 0,25 L; 0,5 L	HDPE	Sticlă rotundă
FOPAZ/ (TALONIL - a doua denumire comercială)	787PC/ 23.08.2022	0,25L; 0,5L; 1L; 5L; 10 L	COEX (HDPE/PA)	Sticlă rotundă, bidon	0,02 L; 0,1 L	COEX (HDPE/P A)	Sticlă rotundă, bidon
SOILGUARD 1,5 GR/ (VIERMOCID 1,5 GR - a doua denumire comercială)	615PC/ 30.06.2020	0,1 kg; 0,2kg; 0,25 kg; 0,5 kg; 0,75 kg; 1 kg; 5 kg; 10 kg; 20 kg; 25 kg	PE	Punga, sac	0,05 kg	PE	Punga
SUNDA 69 EW	693PC/ 22.04.2021	0,25 L; 0,5 L; 1 L; 5 L; 10 L; 20 L; 25 L	HDPE	Sticlă rotundă, bidon	0,1 L	HDPE	Sticlă rotundă
PROPIDIN ONE/ (SAGARIS PRO - a doua denumire comercială)	931PC/ 07.03.2024	1 kg; 2,5 kg; 5 kg; 0,05 L; 0,1 L; 1 L, 5 L	PE; HDPE	Punga, sac, sticlă rotundă, bidon	0,01 kg	PE	Punga, sac
COBALT/ (PROPIDIN MAX - a doua denumire comercială)	870PC/ 28.09.2023	0,5 kg; 1 kg; 5 kg; 10 kg; 0,015 L; 0,05 L, 0,5 L; 1L; 5 L	PE; HDPE	Punga, sac, sticlă rotundă, bidon	0,05 kg	PE	Punga, sac
CLAP 300 SL	251PC/ 19.12.2016	1 L; 5 L; 20 L	HDPE	Sticlă rotundă, bidon	0,1 L	HDPE	Sticlă rotundă
FOLLOW 80 WG/ (DITAN F - a doua denumire comercială)	276PC/ 28.02.2017	0,5 kg; 1 kg; 5 kg; 10 kg; 25 kg	PP/PE; HDPE	Punga, sac	0,02 kg; 0,1 kg	PP/PE	Punga, sac
ELECTICIDE/ (OMITE NEO - a doua denumire comercială)	792PC/ 23.08.2022	0,25 L; 0,5 L; 1 L; 5 L; 10 L	COEX (HDPE/PA)	Sticlă rotundă, bidon	0,005 L; 0,05 L	COEX (HDPE/ PA)	Sticlă rotundă
TRUST 100 EC	981PC/ 07.11.2024	0,005 L; 0,01 L; 0,1 L; 0,25 L; 0,5 L; 1 L; 5 L	HDPE, HDPE/ PA, PET, f-HDPE	Sticlă rotundă, bidon	0,003 L; 0,03 L	HDPE, HDPE/ PA, PET, f-HDPE	Sticlă rotundă
CRICKET 500 WG	1043PC/ 17.03.2025	0,3 kg; 1 kg; 5 kg; 2L; 10 L	PAP/PE HDPE	Punga, sac; bidon	0,005 kg; 0,05 kg; 0,5 kg	PAP/PE	Punga, sac
DIPRI 16 WG/ (TALONIL TOP - a doua denumire comercială)	992PC/ 07.11.2024	0,5 kg; 1 kg; 5 kg; 10 kg; 0,5 L; 1 L; 5 L; 10 L	PE; HDPE, PET	Punga, sac; bidon	0,025 kg; 0,25 kg	PE	Punga, sac
EMPEROR 500 SC	975PC/ 07.11.2024	1 L; 20 L	HDPE	Sticlă rotundă, bidon	0,1 L	HDPE	HDPE Sticlă rotundă



152. CNAPPP a aprobat aprobat capace noi la ambalajele produsului de protecție a plantelor **ANTIBURUIENI** (autorizație nr. 801PC/23.08.2022).

153. CNAPPP a aprobat ambalaje adiționale pentru produsele de protecție a plantelor **FOLPAN GOLD/ (RIDOMIL GOLD COMBI** - a doua denumire comercială) (autorizație nr. 823PC/07.12.2022), conform tabelului de mai jos:

AMBALAJE AUTORIZATE			AMBALAJE ADIȚIONALE		
Capacitate	Material	Tip	Capacitate	Material	Tip
200g	Hârtie laminată PET (polietilentereftalat) metalizată și folie de polietilenă (PE) PET (12um), Aluminiu (12um), Polietilenă (70um)	pungă de plastic	20g	FOLIE MULTISTRAT PET TR 0.012 + BOPP METALIZAT 0.020 + PE TR 0.030 - PE in contact cu produsul	pungă de plastic
1kg; 5kg	Hârtie laminată PET (polietilentereftalat)) metalizată și folie de polietilenă (PE) PET (12um), Aluminiu (9um), Polietilenă (95um)	pungă de plastic	200g	FOLIE MULTISTRAT PET12 / PETmet12 / PE70 - PE in contact cu produsul	pungă de plastic
4kg; 5kg; 8kg	Polietilenă de înaltă densitate	bidon	400g	FOLIE MULTISTRAT PET12 / PETmet12 / PE70 - PE in contact cu produsul	pungă de plastic
600kg	FIBC Folie de polietilenă Țesătură din polipropilenă	IBC	50kg	6 straturi carton ondulat (kraft liner) /LDPE baza si capac	bidon/ butoi

154. CNAPPP a aprobat ambalaje adiționale pentru produsul de protecție a plantelor **LS FLUOP PROTHIO** (autorizație nr. 1132PC/02.12.2025), conform tabelului de mai jos:

AMBALAJE AUTORIZATE			AMBALAJE ADIȚIONALE		
Capacitate	Material	Tip	Capacitate	Material	Tip
5L	HDPE	Bidon	1 L	HDPE	Bidon
5L	HDPE-PA	Bidon	1 L	HDPE-PA	Bidon
5L	HDPE-EVOH	Bidon	1L	HDPE-EVOH	Bidon

155. CNAPPP a aprobat un ambalaj adițional pentru produsele de protecție a plantelor **TAIFUN 360 SL/ (GLYPHOGAN** - a doua denumire comercială) (autorizație nr. 269PC/19.12.2016), conform tabelului de mai jos:



AMBALAJE AUTORIZATE			AMBALAJE ADIȚIONALE		
Capacitate	Material	Tip	Capacitate	Material	Tip
1L; 10L; 20L	COEX	bidon	1L	HDPE/EVOH; COEX/PET	flacon
5L	HDPE/EVOH, COEX	bidon			
100mL; 250mL; 500mL	PET	flacon			
200L; 220L	PE APM (identic cu HMWPE) Polietilena, HDPE	butoi			
IBC (Container Intermediar Vrac)	PE-HD; înveliș exterior plasă de oțel galvanizat	IBC			

156. CNAPPP a aprobat ambalaje adiționale pentru produsul de protecție a plantelor **ZEBRA** (autorizație nr. 2203/ 06.05.2003), conform tabelului de mai jos:

AMBALAJE AUTORIZATE			AMBALAJE ADIȚIONALE		
Capacitate	Material	Tip	Capacitate	Material	Tip
0,25L; 0,50L; 1L	PET	sticlă, recipient	2mL; 3 mL; 10mL; 20 mL	folie PET	-

157. CNAPPP a aprobat ambalaje adiționale pentru produsele de protecție a plantelor **FOLPAN 80 WDG/ (FLOVINE - a doua denumire comercială)** (autorizație nr. 1566/ 30.01.1995), conform tabelului de mai jos:

AMBALAJE AUTORIZATE			AMBALAJE ADIȚIONALE		
Capacitate	Material	Tip	Capacitate	Material	Tip
15g	(HARTIE/ALUMINI U/PE) - folie triplex	pungă	15g; 150g; 1kg;	BOPP+PET/MET + CAST	folie multistrat
150g	PET/PE (folie duplex)	pungă			
500g	OPET met 12/PE70	pungă			
1kg	(triple layer)-PET 12/Alu 8/PE 80	pungă			
	(double layer)-PET 12/PE 90	pungă			
5kg	(triple layer, no handle)-PET 12/BONIL 15/PE 75	pungă			
	(triple layer, with handle) PET12/PA15/PE80	pungă			
10kg	(single layer)- Polyethylene	pungă			
20kg	(single layer)- Polyethylene	pungă			
	(single layer)- Polyethylene	sac			



158. CNAPPP a aprobat ambalaje adiționale pentru produsele de protecție a plantelor **MERPAN 80 WDG/ (FLO-CAPTAN** - a doua denumire comercială) (autorizație nr. 1891/17.02.1999), conform tabelului de mai jos:

AMBALAJE AUTORIZATE			AMBALAJE ADIȚIONALE		
Capacitate	Material	Tip	Capacitate	Material	Tip
1kg	1 kg bag (triple layer)-PET 12/Alu 8/PE 80 1 kg bag (double layer)-PET 12/PE 90	pungă	15g;150g;1 kg	BOPP+PET/ MET+CAST	flacon
5kg	5 kg bag (triple layer, no handle)- PET 12/BONIL 15/PE 75 5 kg bag (triple layer, with handle)- PET12/PA15/PE80	pungă			
10kg	10 kg (single layerPolyethylene)	pungă			
15g	folie triplex (HARTIE/ALUMINI U/PE)	pungă			
150g	folie duplex (PET/PE)	pungă			
500 kg	tesatura din polipropilena, tesatura conductiva 200 +/- 7gr/mp; natural, corpul pliat la varf; cusatura: overlock + lant rezistent la praf standard	sac			

159. CNAPPP a aprobat ambalaje adiționale pentru produsele de protecție a plantelor **FUDAN 250 SC / (BALEDO** - a doua denumire comercială) (autorizație nr. 875PC/ 28.09.2023), conform tabelului de mai jos:

AMBALAJE AUTORIZATE			AMBALAJE ADIȚIONALE		
Capacitate	Material	Tip	Capacitate	Material	Tip
100mL; 250mL;500mL; 1L; 5L	HDPE	sticlă; recipient	10 mL; 50mL; 200mL; 10L; 20L	HDPE	sticlă; recipient

160. CNAPPP a aprobat ambalaje adiționale pentru produsele de protecție a plantelor **GAMELAN 100 FS/ (DORALTES 100 FS** - a doua denumire comercială) (autorizație nr. 939PC/07.03.2024), conform tabelului de mai jos:



AMBALAJE AUTORIZATE			AMBALAJE ADIȚIONALE		
Capacitate	Material	Tip	Capacitate	Material	Tip
188 mL; 250 mL; 500mL; 510mL; 564mL; 800mL; 1L; 1,2L; 2L; 3L; 4L; 5L; 5,85L; 6L; 124L; 220L; 222L	HDPE	flacon, recipiente, canistră container	1L;5L;10L; 20L; 200L;220L; 1000L	HDPE	flacon; canistră; butoi; container; Mega TOP RBC
275mL; 323mL; 500mL; 550mL; 574mL; 1L; 1,1L; 5L; 5,5L; 5,85L; 10L	HDPE/PA COEX	flacon, container	120 mL; 275 mL; 574 mL; 500mL; 550mL; 1000mL; 10000 mL	HDPE-PA	flacon; conteinere
			1L	HDPE-PA; HDPE-COEX; PET	evopack
5960 mL	HDPE/F	canistră	1000 mL	PE-PA	flacon
			5L; 10L	HDPE; f- HDPE	flacon; evopack
500mL; 1L; 5L; 10L; 20L	HDPE-EvOH	flacon, container			

161. CNAPPP a aprobat un ambalaj adițional pentru produsele de protecție a plantelor **SULTAN 50 SC/ (MAGISTRAL 50 SC** - a doua denumire comercială) (autorizație nr. 2159/11.10.2002), conform tabelului de mai jos:

AMBALAJE AUTORIZATE			AMBALAJE ADIȚIONALE		
Capacitate	Material	Tip	Capacitate	Material	Tip
500 mL; 1L; 5L	HDPE	bidon	1L	HDPE/PA(COEX)	bidon
10L; 20L	HMW HDPE	bidon			

162. CNAPPP a aprobat ambalaje adiționale pentru produsele de protecție a plantelor **CLOSER** (autorizație nr. 537PC/12.07.2019) și **LASER 240 SC** (autorizație nr. 2155/11.10.2002), conform tabelului de mai jos:

AMBALAJE AUTORIZATE			AMBALAJE ADIȚIONALE		
Capacitate	Material	Tip	Capacitate	Material	Tip
0,25L ; 0,5L ; 1L ; 2L ; 3L ; 5L ; 10L ; 20 L	PET; HDPE	sticlă rotundă	2 mL;	FOLIE PET/ COEX/ EVOH	monodoză
			20 mL	FLACON HDPE/ COEX	flacon



163. CNAPPP a aprobat ambalaje adiționale pentru produsele de protecție a plantelor ZORVEC ENTECTA (autorizație nr. 833PC/25.04.2023), conform tabelului de mai jos:

AMBALAJE AUTORIZATE			AMBALAJE ADIȚIONALE		
Capacitate	Material	Tip	Capacitate	Material	Tip
38 mL până la 50 mL; 75 mL până la 100 mL; 150 mL până la 200 mL; 225 mL până la 300 mL; 800 mL până la 1200 mL 2,2 L până la 3 L; 3,5 L până la 5 L	COEX, HDPE/EVOH	sticlă rotundă	2 mL; 20 mL	FOLIE PET/ COEX/ EVOH	flacon
			2,5 mL; 5mL; 10 mL	PET(GAG)/ Super BPVDC/EVOH- PE	

164. CNAPPP a aprobat ambalaje adiționale pentru produsul de protecție a plantelor ZORVEC VINABEL (autorizație nr. 807PC/ 07.12.2022, conform tabelului de mai jos:

AMBALAJE AUTORIZATE			AMBALAJE ADIȚIONALE		
Capacitate	Material	Tip	Capacitate	Material	Tip
18 mL - 300 mL; 310 mL - 500 mL; 600 mL - 1L; 1,5 L - 3 L; 3,5 L - 5 L; 8 L - 10 L; 8 L - 10 L	Polietilenă fluorurată de înaltă densitate	sticlă rotundă	10 mL; 50 mL	FOLIE PET/ COEX/ EVOH	flacon
	COEX, HDPE/EVOH	flacon dreptunghi ular		FLACON HDPE/ COEX	

165. CNAPPP a aprobat ambalaje adiționale pentru produsele de protecție a plantelor PYRUS 400 SC/ (PAPYRUS 400 SC - a doua denumire comercială) (autorizație nr. 2534/21.04.2005), conform tabelului de mai jos:

AMBALAJE AUTORIZATE			AMBALAJE ADIȚIONALE		
Capacitate	Material	Tip	Capacitate	Material	Tip
1L; 5L; 10L; 20L	HDPE	bidon	15mL; 150 mL	COEX HDPE- EVOH	bidon
100mL; 250mL; 500mL; 1L	COEX HDPE- EVOH	bidon			



166. CNAPPP a aprobat ambalaje adiționale pentru produsele de protecție a plantelor **BOUILLIE BORDELAISE WDG/ (BORDOMIX** - a doua denumire comercială) (autorizație nr. 2124/18.12.2001), conform tabelului de mai jos:

AMBALAJE AUTORIZATE			AMBALAJE ADIȚIONALE		
Capacitate	Material	Tip	Capacitate	Material	Tip
20 kg	hartie	4-layer	1,0 kg; 0,25 kg; 0,05 kg	BOPP+ PET+Cast	Thickness: 70μ (media+/-3%)
15 kg	hartie	4-layer			
10 kg	hartie	4-layer			
5 kg	hartie	4-layer	1,0 kg; 0,5 kg	PET+BOPP+ PE	Thickness: 62μ (media+/- 3%)
20 kg	PE Co extruded	160μ (medium +/- 5%)			
15 kg	PE Co extruded	160μ (medium +/- 5%)	0,05 kg	Film 12 μ PET+ 12 μ PET metalizat, film LDPE de 70 μ	Thickness: 94μ (media +/- 3%)
10 kg	PE Co extruded	160μ (medium +/- 5%)			
5 kg	PE Co extruded	160μ (medium +/- 5%)			

167. CNAPPP a aprobat ambalaje adiționale pentru produsele de protecție a plantelor **POL- SULPHUR 800 SC** (autorizație nr. 385PC/28.02.2018), conform tabelului de mai jos:

AMBALAJE AUTORIZATE			AMBALAJE ADIȚIONALE		
Capacitate	Material	Tip	Capacitate	Material	Tip
1L; 5L; 10L; 20L; 60L; 120L; 200L	HDPE	-	100 mL; 250 mL; 500 mL; 1000 L	HDPE	IBC

168. CNAPPP a aprobat ambalaje adiționale pentru produsele de protecție a plantelor **ALIETTE 80 WG** (autorizație nr. 1801/28.10.1997), conform tabelului de mai jos:

AMBALAJE AUTORIZATE			AMBALAJE ADIȚIONALE		
Capacitate	Material	Tip	Capacitate	Material	Tip
1 kg; 5kg; 10 kg	Folie multistrat PE- Al-PE, ambalaj colectiv din carton	plic, sac	20 g; 200 g; 500 g; 6 Kg; 12 kg	Folie multistrat, film compozit de aluminiu (min. 0,007 mm aluminiu) – material nemodificat. Ambalaj colectiv: cutie de carton	plic, sac

169. CNAPPP a aprobat ambalaje adiționale pentru produsul de protecție a plantelor **AVOXA** (autorizație nr. 661PC/24.11.2020), conform tabelului de mai jos:

AMBALAJE AUTORIZATE			AMBALAJE ADIȚIONALE		
Capacitate	Material	Tip	Capacitate	Material	Tip
1 L; 5 L; 10 L; 20 L	HDPE	bidon	1 L; 3L; 5L; 7,5L; 10L	HDPE/PA	bidon
5 L; 10 L; 20 L	f-HDPE	bidon	3L; 7,5L	HDPE	bidon
			1 L	f-HDPE	bidon
			1 L; 3 L; 5 L; 7,5 L; 10 L	HDPE/EVOH	bidon

170. CNAPPP a aprobat un ambalaj adițional pentru produsele de protecție a plantelor **CUSTODIA 320 SC (SALVATOR MAX** - a doua denumire comercială) (autorizație nr. 259PC/19.12.2016), conform tabelului de mai jos:

AMBALAJE AUTORIZATE			AMBALAJE ADIȚIONALE		
Capacitate	Material	Tip	Capacitate	Material	Tip
1L; 5L	HDPE	-	1000L	HDPE/ HMW HDPE	IBC DRUM
10L; 20L	HDHMWPE, PE/PA	-			
200L; 220L	HMW, HDPE	-			

171. CNAPPP a aprobat un ambalaj adițional pentru produsele de protecție a plantelor **DUNAVIUM/ (BLENIS** - a doua denumire comercială) (autorizație nr. 1059PC/17.03.2025), conform tabelului de mai jos:

AMBALAJE AUTORIZATE			AMBALAJE ADIȚIONALE		
Capacitate	Material	Tip	Capacitate	Material	Tip
0,5L; 1 L; 5L; 10L; 20L	HDPE/PA (COEX) și fHDPE	bidon	100mL	HDPE/PA (COEX)	bidon

172. CNAPPP a aprobat ambalaje adiționale pentru produsele de protecție a plantelor **Clinic Xtreme 540 SL/ (URAGANE** - a doua denumire comercială) (autorizație nr. 947PC/07.03.2024), conform tabelului de mai jos:

AMBALAJE AUTORIZATE			AMBALAJE ADIȚIONALE		
Capacitate	Material	Tip	Capacitate	Material	Tip
500 mL; 1L; 5L; 10L; 15L; 20L; 25L; 220L; 1000L	HDPE; PET	flacon; bidon; canistră	50 mL; 100 mL	PET	flacon



173. CNAPPP a aprobat ambalaje adiționale pentru produsele de protecție a plantelor, conform tabelului de mai jos:

PRODUS	Autorizație nr.	AMBALAJE AUTORIZATE			AMBALAJE ADIȚIONALE		
		Capacitate	Material	Tip	Capacitate	Material	Tip
APACHE/ (VERTAB - a doua denumire comercială)	324PC/ 29.06.2017	0,25 L; 0,5L; 1L; 5L;	COEX with PA or EVOH barrier	flacon, bidon	0,01L; 0,1L	Folie multistrat PET/ EVOH/PE COEX with PA or EVOH barrier	Mono-doză tip flacon
VALMEC EW / (JIRLO -a doua denumire comercială)	324PC/ 29.06.2017	0,25L;1L;5 L	COEX with PA or EVOH barrier	flacon, bidon	0,01L; 0,1L; 0,5L	Folie multistrat PET/EVOH/ PE COEX with PA or EVOH barrier	Mono-doză tip flacon
ROUBAIX/ (ZINGARO -a doua denumire comercială)	879PC/ 28.09.2023	0,1L; 0,25L; 0,5L; 1L; 5L; 10L; 15L; 20L	HDPE HDPE/PA F-HDPE	flacon, fidon	0,01L	Folie multistrat PET/EVOH/ PE	Monă-doza tip flacon
PLANTOIL/ (MIDOS OIL -a doua denumire comercială)	614PC/ 30.06.2020	1L; 5L; 10L; 20L; 25L; 60L	COEX, HDPE	flacon, bidon	0,1L; 0,5L	HDPE/PA	flacon
ALFIL WG/ (ALLEATO WG -a doua denumire comercială)	113PC/ 22.07.2015	0,03 kg; 0,04kg; 0,1 kg; 0,25 kg; 0,3 kg; 0,5 kg; 1 kg; 3 kg; 5 kg	PET/AL/PE	Sac	0,02kg; 0,2kg	PET/AL/ PE	sac
DIPRIL/ (DEIRA -a doua denumire comercială)	627PC/ 30.06.2020	0,25 L; 1 L; 5 L; 10L; 20 L	HDPE, HDPE/EVOH	flacon, bidon	0,1 L	HDPE, HDPE/ EVOH	flacon
ERGON/ (CHENKAR -a doua denumire comercială)	080PC/ 21.01.2015	300 g; 350 g (with 800 ml filling capacities)	HDPE	flacon	45 g; 75 g	Triple layer transparent/ PET met/cast	mac
MAGMA TRIPL WG/ (ALLEATO TRIPLE WG -a doua denumire comercială)	482PC/ 14.03.2019	30 g; 40 g; 100 g; 250 g; 300 g; 500 g; 1 kg; 2 kg; 2,5 kg; 3 kg; 5 kg	PET/AL/PE	sac	150 g	PET/AL/ PE	sac



174. CNAPPP a luat notă de eliminarea ambalajelor mari pentru produsul de protecție a plantelor **RINPODE** (autorizație nr. 1104PC/ 02.12.2025), conform tabelului:

AMBALAJE AUTORIZATE			AMBALAJE ELIMINATE		
Capacitate	Material	Tip	Capacitate	Material	Tip
0,05L; 0,10L; 0,15L; 0,25L; 0,50L; 1L; 2L; 3L; 5L; 10L; 15L; 20 L	PET	sticlă rotundă	1L; 2L; 3L; 5L; 10L; 15L; 20 L	PET	-
0,10L; 0,50L; 1L; 2L; 3L; 5L; 5,2L; 6,2L; 7L; 10L; 15L; 20 L	COEX HDPE/PA	sticlă rotundă	1L; 2L; 3L; 5L; 5,2L; 6,2L; 7L; 10L; 15L; 20 L	COEX HDPE/PA	-
0,05L; 0,10L; 0,15L; 0,25L; 0,50L; 1L; 2L; 3L; 5L; 10L; 15L; 20 L	F-HDPE		1L; 2L; 3L; 5L; 10L; 15L; 20 L	F-HDPE	-

175. CNAPPP a aprobat ambalaje adiționale pentru produsele de protecție a plantelor **MAVRIK 2 F/ (EVURE - a doua denumire comercială)** (autorizație nr. 2126/18.12.2001), conform tabelului de mai jos:

AMBALAJE AUTORIZATE			AMBALAJE ADIȚIONALE		
Capacitate	Material	Tip	Capacitate	Material	Tip
1L	COEX	flacon	200L	COEX (From inside out PA+ adhesive+ PIR (Post Internal Recycled) HDPE+ Virgin HDPE)	bidon
5L	COEX(HDP E/PA)	flacon	5mL	PET/EVOH/PE	Flacon
50 mL	COEX(HDP E/PA)	flacon	-		

PREȘEDINTE

ȘOLDEA Romeo

