

BULETIN DE AVERTIZARE Nr. 51 din 17.07.2026**TRATAMENT PENTRU COMBATEREA ORGANISMELOR DĂUNĂTOARE LA CARTOF**

Pentru prevenirea și combaterea bolilor la cartof, se recomandă efectuarea tratamentelor fitosanitare preventive și curative, la depășirea pragului economic de dăunare, pentru a se evita instalarea infecțiilor severe în cultură.



Se recomandă efectuarea tratamentelor fitosanitare, utilizând unul dintre produsele:

KUPFER FUSILAN WG / CUPROPUR - 2,5 kg/ha (oxiclorura de cupru + cimoxanil) - fungicid local sistemic și de contact. Cuprul menține o igienă ridicată a culturii iar cimoxanilul are caracter puternic antisporent reducând infecțiile ulterioare. Timp de pauză - 14 zile *sau*

RANMAN TOP / KARITSU (ciazofamid) - **0,5 l/ha**. Timp de pauză 7 zile *sau*

PROXANIL /COMBI DUO FORTE (propamocarb+cimoxanil) - **2,5 l/ha**. Timp de pauză - 14 zile *sau*

REVUS 250 SC / PERGADO - 0,6 l/ha (mandipropamid). Timp de pauză 3 zile *sau*

ZOXIS 250 SC/NORIOS 250 SC (azoxistrobin) - **0,250 l/ha**. Timp de pauză 7 zile *sau*

PROPULSE 250 SE - 0,3 - 0,5 l/ha- omologat pentru combaterea alternariozei. Timp de pauză 21 zile *sau*
se poate utiliza un produs de contact pe bază de fluazinam:

NANDO 500 SC – 0,3 - 0,4 l/ha *sau* **BANJO 500SC/ CARTALA- 0,3 - 0,4 l/ha**.

♦ Se va respecta cu strictețe timpul de pauză indicat pe ambalajul produsului pe care îl utilizați (timpul de la aplicarea produsului până la recoltare)

MOMENTUL APLICĂRII TRATAMENTULUI : 17.07.2026 – 21.07.2026

Dacă presiunea de infecție a bolilor va fi ridicată, pentru a asigura protecția culturii de cartof și pentru a preveni migrarea sporilor de mană pe tuberculi, tratamentul se va repeta, alternând produsele (din grupe chimice diferite). Intervalul dintre tratamente se adaptează în funcție de condițiile climatice, presiunea de infecție a bolilor, de evoluția culturii și în funcție de perioada de protecție a produselor utilizate.

În caz de atac al **gândacului de Colorado** se va aplica unul din insecticidele recomandate în buletinele de avertizare anterioare.

Pentru combaterea bolilor și dăunătorilor la cartof, pot fi utilizate și alte produse omologate pentru a fi utilizate pe teritoriul României, produse cuprinse în baza de date PEST-EXPERT (user name: guest ; parola: guest)

METODE DURABILE: metode biologice, biotehnice, fizice, mecanice și alte metode nechimice, trebuie preferate metodelor chimice, dacă acestea asigură un control corespunzător al agenților de dăunare.

♦ În vederea diminuării riscurilor asociate utilizării produselor de protecție a plantelor, pentru protecția sănătății umane și animale, pentru protejarea mediului înconjurător și a biodiversității, se impune utilizarea practicilor agricole durabile, strategii și tehnici de gestionare integrată a dăunătorilor.

♦ Pentru a preveni apariția bolilor la cartof : mană, alternarioza, precum și a altor boli de carantină (putregaiul inelar, putregaiul brun - pentru care nu există măsuri chimice de combatere), înființarea culturii cartofului va fi făcută numai cu tuberculi certificați, proveniți din parcele pe care s-a aplicat tehnologia de producere a cartofului de sămânță.

ALTE RECOMANDĂRI:

- ◆ Verificați, cu mare atenție recomandările cu privire la compatibilitatea produselor atunci când intenționați să aplicați amestecuri de produse de protecție a plantelor!
- ◆ Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător!
- ◆ Respectați cu strictețe normele de lucru cu produse pentru protecția plantelor, normele de protecție și securitatea muncii, de protecție a albinelor și a animalelor în conformitate cu: Legea nr. 383/2013 a apiculturii cu modificările și completările ulterioare și Ordinul nr. 127/1991 al A.C.A. din România, Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației, 15b/ 3404/1991 al Dep. Pentru Administrație Locală și 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor precum și cu Protocolul de colaborare nr. 328432/2015, încheiat cu ROMAPIS (privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine împotriva intoxicației cu produse pentru protecția plantelor);
- ◆ Respectați prevederile Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 297/2017 privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea în siguranță a produselor de protecția plantelor.
- ◆ Respectați obligațiile ce vă revin conform Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului mediului, apelor și pădurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 352/ 636/ 54/ 2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiționalitatea în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermierii în România, cu modificările ulterioare.
- ◆ Respectați măsurile obligatorii privind utilizarea durabilă a produselor de protecție a plantelor, așa cum au fost prezentate în **Adresa de informare nr. 136 din 05.02.2026 a Oficiului Fitosanitar Suceava**.
- ◆ Pentru a se evita acumularea reziduurilor de pesticide în produsele vegetale și pentru evitarea fenomenului de rezistență a agenților fitopatogeni, folosiți pentru tratamentele dintr-un sezon, produse din grupe chimice diferite.
- ◆ Nu efectuați tratamente în cursul zilei la temperaturi ridicate care pot duce la degradarea produsului utilizat.
- ◆ Nu se efectuează tratamente fitosanitare la viteze ale vântului mai mari de 4 m/s.
- ◆ Utilizatorii de produse de protecție a plantelor trebuie să dețină certificatul de formare profesională dobândit prin instruire privind utilizarea durabilă a produselor de protecție a plantelor. Cursul este disponibil online, **pe platforma FITS** <https://fits.anfd.ro>
- ◆ Deținătorii de echipamente de aplicare a produselor de protecție a plantelor sunt obligați să efectueze inspecția tehnică periodică a acestor echipamente.
- ◆ Citiți cu atenție și respectați măsurile înscrise pe ambalajul produsului pe care îl utilizați. Eticheta oferă informații importante privind instrucțiunile de utilizare, substanța activă, doza, timpul de pauză, modul de aplicare. etc

Intocmit
ing. Platon Maria