

ANEXA 6.

Nr. 832 /O/16.07.2026.



BULETIN DE AVERTIZARE

Nr. 20 /16.07.2026.

Pentru prevenirea și combaterea organismelor dăunătoare la vița de vie: *Plasmopara viticola* sau **mana viței de vie** și *Uncinula necator* sau **făinarea viței de vie**.

Boala se manifestă în primul rând pe frunze sub forma unor pete, de la câțiva mm la câțiva cm, de culoare galben-untdelemn, cu contur difuz. Cu timpul, centrul acestor pete se brunifică, frunzele luând un aspect uscat. Pe partea inferioară a frunzei în dreptul petelor se constată prezența unui puf albicios, alcătuit din miceliul și sporii ciupercii. În condiții de temperatură ridicată (20-22°C) și umiditate accentuată, ce determină o evoluție rapidă, faza de pete untdelemn și puful albicios nu mai apar. Către toamnă, când frunzele devin mai rezistente, apar doar pete mici, colțuroase de 1-2 mm în diametru, în dreptul cărora țesuturile se brunifică, în timp ce restul frunzei rămâne de culoare verde. În această fază puful alb nu mai apare pe dosul frunzelor. Pe lăstari atacul de mană apare sub forma unor pete alungite de culoare brună, ce apar în preajma nodurilor, în dreptul cărora scoarța este moartă. Ciorchinii mici, pe timp umed se îngălbenesc și se acoperă cu miceliu și spori de culoare albă sau se brunifică și se usucă pe timp secetos. Boabele atacate se brunifică, se zbârcesc și uneori se desprind de pe ciorchine și cad cu ușurință. Dacă umiditatea atmosferică este ridicată (95-100%) și temperatura este cuprinsă între 18-24°C, formarea miceliului și a sporilor are loc într-un timp relativ scurt (6-10 ore). Către toamnă, în frunzele mozaicate, ciuperca formează organele de rezistență și de iernare.

Tratamentele chimice trebuie aplicate numai în timpul perioadei de incubație, pentru ca la apariția miceliului și a sporilor, când în mod sigur există pericolul unei noi infecții, organele viței de vie să fie acoperite cu o peliculă de substanță care să le protejeze.



<https://www.dreamstime.com/stock-photo-dangerous-disease-grape-mildew-downy-mildew-lat-plasmo-sheet-grapes-affected-fungal-disease-downy-mildew-false-mildew-image97025384>

Deoarece condițiile climatice sunt favorabile manifestării infecțiilor primare, se recomandă aplicarea unui tratament preventiv, folosind unul din următoarele fungicide:

- **ARMETIL COBRE (MEVAXIL COBRE** – a doua denumire comercială) în doză de 2,5 kg/ha sau,
- **MELODY COMPACT 49 WG** în doză de 1,5 kg/ha sau

- **UNIVERSALIS 593 SC** în doză de 2 l/ha sau alte produse pentru protecția plantelor omologate pentru a fi utilizate pe teritoriul României.

În condiții climatice cu ploi și umezeală ridicată tratamentul se va repeta la 7 - 10 zile, în funcție de tipul fungicidului folosit (de contact sau sistemic).

***Uncinula necator* sau făinarea viței de vie**

Boala se manifestă pe toate organele verzi ale plantei. Pe frunze atacul apare sub forma unui miceliu albicios, care poate acoperi ambele fețe ale limbului. Țesuturile de sub miceliu cu timpul se brunifică. Pe lăstari atacul se manifestă doar până aceștia sunt verzi. Pe boabele tinere atacul se manifestă prin apariția unui puf albicios, pe toată suprafața. Boabele nu se mai dezvoltă, mai târziu crapă, iar semințele devin vizibile. Ciuperca se transmite de la un an la altul prin miceliul de rezistență situat în interiorul mugurilor de iarnă formați în timpul verii.



<https://www.glissando.ro/product/fainarea-vitei-de-vie/>

Deoarece vița de vie se află în fenofaza favorabilă manifestării infecțiilor primare, se recomandă aplicarea unui tratament preventiv, folosind unul din următoarele fungicide:

- **KUMULUS DF** în concentrație de 0,3% sau,
- **SERCADIS** în doză de 0,15 l/ha sau,
- **TEBUSTAR EW (MYSTIC TOP)** – a doua denumire comercială în concentrație de 0,04% (în doză de 0,4 l/ha) sau,
- **THIOVIT JET 80 WG** în concentrație de 0,3% (în doză de 3 kg/ha) sau alte produse pentru protecția plantelor omologate pentru a fi utilizate pe teritoriul României.

Alte recomandări:

Verificați, cu mare atenție recomandările cu privire la compatibilitatea produselor atunci când intenționați să aplicați amestecuri de produse de protecție a plantelor!

Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător!

Respectați cu strictețe normele de lucru cu produse pentru protecția plantelor, normele de protecție și securitatea muncii, de protecție a albinelor și a animalelor în conformitate cu: Legea nr. 383/2013 a apiculturii cu modificările și completările ulterioare și Ordinul nr. 127/1991 al A.C.A. din România, Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației, 15b/ 3404/1991 al Dep. Pentru Administrație Locală și 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor precum și cu Protocolul de colaborare nr. 328432/2015,

încheiat cu ROMAPIS (privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine împotriva intoxicației cu produse pentru protecția plantelor);

Respectați prevederile Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 297/2017 privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea în siguranță a produselor de protecția plantelor.

Respectați obligațiile ce vă revin conform Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului mediului, apelor și pădurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 352/ 636/ 54/ 2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiționalitatea în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermierii în România, cu modificările ulterioare.

Utilizatorii de produse de protecție a plantelor trebuie să dețină certificatul de formare profesională dobândit prin instruire privind utilizarea durabilă a produselor de protecție a plantelor. Cursul este disponibil online, pe platforma FITS: <https://fits.anfd.ro>, iar certificatul este valabil 5 ani.

Deținătorii de echipamente de aplicarea produselor de protecție a plantelor sunt obligați să efectueze inspecția tehnică periodică a acestor echipamente, odată la 3 ani.

Șef serviciu zonal HR-SV,

Romfeld Păunița



Întocmit,

Molnar Zoltan

