

NR.238/08.07.2026

## BULETIN DE AVERTIZARE Nr. 9

Pentru prevenirea și combaterea organismelor dăunătoare: **MUSCA VERZEI G III, FLUTURELE ALB AL VERZEI, PURICI ȘI PĂDUCHI DE FRUNZĂ (DELIA BRASSICAE, PIERIS BRASSICAE, PHYLOTRETA SP., BREVICORYNE B.)**


***Musca verzei***



***Fluturele alb al verzei***



***Puricii verzei***



***Păduchii de frunză***



Se recomandă efectuarea tratamentelor la (cultura) **VARZA** cu:

1. KARATE ZEON (NINJA) = 0,075 l/ha
2. AFFIRM = 1,5 kg/ha
3. BENEVIA = 0,75 l/ha
4. MOSPILAN 20 SP = 0,25kg/ha

sau cu alte produse de protecția plantelor omologate, pentru a fi utilizate pe teritoriul României, recomandate în lista oficială PEST-EXPERT – <https://aloe.anfd.ro/> (utilizator și parola "guest")

Măsuri alternative și durabile de combatere: biologice, fizice, mecanice și alte metode nechimice, trebuie preferate metodelor chimice, dacă acestea asigură un control corespunzător al organismelor dăunătoare.

### **Musca verzei**

După cum se știe, musca verzei are, în condițiile climatice ale țării noastre, 2-3 generații anuale. În câmp, iernează în stadiul de pupă, în orizonturile de suprafață ale solului și, uneori, în cotoarele de varză rămase după recoltare. Din pupele hibernante, adulții apar primăvara, la sfârșitul lunii aprilie – începutul lunii mai, când temperaturile medii atmosferice se încadrează în valori de 9 – 10°C.

### **Fluturele alb al verzei**

Prezintă 3 generații pe an, iernează ca pupă pe ramurile arborilor, pe trunchiul copacilor, pe sub streșinile caselor, etc. Adulții apar pe parcursul lunii mai și se hrănesc cu nectarul florilor. După împerechere, femela depune pontă pe partea inferioară a frunzelor de crucifere. Ouăle sunt depuse în grupe de câte 50-100, de regulă pe partea inferioară a frunzelor de varză, conopida, gulie etc.

### **Puricii verzei**

Iernează ca adulți în resturile vegetale rămase după recoltare, în stratul superficial al solului, sub bulgări de pământ sau în frunzișul de la liziera pădurilor. Prezintă o singură generație pe an. Adulții părăsesc locurile de hibernare spre sfârșitul lunii martie, hrănindu-se pe diferite crucifere spontane. După aceasta, trec pe



plantele cultivate (varza, conopida, ridichi, hrean, muștar etc.). Ouăle sunt depuse grupat sau izolat, în stratul superficial al solului din jurul plantelor.

### Păduchele cenușiu al verzei

Este o specie nemigratoare, iernează în stadiul de ou, pe resturile vegetale de la suprafața solului. Primăvara devreme, coloniile apar pe cruciferele spontane, iar în luna iunie apar formele aripate, care migrează pe cruciferele cultivate. Adulții și larvele înțepă organele plantei și se hrănesc cu suc celular al acestora. Din aceasta cauza, frunzele se încrețesc, iar în caz de atac puternic, se usucă și cad.

### **Recomandări:**

Aplicarea tratamentelor chimice se va face numai la pragul economic de dăunare, astfel:

|                         |      |                                             |
|-------------------------|------|---------------------------------------------|
| Musca verzei            | 3%   | - plante atacate-GA                         |
| Fluturile alb al verzei | 5%   | - plante atacate-GA                         |
| Purici                  | 10%  | - plante atacate-GA                         |
| Păduchi de frunză       | 15 % | - frunze atacate-GA, (GA = gradul de atac). |

Verificați, cu mare atenție, recomandările cu privire la compatibilitatea produselor atunci când intenționați să aplicați amestecuri de produse de protecția plantelor!

Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător!

Respectați cu strictețe normele de lucru cu produse de protecția plantelor, normele de protecție și securitatea muncii, cele de protecție a albinelor și a animalelor, în conformitate cu legea nr. 383/2013 a Apiculturii, cu modificările și completările ulterioare și Ordinul nr. 127/1991 al ACA din România, Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației 15b/3404/1991 al Dep. pentru Administrație Locală și 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, precum și Protocolul de colaborare nr. 328432/2015, încheiat cu ROMAPIS (privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu produse de protecția plantelor).

Respectați prevederile Ordinului MADR nr. 297/2017, privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea în siguranță a produselor de protecția plantelor.

Respectați obligațiile ce vă revin, conform Ordinului MADR, al ministrului mediului, apelor și pădurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 352/636/54/2015, pentru aprobarea normelor privind eco-condiționalitatea, în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, cu modificările ulterioare.

**ATENȚIE:** Toți utilizatorii de produse de protecția plantelor (prestatori de servicii cu ppp, fermieri) sunt obligați să respecte normele de eco-condiționalitate – SMR 7 și 8.

Fiecare utilizator de produse de protecția plantelor (persoane fizice sau juridice) trebuie să dețină registrul de evidență a tratamentelor cu aceste produse, evidență care se va păstra pe o perioadă de cel puțin 3 ani.

Nume și prenume fermier / Societate comercială-----  
Domiciliu fermier/sediu social SC(Comuna, județ)-----  
Firma (nume/numar, adresa)-----

### REGISTRUL de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor

| Data efectuării tratam. (ziua luna, anul) | Cultura și locul unde este situat terenul | Timpul aplicării/ fenofaza culturii | Tratamentul efectuat                          |                      |                                |           |                             | Numele, prenumele pers. responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura | Data începerii recoltării produsului agricol | Nr. și data document prin care s-a data în consum populației |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|-----------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                                           |                                           |                                     | Agentul de dăunare: boli/ dăunători/ buruieni | Denumire ppp folosit | Doza Omolo gală/ doza folosită | Suprafața | Cantități utilizate (kg, l) |                                                                             |                                              |                                                              |
|                                           |                                           |                                     |                                               |                      |                                |           |                             |                                                                             |                                              |                                                              |
|                                           |                                           |                                     |                                               |                      |                                |           |                             |                                                                             |                                              |                                                              |

Conform Reg.CE nr. 1107/2009, art. 67, (1)

Producătorul agricol numerează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila, după caz) fermierului sau a administratorului societății.



Coordonator,  
GALUJNAI DORIN

Intocmit,  
SPÎNU ȘĂFTICA