



BULETIN DE AVERTIZARE

Nr. 30 din 07.07.2026

Pentru combaterea dăunătorului: **omida păroasă a buxusului** (*Cydalima perspectalis*)-
generația a II-a.



Omida păroasă a buxusului



Fluturile de *Cydalima perspectalis*

În cazul în care plantele de buxus sunt atacate de omida păroasă a buxusului (*Cydalima perspectalis*) cel mai bun indiciu despre prezența acestui dăunător îl reprezintă dejecțiile sub formă de bile mici verzi de sub frunzele de buxus, dar acestea pot fi uneori regăsite și în pânzele țesute de mătase, pe plantă. Se înmulțesc destul de rapid, 2-3 generații pe an, iar în zonele mai calde, chiar și 4 generații pe an. Larvele (omida păroasă) care atacă speciile de buxus au culoare verde cu linii și puncte longitudinale negre și perișori de-a lungul corpului.

Larvele se hrănesc cu frunze, producând uneori chiar defolierea totală, conducând la uscarea și pierderea plantei. Devorează masiv, din interiorul plantei spre exterior, iar acest mod, face ca semnele atacului să nu fie observate și intervenția să fie uneori tardivă. Larvele mici se hrănesc cu partea superioară a frunzei, iar larvele mari mănâncă complet frunzele, ambele cazuri conducând la uscarea plantei. Larvele se transformă în pupe, protejate de un cocon, din care vor ieși fluturi de culoare albă, cu margini de culoare neagră.

Fluturii apar din luna mai și își depun ouale pe durata verii. Iernează sub forma de omizi mici pe frunzele și ramurile de buxus, protejate de panze tesute de matase.

Utilizați capcane feromonale specifice pentru a monitoriza zborul fluturilor adulți și a anticipa momentul optim de aplicare a tratamentelor pentru generațiile următoare. Dacă s-au observat deja fluturii, înseamnă că dăunătorul a ajuns la maturitate. Fluturii în sine nu mănâncă frunzele, dar își depun ouăle imediat pe spatele frunzelor de buxus. Din aceste ouă, în aproximativ 7-14 zile, va ieși o nouă generație de omizi. Se aplica imediat tratament pentru a elimina fluturii activi și a opri depunerea ouălor:

- cu un insecticid de contact + adjuvant (deoarece frunzele de buxus sunt ceroase, iar soluția trebuie să adere bine pentru a ajunge și pe spatele frunzelor);

- cu un insecticid sistemic sau un insecticid biologic, după 7-10 zile.

Tratamentul cu insecticide se va efectua după aplicarea măsurilor mecanice (îndepărtarea crenguțelor uscate cu mătase, purtătoare de larve – se culeg larvele și se ard. Plantele puternic infestate se ard, plantele defoliate se irigă).

În momentul de față nu sunt foarte multe insecticide omologate împotriva acestui dăunător. În aceste condiții, se pot folosi cele recomandate în combaterea omizilor defoliatoare și a altor lepidoptere omologate la culturile majore.

Produse recomandate pentru combatere:

- Karate Zeon (Ninja- a doua denumire comercială) -insecticid de contact - 0.015%+ adjuvant (Silwet L77) sau

- Deltagri (Faster Delta- a doua denumire comercială)- insecticid de contact 0,25-0,3 l/ha sau

- Bactospeine DF (Dipel DF)- (insecticid biologic de contact și ingestie) 0,1-0,2 litri în 100 litri apă

- Belthirul (insecticid biologic de contact și ingestie), 0,25-0,50 kg/ha în 800-1000 l apă/ha

- Foray 76 B (insecticid biologic de contact și ingestie)-2-2,5 l/ha

- Affirm - insecticid sistemic 1,5 kg/ha

sau alte produse pentru protecția plantelor omologate pentru a fi utilizate pe teritoriul României.

La prepararea soluției se vor respecta toate instrucțiunile de folosire, de pe eticheta produsului. Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător! Măsuri alternative de combatere: mecanice, fizice, biologice.


Respectați cu strictețe normele de lucru cu produse de protecție a plantelor, normele de protecție și securitatea muncii, de protecție a albinelor și a animalelor, prevederile Ordinului MADR nr.185/10.05.2023 privind aprobarea codului de conduită al utilizatorului profesionist de produse de protecție a plantelor și al apiculturii, precum și Protocolul de colaborare nr.

328432/2015 încheiat cu ROMAPIS (privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu produse pentru protecția plantelor).

Respectați prevederile Ordinului Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr.297/2017 privind aprobarea de bune practici pentru utilizarea în siguranță a produselor de protecție a plantelor.

Respectați obligațiile ce vă revin conform Ordinului Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, al Ministrului Mediului Apelor și Pădurilor și al Președintelui Autorității Naționale Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiționalitatea în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, cu modificările ulterioare.

Șef serviciu zonal,
Ing. Marinela TOA



Întocmit,
Ing. Gabriela ARDELEANU

Având în vedere implementarea cerințelor legale în materie de gestionare referitor la „Introducerea pe piață a produselor de protecția plantelor” (SMR 7, SMR 8), agricultorii, care prin activitatea lor depozitează, manipulează și utilizează produse de protecție a plantelor au următoarele obligații:

1. Să utilizeze numai produse de protecție a plantelor omologate de Comisia Națională de Omologare a Produselor de Protecție a Plantelor, care se regăsesc în baza de date **PEST-EXPERT**.

2. Să utilizeze produsele de protecție a plantelor doar în scopul pentru care acestea au fost omologate și numai în conformitate cu instrucțiunile de utilizare- doza/ha,to, cultura, agentul de dăunare și respectarea momentului aplicării. Aplicarea produselor de protecția plantelor trebuie realizată numai la avertizare.

3. Să se asigure ca produsele de protecția plantelor clasificate ca foarte toxice (T+) și toxice (T) vor fi utilizate numai de persoane juridice care dețin autorizație pentru utilizarea acestor produse, emisă de Oficiul Fitosanitar Județean.

4. Să nu aplice tratamente cu produse de protecție a plantelor în zonele de protecție a resurselor de apă, în zonele de protecție sanitară și ecologică, precum și în alte zone protejate stabilite în condițiile legii.

5. Să respecte condițiile de depozitare, manipulare și utilizare a produselor de protecția plantelor în exploatațile agricole, în exploatațile agricole, conform *Ghidului de bune practici de utilizare și depozitare a produselor de protecția plantelor* eliberat de Autoritatea Națională Fitosanitară.

6. Să păstreze o perioadă de cel puțin 3 ani documentele de evidență contabilă a produselor de protecția plantelor depozitate și utilizate în exploatație, precum și Registrul de evidență a tratamentelor cu produse de protecția plantelor.

Normele privind ecocondiționalitatea sunt obligatorii pentru toți beneficiarii de fonduri europene care vor respecta OM 352/2015 și vor consulta *Ghidul fermierului* postat pe site: <http://www.apia.org.ro/ro/>

Toți producătorii agricoli, care dețin suprafețe cu culturi agricole în câmp și spații protejate, indiferent de suprafața cultivată, sunt obligați să dețină un registru de evidență a tratamentelor fitosanitare, completat la zi după efectuarea fiecărui tratament, prin completarea într-un registru, după modelul anexat:

REGISTRUL
DE EVIDENȚĂ A TRATAMENTELOR CU PRODUSE DE PROTECȚIE A
PLANTELOR

Data efectuării tratamentului (ziua, luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Timpul aplicării (fenofaza)	Tratamentul efectuat					Numele, prenumele persoanei responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. și data documentului prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de dăunare boli/dăunător/buruieni	Denumirea ppp folosit	Doza Omologată /doza folosită	Suprafața (ha)	Cantități utilizate (kg, l)			

*Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1).

Producătorul agricol numerotează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și stampila, după caz) fermierului sau administratorului societății.