


BULETIN DE AVERTIZARE Nr. 77 din 15.07.2026

Oficiul Fitosanitar Călărași, recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar la **cultura de VIȚĂ DE VIE** împotriva **PUTREGAIULUI CENUȘIU** (*Botrytis f.*).

BOTRYTIS FUCKELIANA

Putregaiul cenușiu este un agent patogen polifag care produce pagube însemnate în toamnele ploioase. Denumirile putregaiului cenușiu sunt: *Botrytis fuckeliana* (forma sexuată) și *Botrytis cinerea* (forma asexuată). Agentul patogen iernează sub formă de microscleroți. Când condițiile devin favorabile, ciuperca se dezvoltă și determină apariția infecției. Miceliul ciupericii trăiește saprofit pe diferite substraturi organice, fiind format din conidiofori și conidii. Infecția este favorizată de leziunile provocate de molia strugurilor, de crăparea boabelor, de atacul de făinare, insecte (viespi, albine). Agentul patogen este puțin pretențios față de temperatură, infecțiile având loc între 1°C și 32°C, optimum fiind 22° - 23°C. Atacul este favorizat de persistența apei pe struguri și umiditatea relativă ridicată (80-100%).



Pentru combaterea agenților de dăunare, se recomandă folosirea unui produs de protecție a plantelor de mai jos:

1. TAEGRO

Vița de vie	Boli	mana viței de vie, făinarea, putregaiul cenușiu	0,37 kg/ha, pauză 3 zile
-------------	------	---	--------------------------

2. BOTREFIN (SHIFT)

Vița de vie (struguri de masă)	Boli	Botrytis cinerea (Putregaiul cenușiu)	0,6-1,0 Kg/ha	7 zile pauză -
Vița de vie (struguri de vin)	Boli	Botrytis cinerea (Putregaiul cenușiu)	0,6-1,0 Kg/ha	21 zile pauză

3. BOSKET (SAGARIS 50 WG)

Vița de vie	Boli	Botrytis cinerea (Putregaiul cenușiu) – Un singur tratament/an în unul din următoarele stadii de dezvoltare a viței de vie: sfârșitul înfloritului, înainte de compactarea ciorchinului sau la intrarea în pârgă a strugurilor.	1,0 – 1,2 kg/ha
-------------	------	---	-----------------

4. PRINT

Vița de vie	Boli	Botrytis cinerea (Putregaiul cenușiu) – Se aplică de când 60% din flori sunt scuturate până la sfârșitul înfloriturii. Se aplică de la formarea boabelor. Se aplică de la începutul coacerii până la culoarea specifică soiului.	1,5 l/ha
-------------	------	--	----------

Alte recomandări:

Verificați cu mare atenție recomandările cu privire la compatibilitatea produselor atunci când intenționați să aplicați amestecuri de produse de protecție a plantelor! Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător.

Respectați cu strictețe normele de lucru cu produse de protecție a plantelor, cele de securitate a muncii, de protecție a animalelor și familiilor de albine, în conformitate cu: Legea Apiculturii nr. 383/2013, cu modificările și completările ulterioare și Ordinul 127/1991 al ACA din România, Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației, Ordinul nr. 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administrație Locală și Ordinul 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, precum și în conformitate cu Protocolul de colaborare, nr. 328432/2015, încheiat cu ROMAPIS, privind implementarea legislației în vederea protecției familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu produse pentru protecția plantelor.

Respectați prevederile Ordinului Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, nr 297/2017, privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea în siguranță a produselor de protecție a plantelor.

Respectați obligațiile ce vă revin, conform Ordinului Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerului Mediului Apelor și Pădurilor și al Președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, nr. 352/636/542015, pentru aprobarea normelor privind ecocondiționalitatea în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, cu modificările și completările ulterioare.

Responsabil Prognoză și Avertizare,
Micuț – Istrate Daniela

