

ANEXA 6.

Nr. 819 /O/15.07.2026.



BULETIN DE AVERTIZARE

Nr. 19 /15.07.2026.

Pentru prevenirea și combaterea organismelor dăunătoare: *Ostrinia nubilalis* sau sfredelitorul porumbului.

Adultul are corpul de 13-15 mm, cu anvergura aripilor de 25-30 mm lungime și prezintă dimorfism sexual. Femela este mai mare, cu abdomenul rotunjit terminal și de culoare gălbuie deschisă, iar aripile anterioare sunt de culoare galbenă deschisă, cu 3 dungi transversale dispuse în zig-zag. Masculul este mai mic, abdomenul terminal este mai ascuțit, având culoarea mai închisă, de nuanțe maronii, cu femurele celei de-a doua pereche de picioare îngroșate și lățite. Oul este de culoare albă sidefie, turtit, neted și grupat în ponte depuse pe partea inferioară a frunzelor, în treimea superioară a plantelor, fiecare pontă având în medie 22 ouă. Larva este o omidă, de 2-3 mm, iar la completa dezvoltare are 15-25 mm lungime, de culoare albă-cenușie, uneori cu o nuanță roșcată. Pe partea dorsală, în regiunea mediană prezintă o dungă mai închisă la culoare, iar capsula cefalică, placa pronotală și segmentul anal sunt puternic chitinizate. Pupa este de culoare brună, cu 4 spini ușor curbați în zona terminală a abdomenului.

Fluturele este nocturn, cu larve care la început se hrănesc pe frunze, iar apoi pătrund și sapă galerii în tulpină, pedunculul știuletelui și, ulterior, în știulete. Atacul slăbește planta (frângerea tulpinilor, reducerea toleranței la secetă) și favorizează instalarea mucegaiurilor de depozit prin rănilor provocate. În general se dezvoltă 1 generație pe an, cu zbor al adulților eșalonat pe parcursul verii. Iernează în stadiul de larvă.



<https://agrointel.ro/269140/sfredelitorul-porumbului-ostrinia-nubilalis-semne-combatere>

Pentru prevenire și combatere se recomandă controlul vizual al pontelor pe fața inferioară și superioară a frunzelor situate deasupra și sub inserția știuletelui și controlul plantelor pentru prezența larvelor tinere și a galeriilor în tulpină. Dacă se observă 10-18% din plante cu pontă depusă, se recomandă efectuarea unui tratament cu unul din următoarele insecticide:

- **CORAGEN (VOLIAM)** - a doua denumire comercială în doză de 125 ml/ha sau,
- **INAZUMA** în doză de 0,15-0,2 kg/ha sau,
- **POLECI (DECA 2,5 EC)** - a doua denumire comercială în concentrație de 0,03-0,05 %, sau alte produse pentru protecția plantelor omologate pentru a fi utilizate pe teritoriul României.

Pentru prevenirea și combaterea organismelor dăunătoare: *Rhopalosiphum maidis* sau **păduchele verde al porumbului**.

Afidă de culoare verde-albăstruie, cu cap și torace mai închise la culoare, formând colonii dense pe frunze, panicul și, uneori, pe știuleți. Se dezvoltă cu precădere în perioade calde și secetoase, în lanuri dese, slab aerisite, de la sfârșitul lunii iunie și pe parcursul lunii iulie. Prin înțepare și sugere de sevă provoacă îngălbenirea, răsucirea și ofilirea frunzelor, afectează polenizarea când atacă paniculul și favorizează apariția fumaginei pe rouă de miere secretată.

Pentru prevenirea pagubelor se recomandă efectuarea unui tratament, cu unul din următoarele insecticide:

- **KARATE ZEON (NINJA** - a doua denumire comercială) în doză de 0,15 l/ha) sau

- **POLECI (DECA 2,5 EC** - a doua denumire comercială) în concentrație de 0,03-0,05 %, alte produse pentru protecția plantelor omologate pentru a fi utilizate pe teritoriul României.

Se consideră infestată o plantă cu peste 20 de afide. Se recomandă intervenția atunci când infestarea este generalizată în cultură (nu izolată pe margini de parcelă) și coincide cu fenofazele sensibile (înflorit-polenizare-formarea știuletelui). Se acordă atenție condițiilor de secetă și temperaturi ridicate, care favorizează explozia populațională a dăunătorului.

Alte recomandări:

Verificați, cu mare atenție recomandările cu privire la compatibilitatea produselor atunci când intenționați să aplicați amestecuri de produse de protecție a plantelor!

Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător!

Respectați cu strictețe normele de lucru cu produse pentru protecția plantelor, normele de protecție și securitatea muncii, de protecție a albinelor și a animalelor în conformitate cu: Legea nr. 383/2013 a apiculturii cu modificările și completările ulterioare și Ordinul nr. 127/1991 al A.C.A. din România, Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației, 15b/ 3404/1991 al Dep. Pentru Administrație Locală și 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor precum și cu Protocolul de colaborare nr. 328432/2015, încheiat cu ROMAPIS (privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine împotriva intoxicației cu produse pentru protecția plantelor);

Respectați prevederile Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 297/2017 privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea în siguranță a produselor de protecția plantelor.

Respectați obligațiile ce vă revin conform Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului mediului, apelor și pădurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 352/ 636/ 54/ 2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiționalitatea în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermierii în România, cu modificările ulterioare.

Utilizatorii de produse de protecție a plantelor trebuie să dețină certificatul de formare profesională dobândit prin instruire privind utilizarea durabilă a produselor de protecție a plantelor. Cursul este disponibil online, pe platforma FITS: <https://fits.anfdf.ro>, iar certificatul este valabil 5 ani.

Deținătorii de echipamente de aplicarea produselor de protecție a plantelor sunt obligați să efectueze inspecția tehnică periodică a acestor echipamente, odată la 3 ani.

Șef serviciu zonal HR-SV,

Romfeld Păunița



www.anfdf.ro

Întocmit,

Molnar Zoltan

