

BULETIN DE AVERTIZARE NR. 49 din 7.07.2026**TRATAMENT PENTRU COMBATEREA BOLILOR ȘI DĂUNĂTORILOR LA POMII FRUCTIFERI****I. TRATAMENT PENTRU COMBATEREA DĂUNĂTORILOR ȘI BOLILOR LA MĂR, PĂR****1. VIERMELE MERELOR (Generația a II-a - tratamentul I).**

Dăunătorul este întâlnit în toate zonele țării, poate afecta esențial calitatea fructelor dacă nu sunt aplicate strategii eficiente de combatere. Fluturii generației a doua depun ouăle pe fructe, mai rar pe frunze. Uneori apariția adulților celei de a doua generații se poate suprapune cu apariția ultimilor adulți din prima generație. Larvele apărute, pătrund în fruct în care produc galerii largi până la căsuța seminală, consumând pulpa și semințele. Fructele verzi atacate se opresc din dezvoltare, o parte cad de timpuriu, iar cele rămase își pierd valoarea comercială și nu se pot păstra deoarece sunt invadate de ciuperci care produc putrezirea pe timpul depozitării.

Se recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar, utilizând unul dintre produsele:

AFFIRM TOP - 2,5 kg/ha - omologat și pentru combaterea larvelor miniere și moliei pielitei *sau*

PILARFLAM (clorantilaniliprol) - **150 ml/ha** - pentru vierme mar, molia pielitei și larve miniere *sau*

LOS OVADOS 200 SE/ BIATOX - **0,2 l/ha** - omologat și pentru combaterea afidelor și a păduchele roz galicolic *sau*

LASER 240 SC/ NEXUBA - **0,9 l/ha** - omologat pentru combaterea viermelui merelor și a larvelor miniere *sau*

CARPOVIRUSINE - **0,1 % (1,5 l / ha)**

Pentru combaterea păduchelui din San Jose (G1T2), dacă există atac, se va utiliza obligatoriu unul din insecticidele recomandate în buletinul de avertizare **NR.41 din 19.06.2026 (alternativ)** *sau* poate fi utilizat:

DELTAGRI/FASTER DELTA - **0,45 l/ha** - pentru combaterea păduchelui din San Jose G1T2, viermelui merelor și prunelor, afidelor, moliiilor miniere, moliei pielitei, a omizilor defoliatoare și a păduchelui lănos. *sau*

POLECI (DECA 2,5 EC) - **30 ml /100 l de apă** - pentru viermele merelor; **50 -75 ml/100 l de apă** - pentru păduchele din San Jose; **75 ml/100 l apă** - pentru puricele melifer la păr

În cazul utilizării piretroizilor, tratamentul se repetă după 7 zile, folosind produse cu substanțe active diferite.

Pentru combaterea păduchelui roz galicolic, afidelor, acarienilor, puricelui melifer, se poate folosi, după caz:

SIVANTO PRIME 200 SL - **0,9 l/ha** - pentru afide (Aphis sp., Disaphis plantaginea) și puricele melifer la măr.

TEPPEKI (AFINTO) - **0,01 % (0,15 kg/ha)** - pentru combaterea păduchelui roz galicolic

MAVRIK 2 F / EVURE - **0,05 % (0,75 l/ha)** - pentru combaterea afidelor și păduchelui lănos

MILBEKNOCK EC / KOROMITE - **0,05 % (0,75 l/ha)** - pentru păianjenul roșu, omida miniera a marului

NISSORUN 10 WP – **0,3 - 1 kg/ha** - pentru combaterea acarianului roșu al pomilor

2. PENTRU COMBATEREA RAPĂNULUI ȘI FĂINĂRII, se va adauga unul din următoarele fungicide:

DOMARK 10 EC - **0,4 l/ha (0,027 %)** - fungicid sistemic cu activitate preventivă, curativă și de eradicare cu spectru larg de combatere și translocare acropetală în toate părțile plantelor și a celor în dezvoltare. *sau*

DAGONIS - **1,2 l/ha** – pentru combaterea rapănului și **0,72 l/ha** - pentru combaterea făinării *sau*

REYONA - **1,3 l / 10.000 m2 suprafață foliară tratată** - pentru combaterea rapănului la măr și păr, a făinării și a pătării purpurii la păr

II. TRATAMENT PENTRU COMBATEREA DĂUNĂTORILOR ȘI BOLILOR LA PRUN, PIERȘIC**1. VIERMELE PRUNELOR – Generația a II-a - tratamentul I.**

Fluturii generației a-II-a, depun ouăle pe fructele verzi, fiind preferate soiurile tardive și semitardive, zborul fiind mai numeros decât la generația hibernantă. Larvele generației a doua provoacă cele mai mari pagube. Fructele atacate cad înainte de recoltare și putrezesc datorită instalării unor ciuperci .

Se recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar, utilizând unul dintre produsele:

CORAGEN/ VOLIAM *sau* **PILARFLAM** (clorantilaniliprol) - **100 ml/ha** - vierme prun și **175 ml/ha** - la molia orientala, molia vârgată a piersicului *sau*

AFFIRM TOP – **2,5 kg/ha** *sau*

LASER 240 SC/ NEXUBA - **0,6 l/ha**

Pentru combaterea păduchelului din San Jose (G1T2), numai în caz de atac, se poate utiliza:

JUVINAL 10 EC (s.a.piriproxifen) - **0,05 %** sau **DELTAGRI/FASTER ELTA** - **0,25 - 0,3 l/ha** - omologat și pentru combaterea viermelui prunelor, a omizilor defoliatoare și a păduchelului cenușiu sau alt insecticid recomandate în buletinul de avertizar **NR.41 din 19.06.2026** . **Produsele se vor folosi alternativ.**

Pentru combaterea păduchelului cenușiu al prunului, păduchelului verde al piersicului, se mai poate folosi :

TEPPEKI /AFINTO – 0,012 - 0,014% (0,120-0,140 kg/ha sau MAVRIK 2 F/ EVURE - 0,05 % (0,5 l/ha)

La soiurile timpurii de cireș, vișin (la care s-a terminat recoltarea) în cazul în care s-a depistat atac de **afide**, se poate utiliza unul dintre produsele ce conțin deltametrin:

DELTAGRI (FASTER DELTA) - 0,3 l/ha sau JACKPOT 2,5 EC/ DELTASAP 2,5 EC- 0,3 - 0,7 %

2. PENTRU COMBATAREA BOLILOR (monilioza, pătarea frunzelor), se va adauga unul dintre fungicidele:

BOTREFIN/ SHIFT - 0,8 - 1 kg/ha - produs omologat pentru combaterea moniliozei la prun, piersic, nectarin, cais sau

LIBRETO - 0,8 L/ha - se aplică până când fructele ajung la maturitate; 1-3 tratament la prun. sau

REYONA - 1 l / 10.000 m2 suprafață foliară tratată - pentru combatere moniliozei sau

SIGNUM / SYREX STAR - 0,5 kg/ha - pentru combaterea moniliozei sămburoaselor, a pătării roșii a fz de prun.

Pentru combaterea bolilor și dăunătorilor la pomii fructiferi, pot fi utilizate și alte produse omologate pentru a fi utilizate pe teritoriul României, produse cuprinse în baza de date PEST-EXPERT (user name: guest ; parola: guest)

Se va respecta cu strictețe timpul de pauză indicat pe ambalajul produsului pe care îl utilizați.

MOMENTUL APLICĂRII TRATAMENTULUI

Tratamentul pentru combaterea viermelui merelor și prunelor se va efectua în perioada : **07.07.2026 – 09.07.2026**

METODE DURABILE: metode biologice, biotehnice, fizice, mecanice și alte metode nechimice, trebuie preferate metodelor chimice, dacă acestea asigură un control corespunzător al agenților de dăunare; (strategii și tehnici de gestionare integrată a dăunătorilor, principii ale agriculturii ecologice)

♦ Pentru monitorizarea și combaterea viermelui merelor în plantații, se pot utiliza capcanele adezive cu momeli feromonale, capcană feromolală atraPOM. Pentru monitorizarea și combaterea altor dăunători ai speciilor semănătoare pot fi utilizate capcanele feromonale: AtraSan (pentru păduchele din San Jose), AtraRET (molia pielitei fructelor), atraNUB (molia mugurilor), atraBLANC (minierul marmorat) s.a.

♦ Pentru monitorizarea și combaterea viermelui prunelor în plantațiile de prun, se pot utiliza capcanele adezive cu momeli feromonale, capcană feromolală atraFUN. Pentru monitorizarea și combaterea altor dăunători ai speciilor sămburoase pot fi utilizate capcanele feromonale: AtraMOL (molia orientală a fructelor), atraLIN (molia vărgată)

ALTE RECOMANDĂRI:

♦ Verificați, cu mare atenție recomandările cu privire la compatibilitatea produselor atunci când intenționați să aplicați amestecuri de produse de protecție a plantelor!

♦ Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător!

♦ Respectați cu strictețe normele de lucru cu produse pentru protecția plantelor, normele de protecție și securitatea muncii, de protecție a albinelor și a animalelor în conformitate cu: Legea nr. 383/2013 a apiculturii cu modificările și completările ulterioare și Ordinul nr. 127/1991 al A.C.A. din România, Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației, 15b/ 3404/1991 al Dep. Pentru Administrație Locală și 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor precum și cu Protocolul de colaborare nr. 328432/2015, încheiat cu ROMAPIS (privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine împotriva intoxicației cu produse pentru protecția plantelor);

♦ Respectați prevederile Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 297/2017 privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea în siguranță a produselor de protecția plantelor.

♦ Respectați obligațiile ce vă revin conform Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului mediului, apelor și pădurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 352/ 636/ 54/ 2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiționalitatea în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermierii în România, cu modificările ulterioare.

♦ Respectați măsurile obligatorii privind utilizarea durabilă a produselor de protecție a plantelor, așa cum au fost prezentate în **Adresa de informare nr. 136 din 05.02.2026 a Oficiului Fitosanitar Suceava.**

- ♦ Pentru a se evita acumularea reziduurilor de pesticide în produsele vegetale și pentru evitarea fenomenului de rezistență a agenților fitopatogeni, folosiți pentru tratamentele dintr-un sezon, produse din grupe chimice diferite.
- ♦ Nu se efectuează tratamente fitosanitare la viteze ale vântului mai mari de 4 m/s.
- ♦ Nu efectuați tratamente în cursul zilei la temperaturi ridicate care pot produce degradarea produsului utilizat
- ♦ Utilizatorii de produse de protecție a plantelor trebuie să dețină certificatul de formare profesională dobândit prin instruire privind utilizarea durabilă a produselor de protecție a plantelor. Cursul este disponibil online, **pe platforma FITS** <https://fits.anfd.ro>
- ♦ Deținătorii de echipamente de aplicare a produselor de protecție a plantelor sunt obligați să efectueze inspecția tehnică periodică a acestor echipamente.
- ♦ Citiți cu atenție și respectați măsurile înscrise pe ambalajul produsului pe care îl utilizați. Eticheta oferă informații importante privind instrucțiunile de utilizare, substanța activă, doza, timpul de pauză, modul de aplicare. etc

Responsabil Prognoza și Avertizare
ing. Platon Maria