

BULETIN DE AVERTIZARE

*Blumeriella jaapii (sursa internet)**Stigmina carpophila (sursa internet)**Monilinia (sursa internet)*

Oficiul Fitosanitar Vaslui recomandă efectuarea tratamentelor fitosanitare împotriva: **Antracnoza frunzelor de cireș** (*Blumeriella jaapii*), **Ciuruirea frunzelor** (*Stigmina carpophila*), **Monilioza sămburoaselor** (*Monilinia fructicola*).

care poate/pot cauza pierderi importante la culturile: **cireș, vișin**

Pentru prevenire și combatere se recomandă executarea tratamentului: curativ.

Folosiiți unul din produsele sau din amestecurile de mai jos, după caz:

1. Cuproxat Flowable (Kupferol) = 3,5 l/ha sau

2. Bouillie bordelaise WDG (Bordomix) = 5 kg/ha sau

3. Merpan 80 WDG (Flo-Captan) = 2 kg/ha.

Perioada optimă de tratament: după recoltarea fructelor; important pentru starea fitosanitară a pomilor.

Alte recomandări:

- **Utilizați cu precauție produsele fitosanitare. Citiți întotdeauna eticheta și informațiile despre produs înainte de utilizare.**
- La prepararea soluției flacoanele se agită bine înainte de golirea în rezervorul instalației de stropit;
- Clătiți ambalajele produselor de trei ori și goliți apa de clătire în cuva. Aplicați pe parcela tratată restul de soluție rămasă diluată cu apa de clătire;
- **Agricultorii** care prin activitatea lor **depozitează, manipulează și utilizează** produse de protecție a plantelor au următoarele **obligatii:**
 1. Să utilizeze numai produse de protecție a plantelor omologate de Comisia Națională de Omologare a Produselor de Protecție a Plantelor.
 2. Să utilizeze produsele de protecție a plantelor doar în scopul pentru care acestea au fost omologate și numai în conformitate cu instrucțiunile de utilizare.
 3. Produsele de protecție a plantelor clasificate în categoriile de **toxicitate acută** (din categoriile 1, 2 și 3 care conțin **pictograma GHS06** și sunt marcate cu cuvântul de avertizare „Pericol”) pot fi utilizate exclusiv de către persoanele juridice care dețin o **autorizație specială** pentru utilizarea produselor de protecție a plantelor și care dispun de personal calificat și instruit în acest sens;
 4. Să nu aplice tratamente cu produse de protecție a plantelor în zonele de protecție a resurselor de apă, în zonele de protecție sanitară și ecologică, precum și în alte zone protejate stabilite în condițiile legii.
 5. Să respecte condițiile de depozitare, manipulare și utilizare a produselor de protecție a plantelor în exploatațile agricole, așa cum sunt prevăzute în **"Ghidul pentru utilizarea în siguranță a produselor de protecție a plantelor"** - emis de Autoritatea Națională Fitosanitară;
 6. Să păstreze o perioadă de cel puțin 3 ani documentele de evidență a produselor de protecție a plantelor utilizate în exploatație, precum și **registru de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor, conform modelului:**

Data efectuării tratamentului. (ziua luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Timpul aplicării / fenofaza culturii	Tratamentul efectuat					Numele, prenumele pers. responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. și data document prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de dăunare: boli/dăunători/buruieni	Denumire PPP folosit	Doza omologată /doza folosită	Suprafața	Cantități utilizate (kg, l)			

7. Pentru protecția familiilor de albine respectați Ordinul comun nr. 45/1991/127/1786/68/15b/1991 al MADR privind unele măsuri pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu pesticide și Legea apiculturii nr. 383/2013.

Responsabil Prognoză și Avertizare,
Dr. Ing. Carmen Miroiu

