

Nr. 284 din 27.08.2026

Alertă fitosanitară: *Lycorma delicatula* detectat pentru prima dată în Republica Moldova



Un focar izolat, la granița României, aduce în atenție un risc real de introducere. Cea mai importantă măsură rămâne depistarea precoce și notificarea imediată a autorității fitosanitare.

La **14 august 2026**, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) din Republica Moldova a confirmat oficial **prima detectare pe teritoriul țării** a dăunătorului de carantină *Lycorma delicatula*. Focarul, izolat, a fost identificat în municipiul Chișinău, într-o zonă industrială, pe vegetație spontană — în special pe *Ailanthus altissima* (cenușar). Au fost depistați atât adulți, cât și nimfe, pe mai mulți arbori.

În jurul zonei a fost stabilită o arie delimitată și o zonă-tampon de **1 km**, cu măsuri de eradicare și monitorizare continuă. Pentru România, aflată în imediata vecinătate, acest lucru înseamnă un **risc real de introducere și răspândire** — motiv pentru care vigilența și depistarea precoce devin esențiale.

Ce este *Lycorma delicatula*?

Lycorma delicatula, cunoscută în engleză drept „spotted lanternfly”, este o insectă din ordinul Hemiptera (familia *Fulgoridae*), originară din Asia de Est. Este un dăunător puternic **polifag**: atacă **peste 100 de specii** de plante din sectoarele horticola, viticol și forestier.

Gazda sa preferată este *Ailanthus altissima* (cenușarul), dar printre plantele gazdă importante

economic se numără *Vitis vinifera* (vița-de-vie), *Juglans* (nuc), *Acer* (arțar), *Prunus* (cireș, piersic, prun), *Malus* (măr) și *Salix* (salcie).

De ce este periculos

Nimfele și adulții înțepă țesutul conducător (floemul) și **extrag seva**, provocând răni cu scurgeri de sevă, ofilirea lăstarilor, necrozarea ramurilor și slăbirea generală a plantei.

În plus, insecta elimină cantități mari de **rouă de miere** (excreții zaharoase), pe care se dezvoltă **fumagina** — un strat negru ce acoperă frunzele și fructele, blochează fotosinteza și duce la defoliere timpurie. În plantațiile viticole și pomicole, efectul este direct economic: recolte reduse, acumulare scăzută de zaharuri, deprecierea calității fructelor și chiar pieirea butucilor de viță-de-vie.

Cum se răspândește: mai ales prin activitatea umană

Pe distanțe lungi, *Lycorma delicatula* se răspândește în principal prin **transportul ouălelor**. Femela depune pontă nu doar pe plante, ci și pe suprafețe inerte: ambalaje și paleți din lemn, bușteni, piatră de carieră, containere, utilaje și vehicule. Astfel, masele de ouă camuflate pot călători internațional, neobservate.

De aceea, controlul materialului lemnos, al mijloacelor de transport și al mărfurilor provenite din zone afectate este prima linie de apărare.

Cum îl recunoști, în funcție de stadiu

Aspectul insectei se schimbă mult pe parcursul anului. Reperete de mai jos ajută la o identificare rapidă:

Stadiu	Perioadă	Cum arată
Ouă	Octombrie – Mai	Mase de 30–50 de ouă, acoperite cu o secreție ceroasă cenușiu-maronie, cu aspect de noroi uscat și crăpat, depuse pe scoarță sau pe obiecte netede.
Nimfe, vârstele I–III	Mai – Iulie	Corp de 3,5–9 mm, negru, cu pete albe distincte pe corp și picioare; foarte agile și săritoare.
Nimfe, vârsta IV	Iulie – August	Corp de 11–15 mm, roșu aprins, cu pete albe și dungi negre.
Adulți	Iulie – Noiembrie	21–27 mm; aripi anterioare gri cu pete negre la bază; aripi posterioare roșii cu pete negre și o bandă albă transversală.

Sursa datelor de identificare: *buletin de alertă regională ANF (Oficiul Fitosanitar Iași)* și EPPO Global Database.



<https://inspection.canada.ca/en/plant-health/invasive-pests-and-plants/insects/spotted-lanternfly/spotted-lanternfly>

Statut de reglementare

Lycorma delicatula este **organism de carantină pentru Uniunea Europeană**, inclus în Anexa II, Partea A a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2019/2072 (organisme de carantină a căror prezență nu este cunoscută pe teritoriul Uniunii). Specia figurează și pe **lista EPPO A1**. Până în prezent, ea **nu este prezentă în România și nici în Uniunea Europeană**; detectarea din Republica Moldova este prima din

imediata vecinătate.

Ce trebuie să faci**Măsuri de prevenire și vigilență:**

Inspecție vizuală: verificați materialul săditor lemnos, buștenii și mijloacele de transport provenite din zone afectate, căutând mase de ouă cu aspect de noroi uscat.

Depistare precoce: amplasarea de capcane lipicioase sau de tip „circle trunk” pe arborii gazdă, în special pe cenușar (*Ailanthus altissima*).

Nu deplasați materialul suspect: evitați transportul lemnului, paleților sau al altor obiecte pe care observați mase de ouă.

Notificare imediată: raportați orice suspiciune la oficiul fitosanitar județean sau la Autoritatea Națională Fitosanitară (ANF).

Depistarea precoce a unui organism de carantină face diferența între un focar izolat, care poate fi eradicat, și o răspândire greu de controlat. **Un singur semnalment la timp poate opri instalarea dăunătorului.**

De reținut**Pe scurt:**

Ce s-a întâmplat: prima detectare a *Lycorma delicatula* în R. Moldova (14 august 2026), focar izolat lângă granița României.

De ce contează: dăunător de carantină UE, polifag (100+ gazde), cu impact serios în viticultură și pomicultură.

Cum se răspândește: mai ales prin ouă depuse pe lemn, paleți, vehicule și mărfuri.

Ce faci: verifici, nu muți materialul suspect și anunți imediat ANF / Oficiul fitosanitar județean.

Șef serviciu/Șef birou/Coordonator,

ing. Magdea Emilian Traian

Întocmit,

dr.ing. Buciumaș Georgeta