

**BULETIN DE AVERTIZARE
NR 35 din 28.08.2026**

Autoritatea Națională Fitosanitară anunță producătorii agricoli și alte entități interesate despre apariția la granița statului nostru a dăunătorului *Lycorma delicatula* (Cicada de Ceară). Prima detectare oficială a acestui dăunător a fost făcută într-un focar izolat pe vegetație spontană (*Ailanthus altissima* – Cenușer/fals oțetar/arbore puturos) în Chișinău, Rep. Moldova (Notificare ANSA nr. 11-4796/2026).

**1. IMPORTANȚĂ & PLANTE GAZDĂ**

Lycorma delicatula este un dăunător polifag devastator, originar din Asia de Est. Atacă peste 100 de specii de plante din sectoarele horticole, viticole și forestiere.

Gazde preferate: *Ailanthus altissima* (Cenușar– gazdă primară), *Vitis vinifera* (Vițade-vie), *Juglans* (Nuc), *Acer* (Arțar), *Prunus* (Cireș, Piersic, Prun), *Malus* (Măr) și *Salix* (Salcie).

2. SIMPTOME ȘI DAUNE FITOSANITARE

□ Hrănire cu sevă: Nimfele (în special vârsta a IV-a) și adulții înțepă țesutul floemic și sug seva, determinând răni cu scurgeri de sevă, ofilirea lăstarilor, necrozarea ramurilor și slăbirea generală a plantei.

□ Excreție masivă de rouă de miere: Fumagina se poate dezvolta pe suprafața frunzelor situate sub zona de hrănire și pe vegetația din subarboret, ca urmare a excreției în cantități mari a deșeurilor zaharoase.

□ Inhibarea fotosintezei și impact economic: Stratul de fumagină acoperă frunzele și fructele, blocând fotosinteza și provocând defolierea timpurie și stagnarea vegetației subiacente. În plantațiile viticole și pomicole determină reducerea recoltelor, scăderea acumulării de zaharuri, deprecierea calității fructelor și decesul butucilor de viță-de-vie.

3. CĂI DE TRANSPORT ȘI RĂSPÂNDIRE

Răspândirea pe distanțe lungi are loc prin mijloace umane: depunerea pontei pe suporturi inerte transportate internațional (mase de ouă camuflate pe tulpini, ambalaje din lemn, paleți, piatră de carieră, containere și vehicule).

4. IDENTIFICARE VIZUALĂ

Ouă: Octombrie – Mai

Mase de 30–50 ouă acoperite de o secreție ceroasă cenușie-maronie, cu aspect uscat, crăpat (similar cu noroiul uscat), depuse pe scoarță sau obiecte netede.

Nimfe Vârstele I–III: Mai – Iulie

Corp de 3.5–9 mm, de culoare neagră completă cu pete albe distincte pe corp și picioare, extrem de agile și săritoare.

Nimfe Vârsta IV: Iulie – August

Corp de 11–15 mm, viu colorat în roșu aprins cu pete albe și dungi negre.

Adulți (21–27 mm): Iulie – Noiembrie

Aripile anterioare gri cu pete negre în treimea bazală și rețea fină apicală. Aripile posterioare sunt roșii cu pete negre la bază și o bandă albă transversală.

5. MĂSURI OBLIGATORII DE PREVENIRE

☐ Inspecție vizuală: Controlul riguros al materialului săditor lemnos, buștenilor și mijloacelor de transport din zone afectate.

☐ Depistare precoce: Amplasarea de capcane lipicioase sau de tip "circle trunk" pe arbori gazdă (*Ailanthus*).

☐ Notificare imediată: Raportați orice suspiciune către Autoritatea Națională Fitosanitară (ANF) sau Oficiul Fitosanitar Județean !

Pentru relații suplimentare vă puteți adresa **Oficiului Fitosanitar Botoșani** la tel/fax: 0231/518227 e-mail: ofbotosani@anfof.ro

Oficiul Fitosanitar BOTOSANI,

Prognoză și Avertizare fitosanitară

Ing. NECHIFOR Radu - consilier superior



Vă rugăm să afișați la loc vizibil Buletinul de Avertizare pentru informarea tuturor celor interesați.