

Alertă fitosanitară: Lycorma delicatula (molia pătată), detectată în Republica Moldova

Un focar izolat la granița României, aduce în atenție un risc real de introducere. Cea mai importantă măsură rămâne depistarea precoce și notificarea imediată a autorității fitosanitare.

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor din Republica Moldova, a confirmat oficial prima detectare pe teritoriul țării, a dăunătorului de carantină *Lycorma delicatula*. Focarul izolat, a fost identificat în Chișinău, într-o zonă industrială, pe vegetație spontană – în special pe *Ailanthus altissima* (cenușar). Au fost depistați atât adulți, cât și nimfe, pe mai mulți arbori.

În jurul zonei, a fost stabilită o arie delimitată și o zonă - tampon de **1 km**, cu măsuri de eradicare și monitorizare continuă. Pentru România, aflată în imediata vecinătate, înseamnă un **risc real de introducere și răspândire**, motiv pentru care vigilența și depistarea precoce, devin esențiale.

Lycorma delicatula, cunoscută ca „molia pătată”, este o insectă ce seamănă oarecum cu un fluture cu pete negre pe aripi, dar care este din ordinul hemiptere, fiind înrudită cu cicadele.


Lycorma delicatula face parte din familia Fulgoridae, cunoscută sub denumirea ”spotted lanternfly”. Specia este originară din China, Taiwan și Vietnam și s-a extins ulterior în Coreea de Sud, Japonia și Statele Unite.

Insecta adultă are aproximativ 25 mm lungime. Aripile anterioare sunt cenușii, cu pete negre, iar cele posterioare au pete roșii, vizibile în timpul zborului.

Molia pătată este o specie invazivă originară din Asia și e considerată un organism dăunător cu risc fitosanitar major. Insecta atacă peste 100 de specii de plante, inclusiv *Vitis vinifera* (vița-de-vie), *Juglans* (nuc), *Acer* (arțar), pomi fructiferi, salcia și plopul.

În anumite condiții, atacul asupra viței-de-vie poate provoca pierderi de până la 90% din producția de struguri.

Lycorma delicatula



Dăunătorul se hrănește cu seva plantelor și se poate răspândi prin transportul pasiv al ouălor și insectelor, inclusiv prin material săditor, lemn, mărfuri, vehicule și utilaje.

Femela depune ponta nu doar pe plante, ci și pe suprafețe inerte: ambalaje și paleți din lemn, bușteni, piatră de carieră, containere, utilaje și vehicule. Astfel, masele de ouă camuflate, pot călători internațional, neobservate. În acest caz, controlul materialului lemnos, al mijloacelor de transport și al mărfurilor provenite din zone afectate, este prima linie de apărare.

- Poate provoca pagube masive de până la 90% la culturile de viță-de-vie.
- Se hrănește cu seva plantelor și secretă o substanță zaharoasă care favorizează apariția unei ciuperci negre (fumagina), distrugând frunzele și ramurile.
- Nimfele și adulții înțeapă țesutul conductor (floemul) și extrag seva, provocând răni cu curgeri de sevă, ofilirea lăstarilor, necrozarea ramurilor și slăbirea generală a plantei.
- Insecta, elimină cantități mari de rouă de miere (excreții zaharoase), pe care se dezvoltă fumagina – un strat negru ce acoperă frunzele și fructele, blochează fotosinteza și duce la defoliere timpurie.

Aspectul insectei schimbându-se mult pe parcursul anului, reperele de mai jos, vă ajută la o identificare rapidă:

Stadiu	Perioadă	Cum arată
Ouă	Octombrie - Mai	Mase de 30–50 de ouă, acoperite cu o secreție ceroasă cenușie-maronie, cu aspect de noroi uscat și crăpat, depuse pe scoarță sau pe obiecte netede
Nimfe, vârstele I - III	Mai - Iulie	Corp de 3,5–9 mm, negru, cu pete albe distincte pe corp și picioare; foarte agile și săritoare.
Nimfe, vârsta IV Adulți	Iulie - August Iulie - Noiembrie	Corp de 11–15 mm, roșu aprins, cu pete albe și dungii negre. 21–27 mm; aripi anterioare gri cu pete negre la bază; aripi posterioare roșii cu pete negre și o bandă albă transversală.

Statut de reglementare *Lycorma delicatula* este organism de carantină pentru Uniunea Europeană, inclus în Anexa II, Partea A a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2019/2072 (organisme de carantină a căror prezență nu este cunoscută pe teritoriul Uniunii). Specia figurează și pe lista EPPO A1. Până în prezent, ea nu este prezentă în România și nici în Uniunea Europeană; detectarea din Republica Moldova este prima din imediata vecinătate.

Ce trebuie să faci

Măsuri de prevenire și vigilență:

Inspecție vizuală: verificați materialul săditor lemnos, buștenii și mijloacele de transport provenite din zone afectate, căutând mase de ouă cu aspect de noroi uscat.

Depistare precoce: amplasarea de capcane lipicioase sau de tip „circle trunk” pe arborii gazdă, în special pe cenușar (*Ailanthus altissima*).

Nu deplasați materialul suspect: evitați transportul lemnului, paleților sau al altor obiecte pe care observați mase de ouă.

Notificare imediată: raportați orice suspiciune la oficiul fitosanitar județean sau la Autoritatea Națională Fitosanitară (ANF).

Depistarea precoce a unui organism de carantină face diferența între un focar izolat, care poate fi eradicat, și o răspândire greu de controlat.

Un singur semnalment la timp poate opri instalarea dăunătorului.

De reținut

Pe scurt:


Ce s-a întâmplat: prima detectare a *Lycorma delicatula* în R. Moldova (14 august 2026), focar izolat lângă granița României.

De ce contează: dăunător de carantină UE, polifag (100+ gazde), cu impact serios în viticultură și pomicultură.

Cum se răspândește: mai ales prin ouă depuse pe lemn, paleți, vehicule și mărfuri.

Ce faci: verifici, nu muți materialul suspect și anunți imediat ANF / Oficiul fitosanitar județean.

Coordonator Oficiul Zonal OT – TR
Rădulescu Mariana



Responsabil prognoză și avertizare,
Lungu Felicia