

**BULETIN DE AVERTIZARE**  
**Nr. 48 din 06. 08. 2026**

**Monitorizarea** culturilor este o recomandare pe care Oficiul Fitosanitar Giurgiu o face de fiecare dată, când în urma inspecțiilor și determinărilor efectuate în teren, se observă prezența organismelor dăunătoare pe plante, (boli și dăunători) iar pentru a prîntîmpina daunele pe care le-ar produce, se impune luarea tuturor măsurilor pentru a împiedica înmulțirea și dezvoltarea acestora.

**Omida fructificațiilor** (*Helicoverpa armigera*) este un dăunător polifag care atacă foarte multe specii de plante (porumb, tomate, lucernă, lupin, pepiniere, leguminoase anuale și perene, plante ornamentale, etc) Acest dăunător provoacă daune semnificative prin hrănirea cu frunze, flori și păstăi, fructe, reducând astfel producția și calitatea culturii.

**Larva** atinge o lungime de până la 4 cm, are o culoare variabilă (verde deschis până la maroniu-roșatic) și prezintă dungi longitudinale de-a lungul corpului și două dungi laterale mai închise la culoare.

**Pupa** este de culoare brun-închis.

**Fluturile** este nocturn, cu aripi de culoare galben-brun, cu pete mai închise la culoare.

**Ouale** sunt mici, de aproximativ 0,5 mm, de culoare alba-galbuie.

**Daune produse**

Omizile rod frunzele, lăsând doar nervurile, atacă păstăile, fructele consumând semințele și provocând perforații.

Daunele cauzate de omida fructificațiilor pot reduce semnificativ atât cantitatea, cât și calitatea recoltei.

În urma atacului omizii fructificațiilor la stiuetele de porumb, pe leziunile produse se pot instala ciupercile *Fusarium graminearum*, *Fusarium verticillioides* sau *Aspergillus flavus*. Micotoxinele produse de aceste ciuperci contaminează cariopsele de porumb, care pot deveni toxice pentru animale și oameni.

**Combaterea culturală:**

Măsuri precum rotația culturilor;

Lucrările solului, arături adânci, determinând distrugerea pupelor care au iernat în sol;

Combaterea buruienilor, deoarece așa le eliminăm sursa de hrană a larvelor și dăunătorilor;

Cultivarea de plante capcană (bumbac, in, ricin, năut, porumb) semănate înaintea înființării culturii pentru a atrage fluturii să depună pontă, după care eliminăm plantele;

Efectuarea tratamentelor imediat după eclozare, atunci când larvele pentru a se hrăni, necesită un efort energetic foarte mare;

Se vor efectua tratamente chimice, după o monitorizare a culturii, ținându-se cont de stadiul de dezvoltare al plantelor, dacă aplicarea produselor de protecția plantelor este justificată.

Produse de protecția plantelor omologate, recomandate a se folosi când situația se impune:

BACTOSPEINE DF/(DIPEL DF - a doua denumire comercială)- 0,6-1,0 kg/ha –

se administrează de la ecloziune și primele stadii, Porumb (Sfredelitorul porumbului, Omida păroasă a dudului ), Soia (Fluture de scaiet, Omida păroasă a dudului)

CORAGEN (VOLIAM - a doua denumire comercială)

-125 ml/ha porumb, timp pauză 7 zile;

- 0,6-1,0 kg/ha, Soia (Fluture de scaiet, omida păroasă a dudului),

- 0,6-1,0 kg, Porumb (Sfredelitorul porumbului, omida păroasă a dudului ), timp de pauză 2 zile ;

AMPLIGO - 0,2 l/ha, Porumb (Sfredelitorul porumbului, Viermele vestic al rădăcinilor, Omida fructelor, Buha fructificațiilor) timp de pauză 7 zile.

**SAU ALTE PRODUSE DE PROTECȚIA PLANTELOR OMOLOGATE!!!**

Pentru a adera soluția la frunză se va folosi un adjuvant

**IMPORTANT!**

Se recomandă spre utilizare numai produse de protecția plantelor omologate, care se găsesc în Pest Expert.

Produsele fitosanitare trebuie să fie utilizate în mod corespunzător, doar în scopul pentru care acestea au fost omologate și numai în conformitate cu instrucțiunile de utilizare de pe etichetă.

**CERINȚE OBLIGATORII PENTRU FERMIERI**

- să utilizeze p.p.p doar în scopul pentru care acestea au fost omologate ;

- să nu aplice tratamente cu p.p.p în zonele de protecție a resurselor de apă, în zonele de protecție sanitară și ecologică, precum și în alte zone protejate stabilite în condițiile legii

-să respecte condițiile de depozitare, manipulare și utilizare a p.p.p în exploatațiile agricole , așa cum sunt prevazute în Ghidul pentru utilizarea în siguranță a produselor de protecția a plantelor emis de Autoritatea Națională Fitosanitară.  
- să completeze la zi registrul de evidență a tratamentelor și să păstreze bonurile de casă, facturile pe o perioadă de cel puțin 3 ani.

Alte recomandări:

- Verificați cu atenție, recomandările cu privire la compatibilitatea produselor atunci când intenționați să aplicați amestecuri de produse de protecție a plantelor


- Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător

- Respectați cu strictețe normele de lucru cu produse pentru protecție a plantelor, normelor de protecție și securitatea muncii, de protecție a albinelor și a animalelor în conformitate cu Legea nr. 383/2013 a apiculturii, cu modificările și completările ulterioare și Ordinul nr. 127/1991 al ACA din România, Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației, 15b/3404/1991 al Dep. Pentru Administrație Locală și 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, precum și cu Protocolul de colaborare nr. 328432/2015, încheiat cu ROMAPIS privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu produse pentru protecția plantelor.

Respectați prevederile Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 297/2017 privind Codul de bune practici pentru utilizarea în siguranță a produselor de protecție a plantelor.

Respectați obligațiile ce vă revin conform Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale , al ministrului mediului, apelor și pădurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiționalitatea în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, cu modificările ulterioare.

#### MONITORIZARE TERITORIU - IMAGINI DIN CULTURI





Avizat,  
Coordonator OF Giurgiu  
Tăranu Mihaela

Elaborat,  
Cojocaru Mariana