

BULETIN DE AVERTIZARE*Quadraspidiotus perniciosus* (sursa internet)

Monilioza (sursa internet)

*Polistigma rubrum* (sursa internet)

Condițiile climatice din ultimele zile au favorizat apariția și dezvoltarea dăunătorului/bolii: **Păduchele din San Jose Gen. 2** (*Quadraspidiotus perniciosus*), **Monilioză prun** (*Monilinia spp.*), **Pătare roșie** (*Polistigma rubrum*), care poate/pot cauza pierderi importante la culturile:

Prun

Pentru prevenire și combatere se recomandă executarea tratamentului: **Gen. II - păduche din San Jose**

Folosiți unul din produsele sau din amestecurile de mai jos, după caz:

1. **Poleci** (Deca 2,5 EC) = 0,05 - 0,075% + **Signum** (Syrex Star) = 0,5 kg/ha sau
2. **Juvinal 10 EC** = 0,05% + **Teldor 500 SC** = 0,8 l/ha.

Perioada optimă de tratament: păduchele din San Jose - la apariția primelor larve mobile.

Atenție! Analiza ramurilor infestate de păduche se face desprinzând cu acul țestele și observarea apariției larvelor. **tratamentul II** – la interval de 7 – 9 zile de la efectuarea tratamentului anterior, cu un insecticid din altă grupă chimică.

Alte recomandări:

Atenție! Respectați timpul de pauză specificat pentru consumul fructelor.

- In cazul tratamentelor complexate efectuați în prealabil testul de compatibilitate.
- Pentru combaterea acestor organisme de dăunare puteți folosi și alte produse de protecția plantelor omologate pentru a fi utilizate pe teritoriul României. Utilizați cu precauție produsele fitosanitare.
- Citiți întotdeauna eticheta și informațiile despre produs înainte de utilizare.
- La prepararea soluției flacoanele se agită bine înainte de golirea în rezervorul instalației de stropit;
- Clătiți ambalajele produselor de trei ori și goliți apa de clătire în cuva. Aplicați pe parcela tratată restul de soluție rămasă diluată cu apa de clătire;
- **Alte măsuri de combatere:** Măsuri alternative de combatere: mecanice, fizice, bio/ogice. Metodele durabile: biologice, fizice, mecanice și alte metode nechimice trebuie preferate metodelor chimice, dacă acestea asigură un control corespunzător al organismelor dăunătoare.
- **Agricultorii** care prin activitatea lor depozitează, manipulează și utilizează produse de protecție a plantelor au următoarele **obligatii**:

1. Să utilizeze numai produse de protecție a plantelor omologate de Comisia Națională de Omologare a Produselor de Protecție a Plantelor.
2. Să utilizeze produsele de protecție a plantelor doar în scopul pentru care acestea au fost omologate și numai în conformitate cu instrucțiunile de utilizare.
3. Produsele de protecție a plantelor clasificate în categoriile de **toxicitate acută** (din categoriile 1, 2 și 3 care conțin **pictograma GHS06** și sunt marcate cu cuvântul de avertizare „Pericol”) pot fi utilizate exclusiv de către persoanele juridice care dețin o **autorizație specială** pentru utilizarea produselor de protecție a plantelor și care dispun de personal calificat și instruit în acest sens;

4. Să nu aplice tratamente cu produse de protecție a plantelor în zonele de protecție a resurselor de apă, în zonele de protecție sanitară și ecologică, precum și în alte zone protejate stabilite în condițiile legii.
5. Să respecte condițiile de depozitare, manipulare și utilizare a produselor de protecție a plantelor în exploatațile agricole, așa cum sunt prevăzute în "**Ghidul pentru utilizarea în siguranță a produselor de protecție a plantelor**" - emis de Autoritatea Națională Fitosanitară;
6. Să păstreze o perioadă de cel puțin 3 ani documentele de evidență contabilă a produselor de protecție a plantelor depozitate și utilizate în exploatație, precum și **registru de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor, conform modelului:**

Data efectuării tratament. (ziua luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Timpul aplicării / fenofaza culturii	Tratamentul efectuat					Numele, prenumele pers. responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. și data document prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de dăunare: boli/dăunători/buruieni	Denumire PPP folosit	Doza omologată /doza folosită	Suprafața	Cantități utilizate (kg, l)			

7. Pentru protecția familiilor de albine respectați Ordinul comun nr. 45/1991/127/1786/68/15b/1991 al MADR privind unele măsuri pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu pesticide și Legea apiculturii nr. 383/2013.

Responsabil Prognoză și Avertizare,
Dr. Ing. Carmen Miroiu

