

ANEXA 6.



Nr. 1198 /O/24.08.2026.

BULETIN DE AVERTIZARE

Nr. 24 /24.08.2026.

Pentru prevenirea și combaterea organismelor dăunătoare: ***Phyllotreta atra*** sau **puricele negru al verzei**.

Adultul este un gândăcel de 2–3 mm lungime, cu corpul oval-alungit, de culoare neagră, cu un ușor luciu metalic verzui-albăstrui. Antenele și picioarele sunt tot negre. Oul este oval, de culoare alb-gălbuie. Larva, ajunsă la maturitate, are corpul alungit, alb-gălbui, cu capul negru și lucios. Specia realizează o singură generație pe an și iernează în stadiul de adult, adăpostit sub resturile vegetale rămase pe câmp după recoltare. Adulții ies din locurile de iernare devreme, de regulă la sfârșitul lunii martie sau la începutul lunii aprilie, hrănindu-se inițial pe crucifere spontane (muștar, rapiță de toamnă, ridiche sălbatică). Ulterior migrează pe culturile înființate — răsaduri de varză, conopidă etc. — imediat după răsărire sau plantare, moment în care atacul poate fi deosebit de agresiv. Depunerea ouălor are loc în sol, în jurul plantelor gazdă, iar larvele apărute se hrănesc cu rădăcinile plantelor. Se împupeză în sol, iar noii adulți apar spre sfârșitul verii provocând ciuruirea frunzelor.



https://www.botanistii.ro/blog/insecte-daunatoare-puricele-negru-al-verzei-phyllotreta-atra/?srsltid=AfmBOorVfHLaIS3WVep3t4FFZDQZ_N2baIhRK51ocqxqg2hP12k663T6


Se recomandă intervenția atunci când se constată o densitate de aproximativ 3 adulți/plantă.

***Phyllotreta nemorum* sau puricele vărgat al verzei.**

Insecta adultă are corpul oval de 2,5-3,5 mm, este neagră lucioasă, iar pe elitre există câte o bandă longitudinală gălbuie. Picioarele posterioare sunt mai dezvoltate și adaptate pentru sărit. Ouăle sunt ovale, alb-gălbui, hialine, de 0,3 mm lungime. Larva este gălbuie, de 4-5 mm lungime. Prezintă o singură generație pe an și iernează în litieră, în stadiul de adult. Adulții hibernanți părăsesc locul de iernare în aprilie-mai, se hrănesc pe diferite crucifere, după care depun ouăle izolat, pe frunze, la baza nervurilor. Larvele apărute după 10-14 zile se hrănesc prin minarea tulpinilor tinere sau pețiolului frunzelor. După 3 săptămâni se împupeză în sol, urmând ca în 2 săptămâni să apară adulții.

Pentru prevenire și combaterea puricilor se recomandă efectuarea unor tratamente cu insecticidul:

- **DECIS EXPERT 100 EC (NUYARD)** – a doua denumire comercială în doză de 0,075 l/ha sau cu alte produse pentru protecția plantelor omologate în România.



<https://www.inaturalist.org/observations/139217946>

Perioada optimă pentru efectuarea primului tratament este când se atinge pragul economic de dăunare de 1-2 adulți plantă, sau când mai mult de 10% din plante sunt atacate. Se recomandă efectuarea tratamentelor dimineața sau seara, când puricii nu sunt foarte activi și sar mai puțin.

Alte recomandări:

Verificați, cu mare atenție recomandările cu privire la compatibilitatea produselor atunci când intenționați să aplicați amestecuri de produse de protecție a plantelor!

Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător!

Respectați cu strictețe normele de lucru cu produse pentru protecția plantelor, normele de protecție și securitatea muncii, de protecție a albinelor și a animalelor în conformitate cu: Legea nr. 383/2013 a apiculturii cu modificările și completările ulterioare și Ordinul nr. 127/1991 al A.C.A. din România, Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației, 15b/ 3404/1991 al Dep. Pentru Administrație Locală și 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor precum și cu Protocolul de colaborare nr. 328432/2015, încheiat cu ROMAPIS (privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine împotriva intoxicației cu produse pentru protecția plantelor);

Respectați prevederile Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 297/2017 privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea în siguranță a produselor de protecția plantelor.

Respectați obligațiile ce vă revin conform Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului mediului, apelor și pădurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 352/ 636/ 54/ 2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiționalitatea în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermierii în România, cu modificările ulterioare.

Utilizatorii de produse de protecție a plantelor trebuie să dețină certificatul de formare profesională dobândit prin instruire privind utilizarea durabilă a produselor de protecție a plantelor. Cursul este disponibil online, pe platforma FITS: <https://fits.anfdf.ro>, iar certificatul este valabil 5 ani.

Deținătorii de echipamente de aplicarea produselor de protecție a plantelor sunt obligați să efectueze inspecția tehnică periodică a acestor echipamente, odată la 3 ani.

Șef serviciu zonal HR-SV,

Romfeld Păunița

A blue ink signature of Romfeld Păunița.



www.anfdf.ro

Întocmit,

Molnar Zoltan

A blue ink signature of Molnar Zoltan.