

BULETIN DE AVERTIZARE
Nr. 44 din 30.07.2026

Oficiul Fitosanitar Giurgiu recomandă monitorizarea culturilor de plante aromatice (Leuștean, Pătrunjel, Telina) și prevenirea, controlul și combaterea organismelor dăunătoare. (Septorioza, Făinarea, Alternarioza, Limaxul cenușiu)

Septorioza țelinei, leușteanului și a pătrunjelului. (*Septoria spp*)

Pe frunze apar pete cu forme neregulate, de culoare cenușiu-gălbui, înconjurată de o bordură brună. Petele evoluează, și devin albicioase. Petele confluează, iar frunzele puternic atacate se îngălbenesc și se usucă. Într-un stadiu mai avansat al bolii apar puncte mici și negre, ce reprezintă fructificațiile ciupercii. Apariția bolii este favorizată de temperaturile ridicate și umiditate atmosferică ridicată. Boala se transmite prin spori ciupercii și rezistă pe timpul iernii în resturile vegetale, în sămânța infectată. Se mai poate răspândi prin precipitații sau prin apa de irigare contaminată și prin mișcarea oamenilor printre plante.

Făinarea (*Erysiphe umbelliferarum*)

Apariția bolii este favorizată de temperaturile ridicate și de secetă. Primele simptome sunt reprezentate de apariția unor pete albe cu aspect făinos (miceliu) pe suprafața frunzelor. Frunzele atacate se îngălbenesc și încep să se ofilească. Boala evoluează, iar petele albe de pe suprafața frunzelor devin cenușii. În caz de atac sever, țesuturile aflate sub stratul prăfos, se usucă.

Alternarioza (*Alternaria spp*)

Pe marginea frunzelor apar pete mici de culoare brună, înconjurată de o zonă galbenă. În caz de atac sever, frunzele sunt uscate complet. Ca urmare, cultura are aspect de ars. Inițial, ciuperca atacă frunzele mature, iar apoi se extinde și pe frunzele tinere. Într-un final, foliajul plantei este distrus în totalitate.

Făinarea



Alternarioza



Septorioza




Limaxul cenușiu (*Deroceras agreste*)

Este o specie polifagă ce atacă numeroase plante legumicole, flori, vița de vie etc. Produce pagube mari în culturile de legume. Perforează frunzele, roade pețiolul și poate ataca zona coletului.

Limaxul



Atac produs de Limax



Monitorizarea regulată a plantelor și aplicarea de măsuri preventive pot reduce semnificativ incidența bolilor și a dăunătorilor".

Măsuri de control și combatere a limaxilor



Amenajarea refugiilor - **Limacșii** se adapostesc în timpul zilei de caldura soarelui, care îi deshidratează. Se pot amenaja spații unde să se ascundă pe timpul zilei și unde pot fi culeși mai ușor. Acestea pot fi simple scânduri, țigle, cărămizi, etc. lăsate pe sol, sub care pot intra;

Plasarea barierelor repelente în jurul culturii - se pot pune pe sol materiile cu efect abraziv, care irită **limacșii** la deplasare și care descurajează înaintarea acestora, cum ar fi: cenusa, varul nestins, nisipul și acele de conifere;

Una dintre cele mai bune măsuri de prevenție care se poate lua, este să ne asigurăm ca grădina nu rămâne prea umedă. Densitatea plantelor să fie astfel încât aerul să poată circula printre ele și udarea devreme, în timpul zilei, astfel încât umiditatea suplimentară să aibă timp să se evapore înainte de căderea nopții, când melcii ies.

Pentru combatere se poate folosi unul dintre următoarele produse de protecția plantelor

ZOXIS 250 SC (NORIOS 250 SC- a doua denumire comercială) - Făinarea, septorioza, alternarioza

- Leuștean - 1,0 L/ha, timp de pauză 7 zile

- Pătrunjel (câmp și spații protejate) - 1,0 L/ha, timp de pauză 14 zile în câmp și 30 zile spații protejate

- Telină - 0,8 L/ha, timp de pauză 14 zile

DAGONIS - Pătrunjel

Rădăcinoase și tuberculifere, cu excepția sfeclei de zahăr (sfecla roșie, țelina, hrean, topinambur, păstârnac, ridichi, salsifi (barba caprei), radacini de valeriana, radacini de ginseng, condimente)

Făinarea 0,6 L/ha se aplică de la faza de 2 frunze până la dezvoltarea completă

Alternarioza 1,0 L/ha, se aplică de la faza de 2 frunze până la dezvoltarea completă

Putregaiul alb 2,0 L/ha se aplică de la faza de 2 frunze până la dezvoltarea completă

ORTIVA TOP (SIMPLA a doua denumire comercială) 1,0 l/ha - Alternarioza, făinarea, putregaiul

- Pătrunjel (câmp), timp de pauză 14 zile

- Telina, timp de pauză 14 zile

SAU ALTE PRODUSE DE PROTECȚIA PLANTELOR OMOLOGATE!!!

PRODUSUL DAGONIS SE POATE FOLOSI ÎN CONTINUARE PENTRU COMBATEREA BOLILOR LA CULTURILE AGRICOLE

OMOLOGAREA A FOST PRELUNGITĂ PANA LA DATA DE 31.10.2028

Pentru a adera soluția la frunză se va folosi un adjuvant.

IMPORTANT!!!

Se recomandă spre utilizare, numai produse de protecția plantelor omologate, care se găsesc în Pest Expert;

Produsele fitosanitare trebuie să fie utilizate în mod corespunzător, doar în scopul pentru care acestea au fost omologate și numai în conformitate cu instrucțiunile de utilizare de pe etichetă.

CERINTE OBLIGATORII PENTRU FERMIERI

- să utilizeze p.p.p doar în scopul pentru care acestea au fost omologate ;

- să nu aplice tratamente cu p.p.p în zonele de protecție a resurselor de apă, în zonele de protecție sanitară și ecologică, precum și în alte zone protejate stabilite în condițiile legii;

- să respecte condițiile de depozitare, manipulare și utilizare a p.p.p în exploatarea agricolă, așa cum sunt prevăzute în Ghidul pentru utilizarea în siguranță a produselor de protecția a plantelor emis de Autoritatea Națională Fitosanitară;

- să completeze la zi registrul de evidență a tratamentelor și să păstreze bonurile de casă, facturile pe o perioadă de cel puțin 3 ani. tratamente.

Alte recomandări:

- Verificați cu atenție, recomandările cu privire la compatibilitatea produselor atunci când intenționați să aplicați amestecuri de produse de protecție a plantelor

- Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător

- Respectați cu strictețe normele de lucru cu produse pentru protecție a plantelor, normelor de protecție și securitatea muncii, de protecție a albinelor și a animalelor în conformitate cu Legea nr. 383/2013 a apiculturii, cu modificările și completările ulterioare și Ordinul nr. 127/1991 al ACA din România, Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației, 15b/3404/1991 al Dep. Pentru Administrație Locală și 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, precum și cu Protocolul de colaborare nr. 328432/2015, încheiat cu ROMAPIS privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu produse pentru protecția plantelor.

Respectați prevederile Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 297/2017 privind Codul de bune practici pentru utilizarea în siguranță a produselor de protecție a plantelor.



AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ
OFICIUL FITOSANITAR ZONAL ILFOV-CĂLĂRAȘI-GIURGIU
OFICIUL FITOSANITAR GIURGIU
Str. Ghizdarului Nr. 2, Giurgiu, Tel+40787602650,
email ofgiurgiu@anf.ro, cod poștal 080583,

Respectați obligațiile ce vă revin conform Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale , al ministrului mediului, apelor și pădurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiționalitatea în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, cu modificările ulterioare.

MONITORIZARE TERITORIU – IMAGINI DIN TEREN



Avizat,
Coordonator OF Giurgiu
Tăranu Mihaela

Elaborat,
Cojocaru Mariana