


Nr. 1109/O din 01.09.2026

Alertă fitosanitară: *Lycorma delicatula* (Cicada de ceară) detectată în Republica Moldova.



Un focar izolat la granița României, aduce în atenție un risc real de introducere. Cea mai importantă măsură rămâne depistarea precoce și notificarea imediată a autorității fitosanitare.

Autoritatea Națională Fitosanitară- Oficiul Fitosanitar Ilfov anunță toți producătorii agricoli și alte entități interesate despre apariția la granița României a dăunătorului de carantină ***Lycorma delicatula*** (Cicada de ceară). Prima detectare oficială a acestui dăunător a fost făcută la data de **14 august 2026** în municipiul Chișinău, Republica Moldova, într-o zonă industrială, pe vegetație spontană *Alianthus altissima* (cenușar), conform notificării nr. 11-4796/2026 emisă de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA). Unde au fost depistați atât adulți cât și nimfe, pe mai mulți arbori.

În jurul zonei a fost stabilită o arie delimitată și o zonă- tampon de **1 km.**, cu măsuri de eradicare și monitorizare continuă. Pentru România, aflată în imediata vecinătate, acest lucru înseamnă un **risc real de introducere și răspândire**, motiv pentru care vigilența și depistarea precoce devin esențiale.

PLANTE GAZDĂ:

Lycorma delicatula, cunoscută în engleză drept „spotted lanternfly”, este o insectă din ordinul Hemiptera (familia Fulgoridae), originară din China, Taiwan și Vietnam și s-a extins ulterior în Coreea de Sud, Japonia. Este un dăunător puternic polifag: atacă peste 100 de specii de plante din sectoarele horticole, viticole și forestiere.

Gazda sa preferată este *Ailanthus altissima* (cenușarul), dar printre plantele gazdă importante economic se numără *Vitis vinifera* (vița-de-vie), *Juglans* (nuc), *Acer* (arțar), *Prunus* (cireș, piersic, prun), *Malus* (măr) și *Salix* (salcie).

DESCRIEREA DĂUNĂTORULUI ȘI MODUL DE ATAC:

Insecta adultă are aproximativ 25 mm lungime. Aripile anterioare sunt cenușii, cu pete negre, iar cele posterioare au pete roșii, vizibile în timpul zborului.

Femela depune ouă nu doar pe plante, ci și pe suprafețele inerte: ambalaje și paleți din lemn, bușteni, piatră de carieră, containere, utilaje și vehicule. Astfel masele de ouă camuflate, pot călători internațional, neobservate. În acest caz, controlul materialului lemnos, al mijloacelor de transport și al mărfurilor provenite din zone afectate, este prima linie de apărare.

Nimfele (în special de vârsta a IV-a) și adulții înțepă țesutul conducător (floemul) și **extrag seva**, provocând răni cu scurgeri de sevă, ofilirea lăstarilor, necrozarea ramurilor și slăbirea generală a plantei. Insecta elimină cantități mari de rouă de miere (escreșii zaharoase), pe care se dezvoltă **fumagina**, stratul de fumagină acoperă print-un strat negru frunzele și fructele, blocând fotosinteza și provocând defolierea timpurie. În plantațiile viticole și pomicele, efectul este direct economic prin: reducerea recoltelor, scăderea acumulării de zaharuri, deprecierea calității fructelor și pierderea butucilor de viță – de –vie.

STADIUL DE DEZVOLTARE AL DĂUNĂTORULUI:

Aspectul insectei se schimbă mult pe parcursul anului. Reperele de mai jos vă ajută la o identificare rapidă.

OFICIUL FITOSANITAR ZONAL ILFOV- CĂLĂRAȘI – GIURGIU

OFICIUL FITOSANITAR ILFOV, Str. Zorilor nr.21, Ștefăneștii de Jos, județul Ilfov
Tel:021.3379.739, e-mail:ofilfov@anf.ro

STADIU	PERIOADĂ	CUM ARATĂ
OUĂ	OCTOMBRIE - MAI	Mase de 30-50 ouă, acoperite cu secreție ceroasă cenușie – maronie, cu aspect de noroi uscat și crapat, depuse pe scoarță sau pe obiecte netede.
NIMFE vârstele I-III	MAI - IULIE	Corp de 3,5—9 mm, negru, cu pete albe distincte pe corp și picioare, foarte agile și săritoare.
NIMFE Vârsta a IV-a	IULIE- AUGUST	Corp 11-15mm, roșu aprins, cu pete albe distincte pe corp și dungi negre.
ADULȚII	IULIE - NOIEMBRIE	21-27 mm; aripi anterioare gri cu pete negre la bază; aripi posterioare roșii cu pete negre și o bandă albă transversală.

Statut de reglementare *Lycorma delicatula* este organism de carantină [pentru Uniunea Europeană, inclus în Anexa a a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2019/2072 (organisme de carantină a căror prezență nu este cunoscută pe teritoriul Uniunii)]. Specia figurează și pe lista EPPO A1. Până în prezent, ea nu este prezentă în România și nici în Uniunea Europeană; detectarea în Republica Moldova este prima din imediata vecinătate.

Ce trebuie să faci

MĂSURI DE PREVENIRE ȘI VIGILENȚĂ:

Inspecție vizuală: verificarea riguroasă a materialului săditor lemnos, bușteni și mijloace de transport provenite din zone afectate, căutând mase de ouă cu aspect de noroi uscat.

Depistare precoce: un dăunător de carantină face diferență între un focar izolat, care poate fi eradicat, și o răspândire greu de controlat, monitorizarea dăunătorului se mai poate face prin, amplasarea de capcane lipicioase sau de tip „circle trunk” pe arbori gazdă, în special (*Alianthus altissima*).

Notificare imediată: Raportați orice suspiciune către Autoritatea Națională Fitosanitară (ANF) sau Oficiul Fitosanitar Județean.

Șef serviciu/Coordonator,

Daniela VOINESCU



Responsabil prognoză și avertizare,

Maria BOGDAN

Semnatar: Voinescu Daniela-Florina
Data: 2026.09.01 13:06:48 +0300

