

BULETIN DE AVERTIZARE
Nr. 44 din 09.09.2026**Alertă fitosanitară: *Lycorma delicatula* detectat pentru prima dată în Republica Moldova**

<https://gd.eppo.int/taxon/LYCMDE/photos>

Un focar izolat, la granița României, aduce în atenție un risc real de introducere. Cea mai importantă măsură rămâne depistarea precoce și notificarea imediată a autorității fitosanitare.

La **14 august 2026**, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) din Republica Moldova a confirmat oficial **prima detectare pe teritoriul țării** a dăunătorului de carantină *Lycorma delicatula*. Focarul, izolat, a fost identificat în municipiul Chișinău, într-o zonă industrială, pe vegetație spontană — în special pe *Ailanthus altissima* (cenușar). Au fost depistați atât adulți, cât și nimfe, pe mai mulți arbori. În jurul zonei a fost stabilită o arie delimitată și o zonă-tampon de **1 km**, cu măsuri de eradicare și monitorizare continuă. Pentru România, aflată în imediata vecinătate, acest lucru înseamnă un **risc real de introducere și răspândire** — motiv pentru care vigilența și depistarea precoce devin esențiale.

Lycorma delicatula, cunoscută în engleză drept „spotted lanternfly”, este o insectă din ordinul Hemiptera (familia Fulgoridae), originară din Asia de Est. Este un dăunător puternic **polifag**: atacă **peste 100 de specii** de plante din sectoarele horticole, viticole și forestiere. Gazda sa preferată este *Ailanthus altissima* (cenușarul), dar printre plantele gazdă importante economic se numără *Vitis vinifera* (vița-de-vie), *Juglans* (nuc), *Acer* (arțar), *Prunus* (cireș, piersic, prun), *Malus* (măr) și *Salix* (salcie).

Nimfele și adulții înțepă țesutul conducător (floemul) și **extrag seva**, provocând răni cu scurgeri de sevă, ofilirea lăstarilor, necrozarea ramurilor și slăbirea generală a plantei. În plus, insecta elimină cantități mari de **rouă de miere** (excreții zaharoase), pe care se dezvoltă **fumagina** — un strat negru ce acoperă frunzele și fructele, blochează fotosinteza și duce la defoliere timpurie. În plantațiile viticole și pomicole, efectul este direct economic: recolte reduse, acumulare scăzută de zaharuri, deprecierea calității fructelor și chiar pieirea butucilor de vița-de-vie.

Pe distanțe lungi, *Lycorma delicatula* se răspândește în principal prin **transportul ouălelor**. Femela depune ponta nu doar pe plante, ci și pe suprafețe inerte: ambalaje și paleți din lemn, bușteni, piatră de carieră, containere, utilaje și vehicule. Astfel, masele de ouă camuflate pot călători internațional, neobservate. De aceea, controlul materialului lemnos, al mijloacelor de transport și al mărfurilor provenite

din zone afectate este prima linie de apărare. Aspectul insectei se schimbă mult pe parcursul anului. Reperele de mai jos ajută la o identificare rapidă:

Stadiu	Perioadă	Cum arată
Ouă	Octombrie – Mai	Mase de 30–50 de ouă, acoperite cu o secreție ceroasă ce-nușiu-maronie, cu aspect de noroi uscat și crăpat, depuse pe scoarță sau pe obiecte netede.
Nimfe, vârstele I–III	Mai – Iulie	Corp de 3,5–9 mm, negru, cu pete albe distincte pe corp și picioare; foarte agile și săritoare.
Nimfe, vârsta IV	Iulie – August	Corp de 11–15 mm, roșu aprins, cu pete albe și dungi negre.
Adulți	Iulie – Noiembrie	21–27 mm; aripi anterioare gri cu pete negre la bază; aripi posterioare roșii cu pete negre și o bandă albă transversală.



<https://inspection.canada.ca/en/plant-health/invasive-pests-and-plants/insects/spotted-lanternfly/spotted-lanternfly>

Lycorma delicatula este **organism de carantină pentru Uniunea Europeană**, inclus în Anexa II, Partea A a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2019/2072 (organisme de carantină a căror prezență nu este cunoscută pe teritoriul Uniunii). Specia figurează și pe **lista EPPO A1**. Până în prezent, ea **nu este prezentă în România și nici în Uniunea Europeană**; detectarea din Republica Moldova este prima din imediata vecinătate.

Măsuri de prevenire și vigilență:

Inspecție vizuală: verificați materialul săditor lemnos, buștenii și mijloacele de transport provenite din zone afectate, căutând mase de ouă cu aspect de noroi uscat.

Depistare precoce: amplasarea de capcane lipicioase sau de tip „circle trunk” pe arborii gazdă, în special pe cenușar (*Ailanthus altissima*).

Nu deplasați materialul suspect: evitați transportul lemnului, paleților sau al altor obiecte pe care observați mase de ouă.

Notificare imediată: raportați orice suspiciune la oficiul fitosanitar județean sau la Autoritatea Națională Fitosanitară (ANF).

Responsabil Prognoză și Avertizare:

Cons. superior Csaba SZABO