

BULETIN DE AVERTIZARE**Nr. 81 din 29.09.2026**

Pentru prevenirea și combaterea organismelor dăunătoare: **PHYLLOTETRA SPP.** (puricii de pământ); **PSYLLIODES CHRYSOCEPHALA** (puricele albastru al rapiței); **ATHALIA ROSAE** (viespea rapiței); **AGRIOLIMAX AGRESTE** (limaxul de câmp); **PLLUTELA XYLOSTELLA** (molia verzei).

Oficiul Fitosanitar Ilfov recomandă efectuarea tratamentelor fitosanitare la cultura de: **RAPIȚĂ**

Phyllotreta spp. (purici de pământ), dăunătorul poate produce pagube mari în culturile de rapiță. Adulții rod epiderma superioară și parenchimul sub formă de orificii circulare; aspect ce poartă denumirea de "ciuruirea frunzelor". Frunzele atacate puternic se usucă și poate duce la compromiterea culturii.

Psylliodes chrysocephala (puricele albastru al rapiței), dăunătorul are o singură generație pe an. Apogeul apariției adulților este la sfârșitul lunii septembrie, când aceștia mănâncă frunzele și lăstari plantelor de rapiță. După aproximativ două săptămâni, femelele încep depunerea pontelor la 1-2 cm. adâncime în sol în apropierea plantei, eclozarea putând avea loc în orice moment începând cu luna octombrie, în funcție de temperatură. Daunele cele mai importante sunt produse de către larve care rod tuneluri prin pețiolul frunzelor și tulpinilor în care dese ori părunde apa ce îngheață și duce la crăparea acestora. Aceste zone reprezintă porți de intrare pentru o serie de ciuperci patogene ca *Phoma* l. Pe fondul unei vigori mult slăbite de atacul adulților, larvele de *Psylliodes* c., pot provoca uneori moartea plantelor de rapiță.

Athalia rosae (viespea rapiței) are două generații pe an, iernând ca larvă complet dezvoltată în sol. Larvele abia eclozate minează frunzele; cele mai dezvoltate rod epiderma inferioară și mezofilul frunzelor. În primele stadii de dezvoltare, larvele produc orificii în fruze, iar în stadii mai avansate consumă frunzele complet, lăsând intacte numai nervurile principale, rezultând defolierea aproape completă a plantei, la atacuri puternice plantele se usucă. Pagubele cele mai mari le dau larvele generației de toamnă.

Pentru prevenire și combatere se recomandă executarea tratamentului, numai pe parcelele pe care s-au realizat următoarele condiții: Depășirea pragului economic de dăunare (15% plante cu atac).

Pentru efectuarea tratamentului, folosiți unul din produsele sau amestecurile de mai jos, după caz:

- | | |
|------------------------------------|------------------------|
| 1. MOSPILAN 20 SG / KRIMA 20 SG | - 0,150 kg. / ha. sau |
| 2. MOSPILAN 20 SP / GAZELE | - 0,150 kg./ha sau |
| 3. DELMETROS 100 SC / KORON 100 SC | - 0,05 l/ha sau |
| 4. POLECI/DECA 2,5 EC | - 30 -50 ml/ha sau |
| 5. AXCELA | - 7 kg./ha (limax) sau |
| 6. SLUXX HP / MANOREXX | - 7 kg./ha (limax) sau |

alte produse pentru protecția plantelor omologate, pentru a fi utilizate pe teritoriul României.

Tratamentul se va complexa cu fungicide pentru combaterea boli: **PHOMA LINGAM** (putregaiul negru), pentru creșterea rezistenței plantelor la iernare.

PHOMA L. (putregaiul negru), primele simptome apar de regulă toamna, atunci când temperaturile sunt mai ridicate și există umiditate crescută, condiții optime pentru dezvoltarea ciupercii. Organele atacate sunt frunzele, pe care se pot observa pete relativ circulare de culoare alb-cenușiu, la început, urmând ca mai apoi să se poată observa picnidiile de culoare cenușiu-roz, fructul vegetativ al ciupercii. La reluarea ciclului vegetativ, boala se poate instala și la baza plantei la nivelul coletului, unde în condiții optime, va reuși să întrerupă aprovizionarea plantei cu elemente nutritive din sol.

1. ORIUS 25 EW/SALVATOR 25 EV – 0,5 l/ha sau
2. SCORE 250 EC/MAVITA 250 EC -0,5 l/ha sau
3. FOLICUR SOLO 250 EW / VALOR 250 EW - 0,5 l/ha sau
4. ZIZAN 500 SC / AMBROSSIO 500 SC - 0,4 +0,3 l/ha DAFNE 250 EC sau

alte produse pentru protecția plantelor omologate, pentru a fi utilizate pe teritoriul României.

Perioada optima de tratament: **La răsărirea culturii.**

ATENȚIE!! Întotdeauna citiți și utilizați produsele de protecție a plantelor – conform recomandărilor de pe etichetă!

Alte recomandări:

Pentru aderarea soluției pe planta, în soluția de stropit se adaugă adeziv (SILWET GOLD -0,1% sau ARACET -0,2%);

La prepararea soluției se vor respecta toate instrucțiunile de folosire, de pe eticheta produsului.

Verificați, cu mare atenție, recomandările cu privire la compatibilitatea produselor atunci când intenționați să aplicați amestecuri de produse de protecție a plantelor!

Luati măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător!

Respectați cu strictete normele de lucru cu produse de protecție a plantelor, normele de protecție și securitate a muncii, de protecție a albinelor și a animalelor în conformitate cu: Legea nr. 383/2013 a apiculturii, cu modificările și completările ulterioare și Ordinul nr. 127/1991 al ACA din România, Ordinul Comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administrație Locală și 1786/TB/ al Ministerului Transporturilor, precum și cu Protocolul de colaborare nr. 328432/2015, încheiat cu ROMAPIS (privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu produse de protecție a plantelor);

Respectați prevederile Ordinului Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 297/2017 privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea în siguranță a produselor de protecție a plantelor.

Respectați obligațiile ce vă revin conform Ordinului Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, al Ministrului Mediului Apelor și Padurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiționalitatea în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, cu modificările ulterioare.

Agricultorii care prin activitatea lor depozitează, manipulează și utilizează produse de protecție a plantelor au următoarele obligații:

1. Să utilizeze numai produse de protecție a plantelor omologate de Comisia Națională de Omologare a Produselor de Protecție a Plantelor;
2. Să utilizeze produsele de protecție a plantelor doar în scopul pentru care acestea au fost omologate și numai în conformitate cu instrucțiunile de utilizare;
3. Produsele de protecție a plantelor clasificate ca fiind foarte toxice (T+) și toxice (T) vor fi utilizate numai de persoanele juridice care dețin autorizație pentru utilizarea acestor produse;
4. Să nu aplice tratamente cu produse de protecție a plantelor în zonele de protecție a resurselor de apă, în zonele de protecție sanitară și ecologică, precum și în alte zone protejate stabilite în condițiile legii;
5. Să respecte condițiile de depozitare, manipulare și utilizare a produselor de protecție a plantelor în exploatarea agricolă, așa cum sunt prevăzute la cap. VI pct. 6.3 – 6.7 din Codul de bune practici în fermă, aprobat prin Ordinul ministrului mediului și gospodăririi apelor nr. 1.234/2006.

Cerințe obligatorii pentru fermieri: Conform Hotărârii 1230 din 12 Decembrie 2012, art. 67, privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009 al Parlamentului European, utilizatorii profesioniști de produse de protecție a plantelor au obligația să păstreze pentru o perioadă de cel puțin 3 ani, evidența produselor de protecție a plantelor pe care le utilizează.

În registrul în care țin evidența produselor de protecție a plantelor se va specifica:

- denumirea produsului de protecție a plantelor;
- momentul aplicării;
- doza;
- zona și cultura pentru care s-a folosit produsul de protecție a plantelor.

La cerere, utilizatorii profesioniști pun la dispoziția inspectorilor fitosanitari informațiile relevante din evidențele respective.

Nerespectarea de către utilizatorii profesioniști a prevederilor art. 67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.107/2009, privind menținerea evidenței pe o perioadă de cel puțin 3 ani a produselor de protecție a plantelor pe care le utilizează constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 8000 lei la 10000 lei, conform Hotărârii 1230 din 12 decembrie 2012, Art. 3 alin. (1), litera i.

Nume și prenume fermier/soc. comercială.....

Domiciliul fermier/sediul social al societății

(Comuna, județul)

Ferma (nume/număr, adresa).....

REGISTRU

de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor

Data efectuării tratam. (ziua,luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Timpul aplicării/ fenofaza culturii	Tratamentul efectuat					Numele, pre-numele pers. responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. si data document prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de dăunare: bola/ dăunătorul/ buruieni	Denumire ppp folosit	Doza omologată /doza folosită	Suprafata, ha	Cantitati utilizate (kg, l)			

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

Producătorul agricol numerotează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila după caz) fermierului sau administratorului societății.

Responsabil Prognoza si Avertizare,
Maria BOGDAN