

BULETIN DE AVERTIZARE

Nr.23 din 15.10. 2026

Pentru prevenirea și combaterea organismelor daunatoare :

Putregaiul negru (Phoma l.) , Putregaiul cenușiu (Botrytis c.) , Alternarioza (Alternaria b.) , Fainarea (Erysiphe c.) , Inegrirea tulpinilor (Phoma l.) , Purici de pamant (Phyllotreta a.) , Larvele viespiei rapitei (Athalia r.)

care pot cauza pierderi importante **la culturile de rapita**

Pentru prevenire și combatere se vor efectua tratamente cu următoarele produse :

Mospilan 20 SG – 0,150 kg/ha + Caramba 60 SL – 1,0 L/ha

Tilmor 240 EC – 1,0 L/ha + Mavrik 2 F – 0,2 L/ha

Folicur Solo 250 EW – 0,5 L/ha + Poleci – 0,03-0,05%

Viespea rapitei

Larvele viespii rapitei ataca diferite specii cultivate și spontane din familia cruciferelor și anume : rapita , mustarul , varza , ridichea , etc. In primul stadiu ele produc perforatii mici pe limbul frunzei sau marginal , iar celelalte stadii rod numai nervurile principale și in urma unui atac puternic plantele se usuca .

Puricii cruciferelor

Puricii cruciferelor ataca plantele spontane și cultivate din familia cruciferelor . Activitatea lor se desfasoara in special in orele insorite ale zilei.

Combaterea acestor daunatori se poate realiza in perioada de vegetatie – prin tratamente chimice , de tipul piretroizilor , la avertizare –insa pentru ca acestea sa fie eficiente , se impune o monitorizare riguroasa a soarelui cu ajutorul capcanelor .

Putregaiul cenușiu al rapitei poate aparea pe toate organele aeriene ale plantei indeosebi pe inflorescente sau chiar pe silicve. Zona atacata prezinta la inceput simptome de decolorare , apoi se acopera cu un mucegai cenușiu .

Alternarioza poate evolua pe toate organele plantelor și pe intreg ciclul de vegetatie . Sunt afectate mai ales frunzele din etajul inferior. Atacurile tardive sunt mai periculoase indeosebi pentru afectarea silicvelor tinere , care se deformeaza și se eschid prematur . Vremea umeda și caldă favorizeaza atacul . Transmiterea de la un an la altul se face in principal prin resturile vegetale . Nu se transmite prin samanta.

Aplicarea tratamentelor chimice se face numai in pragul economic de daunare PED – la o densitate de 2 larve de viespe rapitei pe planta , pentru pureci cand 30% din plante au frunzele perforate .

Tratamentul se va repeta atunci cand daunatorii exista in cultura .

Atentie ! In conformitate cu prevederile legale respectati normele de tehnica securitatii muncii , protectia animalelor , albinelor și a mediului inconjurator impotriva intoxicatiilor cu produse de protectia plantelor.

RECOMANDĂRI: Respectați cu strictețe normele de lucru cu produse de uz fitosanitar, pe cele de securitate a muncii, de protecție a albinelor și a animalelor conform: Ordinului Comun nr. 45/1991 al MAA, privind unele măsuri pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu pesticide, a Legii nr.383/2013 a apiculturii și nr.127/1991 al ACA din România; 68/05.02.1992 Ministerul Mediului; 15b/3404/1991 al Dep. Pentru Administrație Locală și 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, precum și a Protocolului de colaborare nr. 328432/31.03.2015, încheiat între Agenția Națională Fitosanitară și Asociația Crescătorilor de Albine din România, privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu produse de protecția plantelor.

ALTE RECOMANDĂRI:

Având în vedere implementarea cerințelor legale în materie de gestionare referitor la „Introducerea pe piață a produselor de protecția plantelor” (SMR 10), agricultorii, care prin activitatea lor depozitează, manipulează și utilizează produse de protecție a plantelor au următoarele obligații:

1. Să utilizeze numai produse de protecție a plantelor omologate de Comisia Națională de Omologare a Produselor de Protecție a Plantelor, care se regăsesc în baza de date **PEST-EXPERT**.

2. Să utilizeze produsele de protecție a plantelor doar în scopul pentru care acestea au fost omologate și numai în conformitate cu instrucțiunile de utilizare- doza/ha,to, cultura, agentul de dăunare și respectarea momentului aplicării. Aplicarea produselor de protecția plantelor trebuie realizată numai la avertizare.

3. Sa se asigure ca produsele de protecție a plantelor clasificate ca **foarte toxice (T+)** și **toxice (T)** vor fi utilizate numai de persoanele juridice care dețin autorizație pentru utilizarea acestor produse, emisă de Oficiul Fitosanitar Judetean din raza teritorială în care își desfășoară activitatea.

4. Să nu aplice tratamente cu produse de protecție a plantelor în zonele de protecție a resurselor de apă, în zonele de protecție sanitară și ecologică, precum și în alte zone protejate stabilite în condițiile legii.(parcelele din zona de protecție au o fâșie înierbată de 1-3 m, în funcție de înclinația terenului 12%).

5. Să respecte condițiile de depozitare, manipulare și utilizare a produselor de protecția plantelor în exploatațile agricole, conform Ghidului de bune practici de utilizare si depozitare a produselor de protecția plantelor eliberat de Autoritatea Nationala Fitosanitara

6. Toți fermierii trebuie să păstreze o perioadă de cel puțin 3 ani documentele de evidență a produselor de protecție a plantelor utilizate în exploatație, precum și **Registrul cu evidența produselor de protecția plantelor pe care le utilizează.**

Normele privind ecocondiționalitate sunt obligatorii pentru toți fermierii care solicită plăți prin scheme și măsuri de sprijin din fonduri europene care vor respecta OM 352/2015 si vor consulta Ghidul fermierului postat pe site : [http:// www.apia.org.ro/ro/](http://www.apia.org.ro/ro/)

Toți producătorii agricoli înscrși la APIA, care dețin suprafețe cu culturi agricole în câmp și spații protejate, indiferent de suprafața cultivată, sunt obligați să dețină un registru de evidență a tratamentelor fitosanitare, completat la zi după efectuarea fiecărui tratament, prin completarea într-un registru, după modelul anexat.

REGISTRU
de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor

Data efect uării trata m (ziua luna, anul)	Cultu ra și locul unde este situat terenu l	Tim pul apli cării (fen ofaz a)	Tratamentul efectuat					Numele, pre- numele pers. responsabi le de efectuarea tratament ului, semnătura	Data începer ii recoltăr ii produsu lui agricol	Nr. si data docume nt prin care s-a dat în consum populați ei
			Agentul de dăunare: boli/ dăunător i/ buruieni	Denu mire ppp folosi t	Doza Omol o gată /doza folosit ă	Supr a fața, (ha)	Canti tăți utiliz ate (kg, l)			

*Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1).

Producătorul agricol numerotează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila, după caz) fermierului sau administratorului societății.

Intocmit

Ing. Ivanescu Camelia

Verificat

Coordonator O.F. Caras-Severin

Ing. Novacescu Maria

