



**AUTORITATEA
NAȚIONALĂ
FITOSANITARĂ**

OFICIUL FITOSANITAR ZONAL VÂLCEA- GORJ
OFICIUL FITOSANITAR VÂLCEA
Loc. Rm. Vâlcea, Str. Oituz, Nr. 7, Jud. Vâlcea,
Tel: 0250.715.020, e-mail: ofvalcea@anf.ro

Nr. 994/O/06.10.2026


Buletin de avertizare Nr. 43

la cultura de Varză (*Brassica oleracea* var. *capitata*)

***Brevicoryne brassicae* (Păduchele cenușiu al verzei).**

Dăunătorul formează colonii aglomerate pe meristeme, frunze, tulpini, inflorescențe, flori și silicule. În urma atacului frunzele se gofrează și plantele se opresc din dezvoltare.

Adultul are corpul de 1,5-2,5 mm lungime, corp globulos, acoperit de o pulbere ceroasă, de culoare cenușie. În cursul unui an se pot dezvolta 16-18 generații. O generație are în medie 10-14 zile, iar temperaturile optime de dezvoltare sunt cuprinse între 18 și 26 °C. Iernează în faza de ou, depus în toamnă de femele, pe tulpinile și partea inferioară a frunzelor de varză, dar și ale altor plante de crucifere cultivate sau spontane. Toamna târziu, pagube însemnate înregistrându-se la varză și conopidă. În anii favorabili dezvoltării, adulții și larvele formează colonii masive, acoperind uneori complet frunzele și lăstarii din care sug sucul celular, din aprilie până toamna târziu. În urma atacului, pe frunze apar pete galben-palide sau roz.



Sursa: <https://www.casaplant.ro/paduchele-cenusiu-al-verzei/>

Folosiți unul din produsele sau din amestecurile de mai jos, după caz:

- KARATE ZEON (NINJA a doua denumire comercială) - în concentrație de 0,015% (în doză de 0,09 L/ha) sau
- BENEVIA - în doză de 0,4 – 0,5 L/ha sau
- DELTAGRI / (FASTER DELTA - a doua denumire comercială) - în concentrație de 0,24-0,3 L/ha sau
- SHERPA 100 EC (CYPERFOR 100 EC a doua denumire comercială) - în doză de 0,3 L/ha sau alte produse pentru protecția plantelor omologate pentru a fi utilizate pe teritoriul României.

Perioada optimă de tratament: la depășirea PED de 1-3 larve/plantă și 5% plante populate.

- tratamentul II – la interval de 8 – 10 zile de la efectuarea tratamentului anterior, cu un insecticid din altă grupă chimică.

ALTE RECOMANDĂRI :

- Verificați cu atenție recomandările cu privire la compatibilitatea produselor atunci când intenționați să aplicați amestecuri de produse de protecție a plantelor!
- Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător!
- Respectați cu strictețe normele de lucru cu produse pentru protecția plantelor, normele de protecție și securitatea muncii, de protecție a albinelor și a animalelor în conformitate cu Legea nr. 383/2013 a agriculturii, cu modificările și completările ulterioare și Ordinul nr. 127/1991 al ACA din România, Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației, 15b/3404/1991 al Dep. Pentru Administrație Locală și 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, precum și cu Protocolul de colaborare nr 328432/2015, încheiat cu ROMAPIS privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu produse pentru protecția plantelor.
- Respectați prevederile Ordinului Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 297/2017 privind aprobarea Codul de bune practici pentru utilizarea în siguranță a produselor de protecție a plantelor.
- Respectați obligațiile ce vă revin conform Ordinului Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, al Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 54/570/32/2023 pentru punerea în aplicare a normelor privind condiționalitatea în cadrul intervențiilor sub formă de plăți directe și al unor intervenții și măsuri pentru dezvoltare rurală.

VĂ RUGĂM SĂ AFIȘAȚI BULETINUL DE AVERTIZARE LA LOC VIZIBIL, PENTRU INFORMAREA TUTUROR CELOR INTERESAȚI.

Coordonator,

Oficiul Fitosanitar Zonal Vâlcea-Gorj,

Cons. sup. IORDACHE NICOLAE



Întocmit,

Cons. sup. Giura Simona