

AVERTIZAREA NR. 52 / 02 .10. 2026

Oficiul Fitosanitar Buzau recomanda efectuarea tratamentelor fitosanitare cu produse de protectia plantelor omologate pentru combaterea urmatoarelor agenti de daunare .

DAUNATORI RAPITA

Puricii cruciferelor (Phyllotreta spp.)



Puricii de pământ (Phyllotreta spp. sau Psylliodes) atacă din faza de cotiledon. Adulții rod mici găurele în frunze, iar în caz de secetă pot compromite întreaga cultură.

Adultul are corpul de culoare neagra-plumburie si o lungime de 3,6-4,0 mm. Elitrele prezinta striuri longitudinale inguste, interstriurile avand cate 3-4 randuri de perisori scurți si fini. Larva, apoda si eucefala, la completa dezvoltare, are corpul de 3-4 mm lungime, capsula cefalica galbuie-bruna, iar corpul de culoare galbuie si cu protuberante inserate cu perisori.

Viespea rapitei (Athalia rosae)



Dăunătorul este oligofag, atacând atât cruciferele cultivate, cât și pe cele sălbatice. Având două generații pe an, atacul larvelor se manifestă atât în toamnă, cât și în primăvară. Pagubele cele mai mari sunt produse toamna, când plantele de rapiță sunt în primele stadii de creștere și dezvoltare. Primăvara larvele rod frunzele și inflorescențele. Frunzele atacate prezintă perforații ovale, netede. Deseori, larvele rod florile și fructele în formare. Atacul masiv poate duce la scheletizarea plantelor urmată de uscarea acestora.

COMBATERE

POLECI / (DECA 2,5 EC - a doua denumire comerciala)

Rapita	Dăunători	Puricii cruciferelor, gandacul lucios, afide	30-50 ml/hl apa (0,03-0,05 %)	30 zile	-
--------	-----------	--	-------------------------------	---------	---

DELMETROS 100 SC/(KORON 100 SC- adoua denumire comerciala)

Rapita de toamna	Dăunători	Puricii de pamant, musculita radacinilor de varza, gandacul lucios al rapitei	0,05 L/ha	45 zile	-
------------------	-----------	---	-----------	---------	---

LAMDEX EXTRA/ (REXARIS 25 WG - a doua denumire comerciala)

Rapita	Dăunători	Gandacul lucios, gargarita tulpinilor de rapita, tantarul silicvelor, puricii cruciferelor, viespea rapitei, fluturele alb al verzei, buha verzei	0,3 kg/ha	28 zile	-
--------	-----------	---	-----------	---------	---

MAVRIK 2 F / (EVURE - a doua denumire comerciala)

Rapita	Dăunători	Brevicorine brasicae (Paduchele cenusiu al verzei), Meligethes aeneus (Gandacul lucios), Athalia rosae (Viespea rapitei), Ceutorrhynchus napi (Gargarita tulpinilor de rapita)	0,2 L/ha	60 zile	-
--------	-----------	--	----------	---------	---

KARATE ZEON / (NINJA -a doua denumire comerciala)

Rapita	Dăunători	Tantarul silicvelor, puricele cruciferelor, viespea rapitei, fluturele alb al verzei, buha verzei	0,15 L/ha se aplica la avertizare	35 zile	-
--------	-----------	---	-----------------------------------	---------	---

DECIS EXPERT 100 EC / (NUYARD - a doua denumire comerciala)

Rapita	Dăunători	Gargarite, tantarul silicvelor, gandacul lucios al rapitei, puricele albastru, afide	75 ml/ha	45 zile	-
--------	-----------	--	----------	---------	---

-BOLI RAPITĂ

Putregaiul negru (Phoma lingam)



Biologie si descriere

Boala poate afecta cultura de rapid pe intreg ciclu de vegetatie, incepind cu fnofaza cotiledonala. Ciuperca poate ataca toate organele plantei, cotiledoane, frunze, tulpini, colet, radacini si sileve (in cazuri grave).In conditii favorabile dezvoltarii bolii (umiditate ridicata, temperaturi moderate de 12 -18 gr.C) pierderile de recoltă pot ajunge pnd la 50% din productie. Infectia incepe de obicei in toamna (infectie primordiala), fiind realizata de ascosporii formati in resturile vegetale infectate din culturile anterioare. Pe frunze apar pete circulare albe cu mici corpuri negre in interior care reprezinta forma de inmultire conidiana (picnidii cu picnospori).

Combatere

PICTOR ACTIVE/ (CAPARTIS - a doua denumire comerciala)

Rapita de toamna si primavara	Boli	Sclerotinia sclerotiorum (Putregaiul alb); Alternaria spp. (Alternarioza); Plenodomus lingam (Putregaiul negru al rapitei); Hyaloperonospora parasitica (Mana cruciferelor); Botryotinia fuckeliana (Putregaiul cenusiu)	0,6-1,0 L/ha	--	--
-------------------------------	------	--	--------------	----	----

TILMOR 240 EC / (CORINTH 240 EC-a doua denumire comerciala)

Rapita pentru	Boli	Putregaiul alb , putregaiul cenusiu, innegrirea tulpinilor,	1,0 l/ha se aplica preventiv sau la aparitia	56	-
---------------	------	---	--	----	---

ulei		alternarioza,fainarea	primelor simptome d	zile	
------	--	-----------------------	---------------------	------	--

PROTENDO 300 EC/ (PECARI - a doua denumire comerciala)

Rapita de toamna	Boli	Alternaria brassicae (Alternarioza); Sclerotinia sclerotiorum (Putregaiul alb)	0,3-0,6 L/ha Se aplica de la inceputul infloritului pana la infl	56 zile	2
Rapita primavara	Boli	Leptosphaeria maculans (Putregaiul negru); Alternaria brassicae (Alternarioza); Sclerotinia sclerotiorum (Putregaiul alb)	0,3-0,5 L/ha Se aplica de la primele simptomeale aparitiei atacu	56 zile	2

PROTECTOR SUPER /(VIP SUPER-a doua denumire comerciala)

Rapita	Boli	Tratament in vegetatie, aplicat primavara-vara pentru combaterea patogenilor: innegrirea tulpinilor, putregaiul cenuziu, putregaiul alb, alternarioza, fainarea	1,0 l/ha	60 zile	-
--------	------	---	----------	---------	---

MATIZ / (ERASMUS - a doua denumire comerciala)

Rapita	Boli	Putregaiul negru (fomoza)	0,5 l/ha	56 zile	-
--------	------	---------------------------	----------	---------	---

Se pot utiliza si alte produse recomandate in lista oficiala PEST – EXPERT pentru testele avertizate.

Pentru consultarea bazei de date se procedează astfel:

- se accesează link-ul <http://81.196.111.66:8085/> (utilizator si parola guest) .

Respectati cu strictete perioadele de remanenta a produselor de protectie a plantelor , a normelor de lucru ,pe cele de securitate a muncii , de protectie a albinelor si a animalelor , conform Protocolului de Colaborare nr. 3242 / F / 21.10.2016 dintre MADR – ANF – SI ROMAPIS ,Ordinul comun nr.45/1991/127/68/15b/1991 al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Asociatiei Crescatorilor de Albine , din Romania , Ministerului Transporturilor ,Ministerul Mediului ,Departamentul pentru Administratie locala , privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide si a Legii nr . 383/2013 a apiculturii si Legea nr.280/2015, privind modificarea legii apiculturii.

Ambalajele din material plastic se vor clati obligatoriu de 3 ori, cu folosirea apei reziduale in rezervorul masinilor de tratat. Ambalajele clatite se depoziteaza in magazii si se returneaza distribuitorului.

Conform prevederilor legale prevazute in : Reg. (CE) Nr. 1107/2009 ; H.G. nr 1559/2012; O.G. nr. 53/2025; O.M. 352/2015 si SMR 7, SMR 8 – Introducerea pe piata a produselor de protectie a plantelor, fermierii care prin activitatea lor depoziteaza, manipuleaza si utilizeaza produse de protectie a plantelor au obligatia de a tine evidenta la zi, dupa efectuarea fiecarui tratament fitosanitar sau erbicidat dupa modelul de mai jos:

Buletinele de prognoza si avertizare vor fi afisate in locuri vizibile pentru a fi accesibile tuturor celor interesati.

Intocmit ,
Coordonator OF Buzau
Ing. Borjoiu Liviu

Nume și prenume fermier/soc. comercială.....
Domiciliu fermier/sediul social al societății
(Comuna, județul)
Ferma (nume/număr,
adresa).....

REGISTRU

de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor

Data efect u-ării trata m. (ziua luna, anul)	Cultu ra și locul unde este situat terenu l	Tim -pul apli-cării	Tratamentul efectuat					Numele, pre-numele pers. responsabil e de efectuarea tratamentu lui, semnătura	Data încep e-rii recol-tării pro-dusul ui agrico l	Nr. si data document prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de dău-nare: boli/ dă-unători/ buruieni	Denu-mire ppp folosit	Doza omolo -gată /doza folosit ă	Supra - fața, ha	Canti-tăți utili-zate (kg, l)			

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

Producătorul agricol numerotează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila după caz) fermierului sau administratorului societății.