

BULETIN DE AVERTIZARE NR. 70 din 16 octombrie 2026.

La **MĂR** – se va aplica un tratament după recoltarea fructelor împotriva rapănului, făinării, moniliozei, bolilor de scoarță și colet, focului bacterian, paduchelui din San-Jose, paduchelui lânos, acarieni, afide, insecte defoliatoare și minatoare.

La **PĂR și GUTUI** – se va aplica un tratament după recoltarea fructelor împotriva rapănului, moniliozei, bacteriozei, bolilor de scoarță și colet, focului bacterian, păduchelui din San-Jose, păduchelui lanos, acarieni, afide, psilide, insecte defoliatoare și minatoare.

La **PRUN** – se va aplica un tratament în perioada căderii frunzelor împotriva ciuruirii, moniliozei, bolilor foliare și de scoarță, păduchelui din San-Jose, afide, acarieni.

La **CIREȘ și VIȘIN** – se va aplica un tratament în perioada căderii frunzelor împotriva bolilor de scoarță, moniliozei, bacteriozei, ciuruirilor, păduchelui din San-Jose, acarieni, insecte defoliatoare și minatoare.

Speciile mai sus menționate se vor stropi cu unul din următoarele amestecuri de pesticide și se va avea în vedere să se efectueze o îmbăiere totală a pomilor, atât a aparatului foliar cât și a organelor lemnoase, inclusiv a coletului.

1. ZEAMA BORDELEZA TIP „MIF” (ZEAMA BORDELEZA VALLES - a doua denumire comercială) – (3,75-5,0 kg/ha) 0,5% + SULFOLAC 80 WG - 4,5 kg/ha + MOSPILAN 20 SP (GAZELLE - a doua denumire comercială) 0,375 kg/ha (0,025%);

2. BOUILLIE BORDELAISE WDG (BORDOMIX - a doua denumire comercială) - 0,5% (7,5 kg/ha) + MICROTHIOL SPECIAL (MICROTHIOL JETT - a doua denumire comercială) - 0,5% (7,5 kg/ha) + MOSPILAN 20 SP (GAZELLE - a doua denumire comercială) 0,375 kg/ha (0,025%);

3. ALCUPRAL 50 PU - 0,3% + DECIS 25 WG - 0,045 kg/ha (0,003%);

4. CHAMP 77 WG (COPPERMAX - a doua denumire comercială) - 2,0 kg/ha (0,2%) + MOSPILAN 20 SP (GAZELLE - a doua denumire comercială) 0,375 kg/ha (0,025%);

5. FUNGURAN OH 300 SC (KOCIDE FLOW - a doua denumire comercială) - 1,6-2,5 l/ha + MAVRIK 2 F (EVURE - a doua denumire comercială) - 0,05% (0,75 l/ha în 1500 l apa).

• **Soarecele de câmp (*Microtus arvalis*)**, ca urmare a condițiilor favorabile și a potențialului biologic de înmulțire deosebit, se constată o înmulțire a rozătoarelor de la an la an, aceste specii fiind active tot timpul anului, chiar sub stratul de zăpadă. În această perioadă și primăvara devreme, recomandăm la culturile agricole perene (trifoi, lucerna), plantații pomicole, pepiniere, pajisti naturale și culturi agricole de toamnă (cereale păioase, rapita), tratament pentru combaterea acestora, pe parcelele unde densitatea daunătorului este de 4-5 colonii (vetre de atac) pe ha. Mai multe orificii grupate, 10-15/m², formează o colonie, iar zona inconjurătoare de vegetație care a fost retezată pentru consum reprezintă vatra de atac.

Plantele atacate și mod de daunare: Soarele de câmp are un regim de hrană exclusiv fitofag, consumând boabe de cereale și de leguminoase anuale, radacini, tuberculului, în lipsa de hrană atacă și pomii fructiferi din livezi și mai ales din pepiniere, rozând coaja în zona coletului sau chiar radacinile în cazul puieților. Produce pagube deosebite sematurilor de cereale, rapita, lucernierelor și pajistilor.

În general lupta împotriva rozătoarelor de câmp implică un complex de măsuri, atât chimice cât și agrotehnice, prin a căror aplicare se reduc pierderile de recoltă și scăderea densității daunătorilor sub pragul economic de daunare.



<https://www.gazetadeagricultura.info/plante/proctectia-plantelor/496-pesticide/nematocide-rodenticide-moluscocide-repelenti/19305-soarecele-de-camp-microtus-arvalis-masuri-masuri-chimice-si-agrotehnice-de-combatere.html>

Masuri agrotehnice de combatere a rozatoarelor, au un caracter profilactic, se iau tot timpul anului indiferent de gradul de infestare cu rozatoare si au ca scop rezolvarea urmatoarelor aspecte:

- blocarea cailor de acces sau de extindere a rozatoarelor in culturile invecinate prin brazde adanci sau santuri in jurul culturilor;
- distrugerea prin prasile manuale sau mecanice a galeriilor si cuiburilor de rozatoare ca loc de adapost si inmultire;
- efectuarea la timp a recoltarii evitand strangerea si depozitarea rezervelor de hrana a rozatoarelor;
- prasile mecanice pe randul de pomi in cazul plantatiilor intensive si prasile manuale in jurul pomilor razleti;
- strangerea de pe camp a balotilor si a resturilor de paie si masa vegetala;
- executarea imediata a araturilor de vara si toamna pana la adancimea de 30-40 cm, distrugandu-se astfel o mare parte a populatiei de rozatoare (adulti si pui);
- saparea santurilor de protectie in jurul locului de depozitare a furajelor.

Masurile chimice de combatere a rozatoarelor, în perioada imediat urmatoare, cand conditiile climatice permit, se recomanda efectuarea tratamentului chimic pentru combaterea rozatoarelor mici de camp incepand cu parcelele unde s-au realizat urmatoarele conditii:

- *Semnalarrea vetrelor cu galerii active;*
- *P.E.D.(pragul economic de dăunare) 4-5 colonii/ha;*
- *Cand talia vegetatiei ierboase este de 5-8 cm – pana la distrugerea populatiei de soareci.*

Pentru combatere se recomanda folosirea produsului:

Rodenticidul Arvalin – 5 bucati/galerie - reprezintă o momeală gata de utilizare (boabe de cereale impregnate cu fosfură de zinc 25g/kg). Produsul este recomandat pe miriști, porumbiști, culturi de toamnă (cereale, rapiță), culturi legumicole, livezi, pajiști, păduri, vii etc.

Boabele se plasează subteran, chiar în galerii. Șoarecele ingerează bobul, iar substanța activă reacționează rapid cu acidul gastric. Efectul este foarte rapid, conducând la limitarea drastică a numărului de dăunători. Fiecare bob este suficient pentru un șoarece de 20 g.

În urma utilizării, nu rezultă reziduuri, este ușor de manipulat datorită **aplicatorului special** (vezi în imagine) și nu necesită capcane deoarece are aplicare subterană.



https://kwizda-agro.ro/actualitate/arvalin-combate-soarecii-de-camp-limiteaza-pierderile?gclid=EAIaIQob-ChMIIMLmuoz_gQMvhZmDBx2rawldEAAAYASAAEgJm6fD_BwE

Atenție! Pentru eficiență, este recomandat să aplicați produsul acolo unde galeriile sunt în stare optimă deoarece șoarecii de câmp sunt precauți atunci când acestea sunt deteriorate .

Nu se pun momeli în arealele umede și nici aproape de zonele în care oamenii sau animalele domestice au acces.

Parcellele tratate vor fi marcate cu tablite inscripționate - **TEREN OTRAVIT** care să avertizeze populația că terenul a fost tratat.

Alte recomandări:

- Înainte de utilizarea produsului de protecție a plantelor citiți cu atenție prospectul acestuia!
- Suprafețele tratate se vor semnaliza cu placute inscripționate "TEREN OTRAVIT";
- Momeala se pune în galeriile active pentru a proteja vanatul, cainii, etc.
- Se interzice pasunatul cât timp sunt prezente momelile pe teren.
- Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător. Respectați cu strictețe normele de lucru cu produse de uz fitosanitar, pe cele de securitate a muncii, de protecție a albinelor și a animalelor.

Alte Recomandări importante :

Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător !

- produsele se solubilizează separat, se omogenizează și apoi se pulverizează ;
- resturile de soluții sau apa rezultată în urma spălării echipamentelor de stropit nu trebuie să ajungă în apropierea apelor de suprafață, șanțuri etc.
- executarea tratamentului, pe timp liniștit fără vânt. Nu aplicați tratamentul dacă viteza vântului este mai mare de 4-5 m /s.
- citiți cu atenție eticheta produsului pe care îl folosiți ;
- la realizarea amestecurilor se verifică compatibilitatea pesticidelor, fizica și chimica.

- Se vor utiliza doar produse de protecția plantelor recomandate de CODEX-PEST EXPERT, pentru testele avertizate, omologate de către „COMISIA INTERMINISTERIALĂ DE OMOLOGARE A PRODUSELOR DE UZ FITOSANITAR”, avizate pentru a fi folosite pe teritoriul ROMÂNIEI .

- Respectați cu strictețe normele de lucru cu produse de uz fitosanitar, pe cele de securitate a muncii, de protecție a albinelor și a animalelor !, conform ORDINULUI COMUN (Ord. 45/1991 al MAA ; 68/05.02.1992 Min.Mediului ; 15b/3404/1991 al Dep. Pentru Admin. Locala și 127/1991 al ACA din România, 1786/TB/1991 al Minist. Transporturilor).

Produsele fitosanitare trebuie să fie utilizate în mod corespunzător.

Utilizarea lor corectă include aplicarea principiilor bunelor practici fito-sanitare și îndeplinirea condițiilor stabilite în conformitate cu articolul 31 și specificate pe etichetă. Aceasta respectă, de asemenea, dispozițiile Directivei 2009/128/CE și, în special, principiile generale de combatere integrată a dăunătorilor prevăzute la articolul 14 și în anexa III la respectiva directivă.

În vederea protejării sănătății oamenilor și a animalelor, protecției albinelor și a mediului înconjurător, producătorii agricoli, persoane fizice sau juridice, care utilizează pe terenurile pe care le dețin produse de uz fitosanitar din grupele a III-a și a IV-a de toxicitate, au obligația să le depoziteze, să le manipuleze și să le utilizeze în conformitate cu instrucțiunile tehnice care le însoțesc, aprobate potrivit legii.

Constituie contravenții următoarele fapte:

- nerespectarea prevederilor art. 28 din Regulamentul (CE) nr. [1.107/2009](#) privind **introducerea pe piață și utilizarea produselor de protecție a plantelor autorizate**;
- **nerespectarea de către utilizatori a prevederilor art. 67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.107/2009 privind menținerea evidenței pe o perioadă de cel puțin 3 ani a produselor de protecție a plantelor pe care le utilizează**;

Nume și prenume fermier/soc. comercială.....

Domiciliu fermier/sediul social al societății

(Comuna, județul)

Ferma (nume/număr, adresa).....

REGISTRU

de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor

Data efectuării tratament (ziua luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Tim-pul aplicării	Tratamentul efectuat					Numele, pre-numele pers. Responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. și data document prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de dăunare: boli/ dăunători/ buruieni	Denumire ppp folosit	Doza Omologată /doza folosită	Suprafața, ha	Cantități utilizate (kg, l)			

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

Producătorul agricol numerează paginile registrului.

Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila, după caz) fermierului sau administratorului societății.

Buletinul de avertizare îl puteți consulta accesând linkul: <https://www.anfdf.ro/>, secțiunea Structuri teritoriale – Buletine de avertizare

ȘEF SERVICIU OFZ BN, MM, SM,

ing. Magdea Emilian Traian

ÎNTOCMIT,

dr. ing. Buciumaș Georgeta