

BULETIN DE AVERTIZARE NR. 56 din 16.10.2026**TRATAMENT PENTRU COMBATAREA BOLILOR ȘI DĂUNĂTORILOR ÎN CULTURA DE RAPIȚĂ**

Combaterea bolilor și dăunătorilor precum și măsurile care conduc la creșterea rezistenței la iernare, sunt factori importanți în tehnologia de cultivare a rapiței. Pentru prevenirea bolilor și pentru combaterea dăunătorilor, care se pot dezvolta în aceasta perioadă în cultura de rapiță de toamnă, recomandăm efectuarea unui tratament fitosanitar.

BOLI

Putregaiul negru (Phoma lingam). Atacă toate organele plantelor, inclusiv coletul și rădăcina; poate afecta cultura pe întreg ciclul de vegetație, începând cu primele faze de creștere. Plantele afectate pot prezenta simptome de înrosire accentuată a frunzelor, iar în cazul unui atac puternic se produce brunificarea și apoi putrezirea. Factorii care favorizează boala sunt: soluri lutoase, toamne calde și umede, resturi vegetale care rămân la suprafața pe solele vecine unde s-a cultivat rapita, semanatul întârziat, aport de materie organică. Reducerea înălțimii plantelor la intrarea în iarnă influențează semnificativ creșterea productivității culturii de rapita, astfel plantele cu talie redusă acumulează mai rapid glucide în suculele sporind toleranța la ger.

Făinarea (Erysiphe communis). Atacă încă din toamnă frunzele și tulpinile. Pe ambele fețe ale frunzelor este prezentă o păslă albicioasă care, mai târziu, capătă aspect pulverulent datorită apariției fructificațiilor ciupercii. Patogenul se transmite prin vânt și prin apa de ploaie. Produce pagube, în special, în zonele umede, reci și în anii cu precipitații abundente.

Se recomandă efectuarea tratamentelor fitosanitare, utilizând unul dintre produsele:

PROTECTOR SUPER 250 EC/VIP 250 EC - 0,5 l/ha - pentru combaterea putregaiului negru; are și efect de regulator de creștere, reduce pericolul de emisie a tulpinilor, crește rezistența plantelor la iernare. **sau**

ORIUS 25 EW / SALVATOR 25 EW- 0,5 l/ha - pentru creșterea rezistenței plantelor la iernare și pentru combaterea putregaiului negru. **sau**

FOLICUR SOLO 250 EW / VALOR 250 EW- 0,5 l/ha - pentru combaterea putregaiului negru și cu rol în creșterea rezistenței plantelor la iernare și cădere. **sau**

STARPRO 430 SC / MATIZ EXTRA 430 SC - 0,45 l/ha - pentru combaterea putregaiului negru, având și rol de regulator de creștere. **sau**

CARAMBA TURBO - 0,7 - 1 l/ha - asigură un control eficient al bolilor, are rol de regulator de creștere **sau**

TOPREX - 0,5 l/ha - protejează culturile de rapita împotriva putregaiului negru și încetinește creșterea în înălțime a plantei, permite dezvoltarea sănătoasă a sistemului radicular și creșterea rezistenței la iernare

DĂUNĂTORI

Pentru combaterea generației de toamnă a **viespei rapiței (Athalia rosae)**, a **puricilor cruciferelor (Psylliodes chrysocephala, Phyllotetra spp.)**, a **păduchelui cenușiu al cruciferelor (Brevicoryne brassicae)** și a altor dăunători, se va efectua un tratament fitosanitar.

*viespea rapiței**puricele**păduchele cenușiu*

Se recomandă efectuarea tratamentelor fitosanitare, numai în caz de depășire a pragului economic de dăunare (PED = 2-3 larve/plantă în cazul viespei rapiței și 5 adulți pe plantă în cazul puricilor), utilizând unul din produsele:

MAVRIK 2F/EVURE - 0,2 l/ha - omologat pentru combaterea viespei rapiței și a păduchelui cenușiu **sau**

LAMDEX EXTRA/REXARIS 25 WG - 0,3 kg/ha - pentru combaterea viespei rapiței și puricilor **sau**

SHERPA DUO /MASSANE - 0,25 l/ha - pentru combaterea puricelui cruciferelor și păduchelui cenușiu **sau**

DECIS EXPERT 100 EC (NUYARD) - 75 ml/ha - pentru combaterea puricelui albastru și afidelor **sau**

DELMETROS 100 SC/KORON 100 SC - 0,05 l/ha - produs omologat pentru combaterea puricilor **sau**

INAZUMA (LUTADOR) - 0,125 - 0,2 kg/ha - pentru combaterea afidelor, viespei rapiței și puricilor

Pentru combaterea bolilor și dăunătorilor la rapiță, pot fi utilizate și alte produse omologate pentru a fi utilizate pe teritoriul României, produse cuprinse în baza de date PEST-EXPERT. Baza de date PEST-EXPERT poate fi accesată din linkul <https://pest.anfd.ro/> (user name: guest ; parola: guest)

Alți dăunători. În ultimii ani, în țara noastră în zonele mai calde, datorită schimbărilor climatice și a creșterii suprafețelor cultivate cu rapiță de toamnă, a început să își facă simțita prezența, molia cruciferelor (*Plutella xylostella*).

Aplicarea acestui tratament în toamna contribuie la creșterea rezistenței la iernare a plantelor, prin dezvoltarea rădăcinilor și reducerea părților aeriene a plantelor (coletul va fi mai aproape de sol și va fi mai bine protejat).

Momentul efectuării tratamentului

Monitorizarea culturii este esențială în stabilirea momentului optim pentru efectuarea tratamentului.

Tratamentul se va aplica la depistarea dăunătorilor, în funcție de pragul economic de dăunare și la apariția primelor semne de atac în cazul bolilor. Numai dacă există atac puternic al dăunătorilor, tratamentul se va repeta, alternând produsele.

METODE DURABILE: metode biologice, biotehnice, fizice, mecanice și alte metode nechimice, trebuie preferate metodelor chimice, dacă acestea asigură un control corespunzător al agenților de dăunare; (strategii și tehnici de gestionare integrată a dăunătorilor)

ALTE RECOMANDĂRI:

- ♦ Verificați, cu mare atenție recomandările cu privire la compatibilitatea produselor atunci când intenționați să aplicați amestecuri de produse de protecție a plantelor!
- ♦ Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător!
- ♦ Respectați cu strictețe normele de lucru cu produse pentru protecția plantelor, normele de protecție și securitatea muncii, de protecție a albinelor și a animalelor în conformitate cu: Legea nr. 383/2013 a apiculturii cu modificările și completările ulterioare și Ordinul nr. 127/1991 al A.C.A. din România, Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației, 15b/ 3404/1991 al Dep. Pentru Administrație Locală și 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor precum și cu Protocolul de colaborare nr. 328432/2015, încheiat cu ROMAPIS (privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine împotriva intoxicației cu produse pentru protecția plantelor);
- ♦ Respectați prevederile Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 297/2017 privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea în siguranță a produselor de protecția plantelor.
- ♦ Respectați obligațiile ce vă revin conform Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului mediului, apelor și pădurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 352/ 636/ 54/ 2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiționalitatea în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermierii în România, cu modificările ulterioare.
- ♦ Respectați măsurile obligatorii privind utilizarea durabilă a produselor de protecție a plantelor, așa cum au fost prezentate în **Adresa de informare nr. 136 din 05.02.2026 a Oficiului Fitosanitar Suceava.**
- ♦ Utilizatorii de produse de protecție a plantelor trebuie să dețină certificatul de formare profesională dobândit prin instruire privind utilizarea durabilă a produselor de protecție a plantelor. Cursul este disponibil online, **pe platforma FITS** <https://fits.anfd.ro>
- ♦ Deținătorii de echipamente de aplicare a produselor de protecție a plantelor sunt obligați să efectueze inspecția tehnică periodică a acestor echipamente.
- ♦ Citiți cu atenție și respectați măsurile înscrise pe ambalajul produsului pe care îl utilizați. Eticheta oferă informații importante privind instrucțiunile de utilizare, substanța activă, doza, timpul de pauză, modul de aplicare. etc

Responsabil Prognoza și Avertizare
ing. Maria Platon