AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ

OFICIUL FITOSANITAR SĂLAJ, Crișeni nr.403, județul Sălaj
Tel: 0260.620.063, Email: ofsalaj@anfof.ro

Buletin de avertizare
Nr. 51 din 06.11.2026

Pentru prevenirea si combaterea organismelor dăunătoare: **Taphrina deformans (băşicarea frunzelor), Stigmina carpophila (ciuruirea frunzelor) .**



Taphrina deformans (băşicarea frunzelor de piersic) - ciuperca se transmite, de la un an la altul, sub formă de miceliu, care trăieşte pe scoarţa ramurilor sau între solzii mugurilor. Frunzele, în special din treimea superioară a lăstarilor, sunt deformate si băşicate. Porţiunile atacate au la început o colorație roşiatică, apoi se îngălbenesc, se brunifică şi cad. Pe partea inferioară a acestor umflături se formează o pulbere albicioasă. Ramurile sunt golaşe, sunt mai scurte şi uneori curbate.



Stigmina carpophila (ciuruirea frunzelor) - ciuperca se transmite de la un an la altul prin miceliul din scoarţa ramurilor bolnave şi prin conidiile aflate în gomele de pe ramuri. Pe lăstari şi ramuri se constată pete adâncite de culoare purpurie. Cu timpul zonele atacate se necrozează, scoarţa crapă şi apar scurgeri de clei. La atacuri intense lăstarii se usucă. Pe frunze atacul se manifestă sub forma unor pete circulare de 2-3 mm, la început violacee, iar mai târziu cafenii-roşcate, limitate de o margine roşcata. Cu timpul petele confluează se usucă şi cad. Pe cais din momentul când fructele au 2 cm şi până la maturitate, se formează pete mici, circulare, de 1-3 mm de culoare roşie-închis. Cu timpul ţesutul din dreptul petelor se necrozează si capătă un aspect zgrunţuros.

Se recomanda efectuarea tratamentului cheie la speciile de piersic, nectarin si cais cu:
1. BADGE WG (COPRANTOL DUO – a doua denumire comerciala) – cais – 3,9 kg/ha; - piersic, nectarin - 3,5 kg/ha **sau**
2. CUPROXAT FLOWABLE (KUPFEROL – a doua denumire comerciala) – 0,35% **sau**
3. FLOWBRIX - 3,3 l/ha **sau**
4. CUPROFIX ULTRA (NOVICURE – a doua denumire comerciala) – 6 kg/ha **sau**
5. AIRONE SC – cais – 4,0 l/ha; piersic, nectarin – 3,5 l/ha

sau alte produse pentru protecţia plantelor omologate pentru a fi utilizate pe teritoriul României.

Perioada optimă de tratament: în cursul lunii noiembrie, după căderea frunzelor, în zilele cu temperaturi peste 5°C, pe timp liniştit, fără vânt, când pomii sunt zvântaţi.

Alte recomandări:
Verificaţi, cu mare atenţie, recomandările cu privire la compatibilitatea produselor atunci când intenţionaţi să aplicaţi amestecuri de produse de protecţie a plantelor!
Luaţi măsurile ce se impun pentru protecţia mediului înconjurător!
Respectaţi cu strictețe normele de lucru cu produsele de protecţie a plantelor, normele de protecţie şi securitate a muncii, de protecţie a albinelor şi a animalelor în conformitate cu : Legea nr. 383/2013 a apiculturii, cu modificările şi completările ulterioare şi ordinul nr. 127/1991 al ACA din România, ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administraţie locală si 1786/TB/al Ministerului Transporturilor, precum şi cu Protocolul de colaborare nr. 328423/2015, încheiat cu ROMAPIS (privind implementarea legislaţiei, în vederea protecţiei familiilor de albine, împotriva intoxicaţiilor cu produse pentru protecţia plantelor) ; ordinul nr. 185/10.05.2023

privind aprobarea Codului de conduită al utilizatorului profesionist de produse de protecție a plantelor și al apicultorului.

Respectați prevederile Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 297/2017 privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea în siguranță a produselor de protecție a plantelor.
Respectați obligațiile ce vă revin conform Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltării rurale, al ministrului mediului, apelor și pădurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiționalitatea în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, cu modificările ulterioare.

Conform prevederilor legale prevăzute în : Reg. (CE) Nr. 1107/2009 ; H.G. nr 1559/2012; O.G. nr. 53/2025; O.M. 352/2015 și SMR 10 – Introducerea pe piață a produselor de protecție a plantelor, fermierii care prin activitatea lor depozitează, manipulează și utilizează produse de protecție a plantelor au obligația de a ține evidența la zi, după efectuarea fiecărui tratament fitosanitar sau erbicidat după modelul de mai jos:

Nume și prenume fermier/ societate comercială…...
Domiciliu fermier/sediul social al societății…….
(Comuna, județul)
Ferma (nume/număr,adresa)…….

Registru
de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor

Data efectuării tratamentului (ziua,luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Timpul aplicării /fenofaza culturii	Tratamentul efectuat					Numele, prenumele persoanei responsabile de efectuarea tratamentului	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. și data documentului prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de dăunare: boli/ dăunători/ buruieni	Denumire ppp folosit	Doza omologată/doza folosită	Suprafața (ha)	Cantități utilizate (kg.l)			

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art.67, (1)

Fermierul numerotează paginile registrului. Pe ultima pagină se menționează câte pagini conține registrul purtând semnătura (și ștampila dupa caz) fermierului sau administratorului societății.
Respectați condițiile de depozitare, manipulare si utilizare a ppp în exploatațiile agricole, conform *Ghidului de bune practici de utilizare și depozitare a ppp care poate fi accesat* la adresa http://www.madr.ro/norme-de-eco-condiționalitate – în - domeniul-fitosanitar.html)

Responsabil Prognoză si Avertizare,
Stana Marius

Întocmit,
Hosu Aurelia