AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ

OFICIUL FITOSANITAR ZONAL ILFOV-CĂLĂRAȘI-GIURGIU
OFICIUL FITOSANITAR CĂLĂRAȘI, Prelungirea Bucureşti nr. 26, bl. D3, Călăraşi,
judeţul Călăraşi, Tel: 0242.331.086, Email: ofcalarasi@anfof.ro

BULETIN DE AVERTIZARE 81 din 09.11.2026

Pentru prevenirea şi combaterea rezervei biologice a organismelor dăunătoare:

RAPĂN (Venturia inaequalis)



Pe frunzele afectate de patogen apar pete de culoare cafenie-negricioasă, catifelate. La evoluția bolii acestea se unesc şi acoperă frunza. În urma atacului, frnzele se usucă şi cad. Fructele pot fi atacate în toate stadiile de dezvoltare. Pe acestea apar pete cenuşii, catifelate. Ulterior, fructele se deformează, crapă şi, în cazul unui atac timpuriu, cad din coroană. Pulpa acestora capătă în ultimă instanţă un gust fad. Boala se transmite de la un an la altul sub formă de miceliu de rezistenţă. Ciuperca iernează pe frunzele infectate căzute pe sol sau ca miceliu de rezistenţă pe ramuri.

FOCUL BACTERIAN(Erwinia amylovora)

Arsura inflorescenţelor apare primăvara devreme, florile infectate se ofilesc, se brunifică şi se înnegresc. Infecţia progresează spre peduncul care, în final se înnegreste. Pe timp călduros şi umed din peduncul exudează picături de lichid. Frunzele se ofilesc şi întregul lăstar se brunifică (măr şi gutui) sau se înnegresc (păr). Frunzele rămân ataşate pe pom iar lăstarii se încovoaie în formă de cârjă. Pe lăstarii bolnavi apar picături de exudat alb-pai până la roşu închis. Uneori din ţesuturile bolnave exudează filamente cu aspect de reţea vătoasă. Ulceraţiile – se manifestă pe ramuri mai bătrane, şarpante şi trunchi, provocând leziuni; prin îndepărtarea scoarţei pe ţesuturile de dedesubt apar pete maro roşietice.





MONILIOZA Monilinia spp

Ciuperca parazitează , florile şi fructele în diferite faze de dezvoltare. .Primăvara, în timpul înfloritului, unele ramuri tinere încep să se veştejească iar frunzele şi florile se brunifică şi se usucă . Fructele se mumifică, spre toamnă cad sau se mumifică şi rămân în pom.


AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ

OFICIUL FITOSANITAR ZONAL ILFOV-CĂLĂRAȘI-GIURGIU
OFICIUL FITOSANITAR CĂLĂRAȘI, Prelungirea București nr. 26, bl. D3, Călărași,
județul Călărași, Tel: 0242.331.086, Email: ofcalarasi@anfof.ro





CIURUIREA FRUNZELOR Coryneum b.



Pe frunze după dezmugurire, se formează pete mici circulare, solitare, de culoare roșietică violetă sau brună gălbuie. În câteva zile petele se măresc până la 2-3 mm, în dreptul acestor pete după 1-2 săptămâni țesuturile se necrozează, se desprind și cad, determinând ciuruirea frunzelor.

BASICAREA FRUNZELOR Taphrina deformans



Primele simptome apar vremelnic, în perioada înfloritului sau imediat după. Frunzele infectate chiar dacă nu sunt complet dezvoltate, în locul unde a avut infecţia prind o culoare roşiatică. La o privire atentă, se va putea observa cum frunzuliţa infectată începe să se gofreze, începând cu locul în care a prins culoarea roşiatică.

Se recomandă tratamente fitosanitare cu:

1.BOUILLIE BORDELAISE WDG (BORDOMIX)

Gutui, măr, păr	Boli	Erwinia amylovora (focul bacterian al rosaceelor)	7.5 kg/ha
Piersic	Boli	Taphrina deformans (băşicarea frunzelor), Stigmia cariophyla (ciuruirea micotică a frunzelor), Monilinia spp. (monilioza)	0,5% (5,0 kg/ha) Pauză 3 zile.
Prun	Boli	Polystima rubrum (pătarea roşie a frunzelor de prun), Stigmia carpophyla (ciuruirea micotică a frunzelor), Monilinia spp. (monilioza)	0,5% (5,0 kg/ha) Pauză 3 zile.

2.VITRA 50 WP/(CUPRIDIN) *sau*

Cais, cireş	Boli	Băşicarea frunzelor, monilioza, ciuruirea frunzelor, arsura bacteriană a sâmburoaselor, antracnoza, uscarea	1,5-2,0 kg/ha	-	-

Gutui, mosmon, par	Boli	Cancerul deschis al pomilor, rapănul, monilioza, focul bacterian, arsura bacteriană	1,5-2,0 kg/ha	-	-
Nectarin, piersic, prun	Boli	Băşicarea frunzelor, monilioza, ciuruirea frunzelor, arsura bacteriană a samburoaselor, antracnoza, uscarea ramurilor	1,5-2,0 kg/ha	-	-

3. AIRONE SC *sau*

Cais,cireş, prun	Boli	Băşicarea frunzelor, hurlupii, ciuruirea frunzelor, monilioza	4,0 l/ha, se aplică toamna la căderea frunzelor (BBCH 91) şi prim
Gutui, păr	Boli	Cancerul deschis al pomilor, focul bacterian, patarea bacteriana a frunzelor, putregaiul negru	3,0 l/ha, se aplică toamna la căderea frunzelor (BBCH 91-97) şi primăvara.
Măr, păr, gutui	Boli	Rapăn	2,5 l/ha se aplică toamna la căderea frunzelor (BBCH 91-97) şi primăvara. Pauză 21 zile.
Măr	Boli	Cancerul deschis al pomilor, focul bacterian, pătarea bacteriană a frunzelor, putregaiul negru	3,0 l/ha, se aplică toamna la căderea frunzelor (BBCH 91-97) şi primăvara. Pauză 21 zile.
Nectarin, piersic	Boli	Monilioza, băşicarea frunzelor	3,5 l/ha, se aplică toamna la căderea frunzelor (BBCH 91) şi primăvara. Pauză 21 zile.

DARE 400 SC

Piersic	Boli	Băşicarea frunzelor	2,0 l/ha, se aplică toamna târziu când 80% din frunze sunt căzute şi primăvara la începutul înfrunzirii. Un alt tratament se va aplica în perioada cuprinsă între stadiul de boboc floral până la căderea petalelor. Se aplică maxim două tratamente la interval de 7 zile.

PADUCHELE TESTOS Parthenolecanium corni

PADUCHELE LANOS Lariosoma lanigerum

AFIDE APHIS sp.



AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ

OFICIUL FITOSANITAR ZONAL ILFOV-CĂLĂRAȘI-GIURGIU
OFICIUL FITOSANITAR CĂLĂRAȘI, Prelungirea București nr. 26, bl. D3, Călărași,
județul Călărași, Tel: 0242.331.086, Email: ofcalarasi@anfof.ro

MOSPILAN 20 SG / (KRIMA 20 SG)

Măr, prun	Dăunători	Păduchele din San Jose	0,375 kg/ha +0,5 % adjuvant (tratament de iarnă)
Măr, prun	Dăunători	Păianjenul roşu comun, afide	0,375 kg/ha +0,5 % adjuvant (tratament de iarnă)

Sau alte produse pentru protecţia plantelor omologate pentru a fi utilizate pe teritoriul Romaniei.

Metodele durabile alternative: biologice, fizice, mecanice şi alte metode nechimice trebuie preferate metodelor chimice, dacă acestea asigură un control corespunzător al organismelor dăunătoare.

Alte recomandări:
Verificaţi cu mare atenţie recomandările cu privire la compatibilitatea produselor atunci când intenţionaţi să aplicaţi amestecuri de produse de protecţie a plantelor! Luaţi măsurile ce se impun pentru protecţia mediului înconjurător.

Respectaţi cu stricteţe normele de lucru cu produse de protecţie a plantelor, cele de securitate a **m**uncii, de protecţie a animalelor şi familiilor de albine, în conformitate cu: Legea Apiculturii nr. 383/2013, cu modificările şi completările ulterioare şi Ordinul 127/1991 al ACA din România, Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, Ordinul nr. 15b/3404/1991al Departamentului pentru Administraţie Locală si Ordinul 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, precum şi în conformitate cu Protocolul de colaborare, nr. 328432/2015, încheiat cu ROMAPIS, privind implementarea legislaţiei în vederea protecţiei familiilor de albine împotriva intoxicaţiilor cu produse pentru protectia plantelor.

Respectaţi prevederile Ordinului Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, nr 297/2017, privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea în siguranţă a produselor de protecţie a plantelor.
Respectaţi obligaţiile ce vă revin conform Ordinului Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Ministerului Mediului Apelor şi Pădurilor şi al Preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, nr. 352/636/542015, pentru aprobarea normelor privind ecocondiţionalitatea în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, cu modificările şi completările ulterioare.

Responsabil Prognoză şi Avertizare,
Micuţ – Istrate Daniela