AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ

OFICIUL FITOSANITAR ZONAL ILFOV-CĂLĂRAȘI-GIURGIU
OFICIUL FITOSANITAR CĂLĂRAȘI, Prelungirea București nr. 26, bl. D3, Călărași, județul Călărași, Tel: 0242.331.086, Email: ofcalarasi@anfof.ro

BULETIN DE AVERTIZARE 83 din 09.11.2026



Culturile de cereale sunt predispuse la atacul de muşte ale cerealelor când acestea sunt semanate cel mai adesea în monocultură.

În condiţiile din România există un complex de specii de diptere care pot dăuna cerealelor de toamnă. Cele mai cunoscute sunt: musca suedeză (*Oscinella frit*), musca galbenă a cerealelor (*Chlorops pumilionis*), musca cenuşie a cerealelor (*Delia coarctata*), musca neagră a cerealelor (*Phorbia securis*), opomiza cerealelor (*Opomyza florum*) sau musca de Hessa (*Mayetiola destructor*). Larvele acestor specii de diptere sunt cele care dăunează plantele de grâu, fie toamna devreme, fie primăvara.



Atacul apare de obicei la începutul toamnei pe culturile de cereale, mai ales pe grâu, dar şi pe orz.

Atacul din perioada toamnei are loc când plantele sunt in faza de 2-3 frunze. La începutul perioadei de vegetaţie, atacul are loc în zona unde este situat mugurele de creştere. Plantele atacate au frunza centrală îngălbenită, iar dacă este smulsă, se desprinde cu uşurinţă. Plantele atacate fie pier, fie supravieţuiesc, dar sunt mai slab dezvoltate, având baza tulpinii îngroşată, prezentând o înfrăţire exagerată. Între frunzele de la baza tulpinii se găseşte larva.

La plantele atacate în stadii mai avansate de creştere se observă, de asemenea, o înfrăţire puternică şi îngroşarea tulpinilor în zona bazală.

La îndepărtarea frunzei îngălbenite se pot observa larvele sau pupele (la musca de Hesa) unde generaţia de toamnă este cea mai păgubitoare.

PRODUSE OMOLOGATE

CYCLONE (FASTER GOLD 50 EC)

Grâu	Dăunători	Afide - vectori ai virusului îngălbenirii şi piticirii, musca cerealelor	0,1 l/ha Pauză 35 zile

KARATE ZEON (NINJA)

Grâu	Dăunători	Afide, tripsul, viermele roşu al paiului, musca suedeză	0,15 l/ha se aplică la avertizare Pauză 21 zile

Tratamentul se va efectua pe timp liniştit, fără vânt.

Alte recomandări:
Verificaţi cu mare atenţie recomandările cu privire la compatibilitatea produselor atunci când intenţionaţi să aplicaţi amestecuri de produse de protecţie a plantelor! Luaţi măsurile ce se impun pentru protecţia mediului înconjurător.

Respectaţi cu stricteţe normele de lucru cu produse de protecţie a plantelor, cele de securitate a **m**uncii, de protecţie a animalelor şi familiilor de albine, în conformitate cu: Legea Apiculturii nr. 383/2013, cu modificările şi completările ulterioare şi Ordinul 127/1991 al ACA din România, Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, Ordinul nr. 15b/3404/1991al Departamentului pentru Administraţie Locală si Ordinul 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, precum şi în conformitate cu Protocolul de colaborare, nr. 328432/2015, încheiat cu ROMAPIS, privind implementarea legislaţiei în vederea protecţiei familiilor de albine împotriva intoxicaţiilor cu produse pentru protectia plantelor.

Respectaţi prevederile Ordinului Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, nr 297/2017, privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea în siguranţă a produselor de protecţie a plantelor.
Respectaţi obligaţiile ce vă revin conform Ordinului Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Ministerului Mediului Apelor şi Pădurilor şi al Preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, nr. 352/636/542015, pentru aprobarea normelor privind ecocondiţionalitatea în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, cu modificările şi completările ulterioare.

Responsabil Prognoză şi Avertizare,
Micuţ – Istrate Daniela