
AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ

OFICIUL FITOSANITAR ZONAL ILFOV-CĂLĂRAȘI-GIURGIU
OFICIUL FITOSANITAR CĂLĂRAȘI, Prelungirea București nr. 26, bl. D3, Călărași, județul Călărași, Tel: 0242.331.086, Email: ofcalarasi@anfof.ro

BULETIN DE AVERTIZARE 82 din 09.11.2026

Putregaiul negru (PHOMA L.)



Putregaiul negru al rapiței poate afecta cultura pe întreg ciclul de vegetație, începând cu faza cotiledonală. Primele simptome apar toamna când sunt condiții de umiditate crescută, temperaturi mai ridicate. Atacă toate organele plantelor, inclusiv coletul şi rădăcina. Plantele afectate pot prezenta pe frunze simptome de înroşire accentuată, fenomene de nanism şi de maturare precoce. La început se pot observa pe frunze pete de culoare alb-cenuşiu, apoi să apară fructificațiile ciupercii de culoare cenuşiu-roz. La atac puternic se brunifică şi putrezesc. Caracteristice sunt simptomele de frângere a plantelor la nivelul coletului sau al ramificațiilor atacate. În resturile vegetale ciuperca poate rezista mai mulți ani.

Folositi unul din urmatoarel produse, după caz:

Nr. crt	Denumirea PPP	Agentul de dăunare combătut	Doza recomandata l,kg,%/ha	Observatii
1	ZIZAN 500 SC + DAFNE 250 EC	Putregaiul negru, alternazioza, putregaiul alb al rapitei	0,4 l/ha+0,3 l/ha	Cantitatea de apa utilizata/ha-300-500 l, in functie de faza de vegetatie
2	DAFNE 250 EC (ILA 250 EC)	Putregaiul negru, alte boli; alternarioza	0,6 l/ha.	
3	ORIUS 25 EW (SALVATOR 25 EW)	Putregaiul negru	0,5 l/ha. Pauza 56 zile de la aplicarea tratamentului. Se aplica toamna pentru cresterea rezistentei plantelor la iernare si pentru combaterea putregaiului negru	
4	STARPRO 430 SC (MATIZ EXTRA 430 SC)	Putregaiul negru, alte boli: alternarioza, putregaiul cenusiu; Regulator de crestere	0,45 l/ha Se aplica toamna la	

			4-8 frunze. Pauza 56 zile.	
5	FOLICUR SOLO 250 EW(VALOR 250 EW)	Putregaiul negru, creşterea rezistenţei plantelor la iernare şi la cădere.	0,5 l/ha-Tratament aplicat toamna.	

Tratamentul se va efectua pe timp liniştit, fără vânt.

Alte <u>recomandări:</u>

Verificaţi cu mare atenţie recomandările cu privire la compatibilitatea produselor atunci când intenţionaţi să aplicaţi amestecuri de produse de protecţie a plantelor! Luaţi măsurile ce se impun pentru protecţia mediului înconjurător.

Respectaţi cu stricteţe normele de lucru cu produse de protecţie a plantelor, cele de securitate a **m**uncii, de protecţie a animalelor şi familiilor de albine, în conformitate cu: Legea Apiculturii nr. 383/2013, cu modificările şi completările ulterioare şi Ordinul 127/1991 al ACA din România, Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, Ordinul nr. 15b/3404/1991al Departamentului pentru Administraţie Locală si Ordinul 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, precum şi în conformitate cu Protocolul de colaborare, nr. 328432/2015, încheiat cu ROMAPIS, privind implementarea legislaţiei în vederea protecţiei familiilor de albine împotriva intoxicaţiilor cu produse pentru protectia plantelor.

Respectaţi prevederile Ordinului Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, nr 297/2017, privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea în siguranţă a produselor de protecţie a plantelor.

Respectaţi obligaţiile ce vă revin conform Ordinului Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Ministerului Mediului Apelor şi Pădurilor şi al Preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, nr. 352/636/542015, pentru aprobarea normelor privind ecocondiţionalitatea în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, cu modificările şi completările ulterioare.

Responsabil Prognoză şi Avertizare,
Micuţ – Istrate Daniela