OFICIUL FITOSANITAR NEAMȚ, Str. Fermelor nr. 24,
Piatra Neamț, județul Neamt
Tel: 0233.231.661, Email: ofneamt@anfof.ro

B U L E T I N D E A V E R T I Z A R E

Nr. 61 din 09 noiembrie 2026

Conditiile climatice din ultimile zile au favorizat aparitia si dezvoltarea daunatorilor : ***Soarecele de camp (Microtus arvalis)*** care pot cauza pierderi importante la culturile de : ***CEREALE PAIOASE DE TOAMNA, LEGUMINOASE PERENE, PASUNI SI FANETE NATURALE SI CULTIVATE, PLANTATII POMI FRUCTIFERI.***
Pentru prevenire si combatere se recomanda executarea tratamentului : ***T1*** pe parcelele pe care s-a depasit pragul economic de daunare :***Soarecele de camp - culturi diferite : 5 colonii (vetre) umblate/ha, pomi : 1 colonie umblata/pom ;*** Folositi produsul de mai jos :



1. ***ARVALIN*** – 5 bucati/galerie. Este un rodenticid sub forma de momeala gata de utilizare (boabe de cereale impregnate). Odata plasata in galerii, momelile ingerate de soareci intra in contact cu acidul gastric isi produc efectul rapid si sigur cu rezultate in cateva minute.

ARVALIN – este omologat ca produs de protectia plantelor, pentru controlul soarecilor de camp, in camp deschis cu utilizare in fermele agricole ce au drept domeniu de activitate cultivarea cerealelor, silvicultura, legumicultura, viticultura, plante ornamentale

Utilizări					
Cultură RO	Agent Dăun.	Nume RO	Doză	Pauză	Nr.Trat.
Campii	Dăunători	Soarecele de camp	5 bucati/galerie(2 kg/ha; max 3 apliucari sezon)	-	max 3 aplicari/s
culturi agricole	Dăunători	Soarecele de camp	5 bucati/galerie(2 kg/ha; max 3 apliucari sezon)	-	max.3 aplicari/s
Culturi forestiere	Dăunători	Soarecele de camp	5 bucati/galerie(2 kg/ha; max 3 apliucari sezon)	--	max.3 aplicari/s
Culturi legumicole	Dăunători	Soarecele de camp	5 bucati/galerie(2 kg/ha; max 3 apliucari sezon)	-	max.3 aplicari/s
paji`sti	Dăunători	Soarecele de camp	5 bucati/galerie(2 kg/ha; max 3 apliucari sezon)	-	max 3 aplicari/s
Plante decorative	Dăunători	Soarecele de camp	5 bucati/galerie(2 kg/ha; max 3 apliucari sezon)	-	max 3 aplicari/s
Pomi fructiferi	Dăunători	Soarecele de camp	5 bucati/galerie(2 kg/ha; max 3 apliucari sezon)	-	max 3 aplicari/s
Vita de vie	Dăunători	Soarecele de camp	5 bucati/galerie(2 kg/ha; max 3 apliucari sezon)	-	max 3 aplicari/s

sau

2. ***RATRON GW*** (s.a.fosfura de zinc) - 5 momeli / galerie - produs de protectie a plantelor omologat pentru combaterea soarecilor de camp în livezi, culturi agricole, pasuni, podgorii, zone forestriere, zone necultivate, zone ornamentale. Momeala se plasează obligatoriu, adânc în galeriile rozătoarelor, inaccesibilă animalelor domestice şi sălbatice. Aplicare: se pune momeala direct în galerii, iar apoi se acoperă galeria. Aplicarea este mai eficienta daca galeriile nu sunt deteriorate, soarecii de camp sunt precauti daca acestea nu sunt în stare optima. Nu se pun momeli în arealele umede si nici aproape de zonele în care oamenii sau animalele domestice si salbatice au acces. Atentie! După terminarea aplicarii momelii în galerii, vor fi fixate şi puse la loc vizibil plăcuţe pe care este scris vizibil mentiunea „TEREN OTRAVIT”. Plăcuţele vor fi aplicate obligatoriu în colţurile terenului tratat şi la căile de acces

Utitilizări					
Cultură RO	Agent Dăun.	Nume RO	Doză	Pauză	Nr.Trat.
culturi agricole	Dăunători	Microtus arvalis, Microtus agrestis (Șoareci de câmp)	5 momeli/galerie	-	-
LEGUME (CÂMP ȘI SPAȚII PROTEJATE)	Dăunători	Microtus arvalis, Microtus agrestis (Șoareci de câmp)	5 momeli/galerie	-	-
livezi	Dăunători	Microtus arvalis, Microtus agrestis, Clethrionomys glareolus (Șoareci de câmp)	5 momeli/galerie	-	-
Pasuni	Dăunători	Microtus arvalis, Microtus agrestis (Șoareci de câmp)	5 momeli/galerie	-	-
PODGORII	Dăunători	Microtus arvalis, Microtus agrestis (Șoareci de câmp)	5 momeli/galerie	-	-
ZONE FORESTIERE	Dăunători	Microtus arvalis, Microtus agrestis, Clethrionomys glareolus (Șoareci de câmp)	5 momeli/galerie	-	-
ZONE NECULTIVATE	Dăunători	Microtus arvalis, Microtus agrestis (Șoareci de câmp)	5 momeli/galerie	-	-
ZONE ORNAMENTALE (CÂMP ȘI SPAȚII PROTEJATE)	Dăunători	Microtus arvalis, Microtus agrestis (Șoareci de câmp)	5 momeli/galerie	-	-

Perioada optima de tratament ***: noiembrie - decembrie 202***5
Fenofaza culturii **: *Tratamentul se aplica dupa recoltarea fanului, culesul fructelor si retragerea animalelor de la pasunat.***

ATENTIE ! ***Solele pe care urmeaza a se efectua tratamentul se vor inscriptiona in locuri vizibile cu pancarte de tipul « Teren otravit « sau « Pasunatul interzis ». Se vor instiinta consiiliile locale cu sapte zile inante despre efectuarea tratamentului, pentru anuntarea propietarilor de animale din zona.***

Luati masurile necesare ce se impun pentru protectia mediului incojurator. Respectati cu strictete normele de lucru cu produse de prptectia plantelor, pe cele de securitate a muncii si cele de protectie a albinelor si animalelor.

Se vor respecta prevederile OG 4/1995 modificata si aprobata prin Legea 85/1995 precum si OG 41/2007 modificata si aprobata prin L28/2009.

Se pot utiliza şi alte produse de protecţia plantelor recomandate în PEST EXPERT pentru testele avertizate.

Respectaţi timpul de pauză a fiecarui produs.

Citiţi cu atenţie prospectul/instrucţiuniile produselor de protecţia plantelor înainte de utilizare !

Folosiți la prepararea solutiilor de stropit numai apa din surse autorizate si verificate periodic (cu Ph cuprins intre 7 -8;
Clatiți de 3 ori recipienții si livrati ambalajele si apele uzate la operatorii economici care efectuează neutralizarea acestora > ***program SCAPA*** www.aiprom.r Luaţi măsurile ce se impun și în conformitate cu legislaţia în vigoare pentru protecţia mediului înconjurător !
Pentru protectia albinelor este obligatorie respectarea Ordinului privind masurile pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide Ordinul comun nr.45/1991 al Ministerului Agriculturii si Alimentatiei :1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor ; 65/05.02.1992 al Ministerului Mediului ; 15 b/3404/1991 al Departamentului pentru Administratie locala si 127/1991 al Asociatiei Crescatorilor de Albine din Romania, Legea apiculturii 393/2013, Protocolul de colaborare nr.328.432/31.03.2015 incheiat intre Agentia Nationala Fitosanitara si Asociatia Crescatorilor de Albine din Romania, Protocolul nr.3242/21.10.2016 dintre Autoritatea Nationala Fitosanitara si Federatia Asociatiilor Apicole3 din Romania – Romapis, privind implementarea legislatiei in vederea protectiei familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu produse de protectia plantelor.

Întocmit:,
Cons.superior ,
Cretu Iuliana