AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ
OFICIUL FITOSANITAR ZONAL BUZĂU – IALOMIȚA

OFICIUL FITOSANITAR BUZĂU , Str. Frasinet nr 3 , Buzău , județul Buzău ,
Tel : 0238.437.884 , Email : ofbuzau@anfof.ro

AVERTIZAREA NR. 54 / 20 .11. 2026

Oficiul Fitosanitar Buzau recomanda efectuarea tratamentelor fitosanitare in **Repaus vegetativ la Toate speciile pomicole si arbusti fructiferi.**

Pentru prevenirea si combaterea organismelor daunatoare se recomanda utilizarea urmatoarelor produse de protectia plantelor omologate.

Înainte de efectuarea tratamentului recomandăm efectuarea măsurilor de igienă culturală, parte a măsurilor de combatere integrată:

- Tăierea și arderea lăstarilor atacați de fainare, foc bacterian, boli de scoarță și lemn;
- Strângerea și distrugerea fructelor mumifiate;
- Răzuirea trunchiului pentru îndepartarea lichenilor și mușchilor(în cazul pomilor bătrâni);
- Defrișarea pomilor uscați.

COMBATERE:

DAUNATORI

MOSPILAN 20 SG / (KRIMA 20 SG - a doua denumire comerciala)

Mar	Dăunători	Paduchele din San Jose	0,450 kg/ha +0,5 % adjuvant (tratament de iarna	14 zile	-
Prun	Dăunători	Paduchele din San Hose	0,450 kg/ha +0,5 % adjuvant (tratament de iarna	14 zile	-

JUVINAL 10 EC

plantatii de mar	Dăunători	Paduchele din San Jose	0,1% (larve hibernante in per. de iarna)	-	-
Prun	Dăunători	Paduchele din San Hose	0,1% (larve hibernante in per. de iarna)	-	-

ESTIUOIL/(YAGOS-a doua denumire comerciala)

Cais	Dăunători	Paduchele din San Hose	0,75-1,0 L/hL (3,75-15 L/ha)	-	-
Cires	Dăunători	Paduchele din San Hose	0,75-1,0 L/hL (3,75-15 L/ha)	-	-
gutui	Dăunători	Paduchele din San Hose	0,75-1,0 L/hL (3,75-15 L/ha)	-	-
Mar	Dăunători	Paduchele din San Hose	0,75-1,0 L/hL (3,75-15 L/ha)	-	-
Nectarin	Dăunători	Paduchele din San Hose	0,75-1,0 L/hL (3,75-15 L/ha)	-	-
Par	Dăunători	Paduchele din San Hose	0,75-1,0 L/hL (3,75-15 L/ha)	-	-
Piersic	Dăunători	Paduchele din San Hose	0,75-1,0 L/hL (3,75-15 L/ha)	-	-

OVIPRON TOP/(VERNOIL - a doua denumire comerciala)

Cais	• Dăunători	Paduchele din San Hose, paduchele tepos al piersicului, paduchele testos al prunului, eriofide, paianjenul rosu al pomilor, acarianul rosu comun, acarieni, afide	2500 ml/100 L apa sau 1500 ml/100 L apa in amestec cu un insecti	20 zile	-
Cires	• Dăunători	Paduchele din San Hose, paduchele tepos al piersicului, paduchele testos al prunului, eriofide, paianjenul rosu al pomilor, acarianul rosu comun, acarieni, afide	2500 ml/100 L apa sau 1500 ml/100 L apa in amestec cu un insecti	20 zile	-
Nectarin	• Dăunători	Paduchele din San Hose, paduchele tepos al piersicului, paduchele testos al prunului, eriofide, paianjenul rosu al pomilor, acarianul rosu comun, acarieni, afide	2500 ml/100 L apa sau 1500 ml/100 L apa in amestec cu un insecti	20 zile	-
Piersic	• Dăunători	Paduchele din San Hose, paduchele tepos al piersicului, paduchele testos al prunului, eriofide, paianjenul rosu al pomilor, acarianul rosu comun, acarieni, afide	2500 ml/100 L apa sau 1500 ml/100 L apa in amestec cu un insecti	20 zile	-

Pomi fructiferi (mar, par)	• Dăunători	Paduchele din San Hose, paianjenul rosu al pomilor, acarianul rosu comun, acarieni, puricele melifer al parului, afide, paduchele lanos	2500 ml/100 L apa sau 1500 ml/100 L apa in amestec cu un insecti	20 zile	-
Prun	• Dăunători	Paduchele din San Hose, paduchele tepos al piersicului, paduchele testos al prunului, eriofide, paianjenul rosu al pomilor, acarianul rosu comun, acarieni, afide	2500 ml/100 L apa sau 1500 ml/100 L apa in amestec cu un insecti	20 zile	-

PLANTOIL

Pomi fructiferi (samburoase)	Dăunători	Quadraspidiotus perniciosus (Păduchele din San Jose)	0,75-1,0 % (3,75-15,0 L/ha)	-	-
pomi fructiferi (semin`toase)	Dăunători	Quadraspidiotus perniciosus (Păduchele din San Jose)	0,75-1,0 % (3,75-15,0 L/ha)	-	-

¶ BOLI

CUPROFIX ULTRA/NOVICURE-a doua denumire comerciala

Pomi fructiferi (samburoase)	Boli	Ciuruirea frunzelor, basicarea frunzelor, ciuruirea bacteriana, patarea bacteriana	6,0 kg/ha (tratament aplicat in perioada repaosului vegetativ)	21 zile	
pomi fructiferi (semintoase)	Boli	Rapan, Cancerul deschis, Ciuruirea bacteriana	3,5-6,0 kg/ha (tratament in perioada repaosului vegetativ)	21 zile	-

AIRONE SC

LIVEZI (MĂR, PĂR, GUTUI)	Boli	Nectaria galligena, Erwinia amylovora, Pseudomonas syringae, Phoma pomorum	3,0 L/ha Se aplică toamna la căderea frunzelor (BBCH 91-97	21 zile	-
POMI FRUCTIFERI: MĂR, PĂR, GUTUI	Boli	Venturia inaequalis, Venturia pirina	2,5 L/ha Se aplică toamna la căderea frunzelor (BBCH 91-97	21 zile	-
SÂMBUROASE (CAIS, CIREŞ, PRUN)	Boli	Taphrina cerasi, Taphrina pruni, Stigmia carpophila, Monilinia spp.	4,0 L/ha Se aplică toamna la căderea frunzel	21 zile	-
SÂMBUROASE (PIERSIC, NECTARIN, PIERSIC PENTRU INDUSTRIE)	Boli	Monilinia spp., Taphrina deformans	3,5 L/ha Se aplică toamna la căderea frunze	21 zile	-

ALCUPRAL 50 PU

Cais	Boli	Taphrina spp., Monlinia spp. , Stigmina carpophila, Pseudomonas syryngae pv. syringae, Blumeriella jaapii, Cytospora leucostoma, Polystigma rubrum	1,5 - 2,0 kg/ha Se aplică când 50 % din frunze au căzut	-	Max. 4 tratament
gutui	Boli	Venturia spp., Nectria galigena, Monilinia spp., Erwininia amylovora, Pseudomonas spp.	1,5 - 2,0 kg/ha Se aplică de la începutul căderii frunzelor	-	Max. 4 tratament
Mar	Boli	Venturia spp., Nectria galigena, Monilinia spp., Erwininia amylovora, Pseudomonas spp.	1,5 - 2,0 kg/ha Se aplică de la începutul căderii frunzelor	-	Max. 4 tratament
Mosmon	Boli	Venturia spp., Nectria galigena, Monilinia spp., Erwininia amylovora, Pseudomonas spp.	1,5 - 2,0 kg/ha Se aplică de la începutul căderii frunzelor	-	Max. 4 tratament
Mosmon japonez	Boli	Venturia spp., Nectria galigena, Monilinia spp., Erwininia amylovora, Pseudomonas spp.	1,5 - 2,0 kg/ha Se aplică de la începutul căderii frunzelor	-	Max. 4 tratament
Nectarin	Boli	Taphrina spp., Monlinia spp. , Stigmina carpophila, Pseudomonas syryngae pv. syringae, Blumeriella jaapii, Cytospora leucostoma, Polystigma rubrum	1,5 - 2,0 kg/ha Se aplică când 50 % din frunze au căzut	-	Max. 4 tratame
Par	Boli	Venturia spp., Nectria galigena, Monilinia spp., Erwininia amylovora, Pseudomonas spp.	1,5 - 2,0 kg/ha Se aplică de la începutul căderii frunzelor	-	Max. 4 tratament
Piersic	Boli	Taphrina spp., Monlinia spp. , Stigmina carpophila, Pseudomonas syryngae pv. syringae, Blumeriella jaapii, Cytospora leucostoma, Polystigma rubrum	1,5 - 2,0 kg/ha Se aplică când 50 % din frunze au căzut	-	Max. 4 tratame
Prun	Boli	Taphrina spp., Monlinia spp. , Stigmina carpophila, Pseudomonas syryngae pv. syringae, Blumeriella jaapii, Cytospora leucostoma, Polystigma rubrum	1,5 - 2,0 kg/ha Se aplică când 50 % din frunze au căzut	-	Max. 4 tratament

ZEAMA BORDELEZA TIP „MIF" / (ZEAMA BORDELEZA VALLES - a doua denumire comerciala)

gutui	Boli	Venturia spp., Nectria galigena, Monilinia spp., Pseudomonas spp., Erwininia amylovora	3,75-5,0 kg/ha Se aplică de la începutul căderii frunzelor	-	Max. 4 tratament
Mar	Boli	Venturia spp., Nectria galigena, Monilinia spp., Pseudomonas spp., Erwininia amylovora	3,75-5,0 kg/ha Se aplică de la începutul căderii frunzelor	-	Max. 4 tratament
Mosmon	Boli	3,75-5,0 kg/ha Se aplică de la începutul căderii frunzelor până la apariția mugurilor florali (BBCH 91-53)	3,75-5,0 kg/ha Se aplică de la începutul căderii frunzelor	-	Max. 4 tratament
Mosmon japonez	Boli	3,75-5,0 kg/ha Se aplică de la începutul căderii frunzelor până la apariția mugurilor florali (BBCH 91-53).	Max. 4 tratamente la interval de 7 zile între tratamente.	-	Max. 4 tratament
Par	Boli	Venturia spp., Nectria galigena, Monilinia spp., Pseudomonas spp., Erwininia amylovora	3,75-5,0 kg/ha Se aplică de la începutul căderii frunzelor	-	Max. 4 tratament

Tratamentul se va executa dupa efectuarea lucrarilor de igiena culturala ,la temperaturi de + 5 ^{0} C , la pomii fara apa , chiciura sau polei

Se pot utiliza si alte produse recomandate in lista oficiala PEST – EXPERT pentru testele avertizate.

Pentru consultarea bazei de date se procedează astfel:

- se accesează link-ul http://81.196.111.66:8085/ (utilizator si parola guest) .

Respectati cu strictete perioadele de remanenta a produselor de protectie a plantelor , a normelor de lucru ,pe cele de securitate a muncii , de protectie a albinelor si a animalelor , conform Protocolului de Colaborare nr. 3242 / F / 21.10.2016 dintre MADR – ANF – SI ROMAPIS ,Ordinul comun nr.45/1991/127/68/15b/1991 al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Asociatiei Crescatorilor de Albine , din Romania , Ministerului Transporturilor ,Ministerul Mediului ,Departamentul pentru Administratie locala , privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide si a Legii nr . 383/2013 a apiculturii si Legea nr.280/2015, privind modificarea legii apiculturii.

Ambalajele din material plastic se vor clati obligatoriu de 3 ori, cu folosirea apei reziduale in rezervorul masinilor de tratat. Ambalajele clatite se depoziteaza in magazii si se returneaza distribuitorului.

Conform prevederilor legale prevazute in : Reg. (CE) Nr. 1107/2009 ; H.G. nr 1559/2012; O.G. nr. 53/2025; O.M. 352/2015 si SMR 7, SMR 8 – Introducerea pe piata a produselor de protectie a plantelor, fermierii care prin activitatea lor depoziteaza, manipuleaza si utilizeaza produse de protectie a plantelor au obligatia de a tine evidenta la zi, dupa efectuarea fiecarui tratament fitosanitar sau erbicidat dupa modelul de mai jos:

Buletinele de prognoza si avertizare vor fi afisate in locuri vizibile pentru a fi accesibile tuturor celor interesati.

Intocmit ,
Coordonator OF Buzau
Ing. Borjoiu Liviu

Nume şi prenume fermier/soc. comercială.....
Domiciliu fermier/sediul social al societăţii .....
(Comuna, judeţul)
Ferma (nume/număr, adresa).....

REGISTRU

de evidenţă a tratamentelor cu produse de protecţie a plantelor

Data efectu-ării tratam. (ziua luna, anul)	**Cultura şi locul unde este situat terenul**	**Tim-pul apli-cării**	**Tratamentul efectuat**					**Numele, pre-numele pers. responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura**	**Data începe-rii recol-tării** produsului agricol	**Nr. si data document prin care s-a dat în consum populaţiei**
			Agentul de dău-nare: boli/ dă-unători/ buruieni	**Denu-mire ppp folosit**	**Doza omolo-gată /doza folosită**	**Supra-faţa, ha**	**Canti-tăţi utili-zate (kg, l)**			

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

Producătorul agricol numerotează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menţionează câte pagini conţine registrul, purtând semnătura (şi ştampila după caz) fermierului sau administratorului societăţii.

Inspectorii Oficiului Fitosanitar pot sanctiona fermierul, conform H.G. nr. 1230 din 12 decembrie 2012 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piata a produselor fitosanitare si de abrogare a Directivelor 79/117/CEE si 91/414/CEE ale Consiliului, art. 3, pct 1 (i)

„(1) Constituie contraventii urmatoarele fapte:

i.) nerespectarea de catre utilizatorii profesionisti a prevederilor art.67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr.1.107/2009 privind mentinerea evidentei pe o perioada de cel putin 3 ani a produselor de protectie a plantelor pe care le utilizeaza" (se sanctioneaza cu amenda de la 8.000 lei la 10.000 lei).