AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ

OFICIUL FITOSANITAR ZONAL ILFOV-CĂLĂRAȘI-GIURGIU
OFICIUL FITOSANITAR CĂLĂRAȘI, Prelungirea București nr. 26, bl. D3, Călărași județul Călărași, Tel: 0242.331.086, Email: ofcalarasi@anfof.ro


BULETIN DE AVERTIZARE 79 din 09.11.2026

Oficiul Fitosanitar Călărași recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar la cultura de RAPITĂ DE TOAMNĂ împotriva dăunătorilor*: viespea rapiței, purici, păduchi.*

Tratamentul este curativ, aplicându-se doar pe parcelele unde larvele dăunatorului sunt prezente.

Pragul economic de daunare este de 2 larve/plantă.

Viespea rapiței (Athalia rosae)



Adultul are corpul de 5,2 - 9 mm lungime, cu capul de culoare neagră, toracele roșcat, pronotul galben-roșcat, mezonotul și scutelul galbene. Larva este polipodă, iar la completa dezvoltare are corpul de 15-18 mm lungime, de culoare **cenusie**, iar lateral și ventral, de culoare **cenusie-verzuie.**


Larvele viespei de rapită atacă în toamnă cultura de rapită provocând pierderi de până la 90%, din această cauză este și consideraăa unul dintre cei mai periculoși dăunători ai culturii de rapiță. Larvele viespei de rapiță se hrănesc cu frunze, flori, muguri terminali și păstăi. Larvele de pe partea din spate a frunzelor se hrănesc cu epiderma inferioară, ajungând într-un final să consume tot limbul frunzei. Plantele care suferă un atac foarte puternic vor muri.

Puricii cruciferelor (PHYLLOTRETA spp.)



Phyllotreta atra (puricele negru al verzei, puricele de pământ sau puricele cruciferelor); Phyllotreta nigriceps (puricele negru al cruciferelor); Phyllotreta nemorum (puricele vărgat al verzei) sau Phyllotreta undulata (puricele undulat al verzei). Insecta iernează în stadiul de adult printre resturile vegetale sau în stratul superficial în sol. Începând cu luna martie adulții se hrănesc cu diferite specii de plante crucifere spontane. După această primă etapă de hrănire, adulții migrează spre plantele cultivate. Pagubele asupra culturilor sunt produse de insectele în stadiul adult care consumă partea superioară a frunzelor. Plantele consumate de către puricii negri ai verzei au un aspect caracteristic, ciuruit. La atacuri puternice frunzele se usucă și planta este afectată.

PĂDUCHELE CENUȘIU AL VERZEI (*Brevicorine brassiacae*)



Descriere: a) forma apteră (fără aripi) are un corp globulos de circa 2 -2,6 mm, culoarea gabenă spre verzui, corpul este acoperit cu o secreție ceroasă de culoare albă spre cenusiu; b) forma aripată este ceva mai mică, lungimea este de 1,9 – 2 mm, toracele și capul au culoare brun-închisă, abdomenul este galben spre verde. Simptome ale atacului: formează colonii dense acoperind complet frunzele de varză, lăstarii sau silicvele; din cauza

înțepăturilor plantele se îngălbenesc, se răsucesc și se usucă, în faza de răsad planta stagnează din creștere și se usucă.

Pentru combaterea agentului de dăunare, se recomandă utilizarea unui produs de protecția plantelor omologat.

MOSPILAN 20 SG / (KRIMA 20 SG)

Rapiță	Dăunători	Viespea rapiței, gândacul lucios al rapiței	0,150 kg/ha. Tratamentele se aplică la apariția dăunătorului.	-

INAZUMA

Rapița de toamnă	Dăunători	Afide, viespea rapiței, puricii de pământ	0,125-0,2 kg/ha. Pauza 35 zile.

MOSPILAN 20 SP / (GAZELLE)

Rapiță	Dăunători	Viespea rapiței, gândacul lucios al rapiței	0,150 kg/ha. Tratamentele se aplică la apariția dăunătorului.

DECIS EXPERT 100 EC

Rapiță	Dăunători	Puricele albastru, afide	75 ml/ha. Pauză 45 zile.	

LOS AVADOS 200SE 9BIATOX 200SE) - 0.25 l/ha +0,1 l/ha adjuvant; afide , viespea rapiței ,puricele cruciferelor, musca verzei. Pauză 39 zile.

Alte recomandări:

Verificați cu mare atenție recomandările cu privire la compatibilitatea produselor atunci când intenționați să aplicați amestecuri de produse de protecție a plantelor! Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător.

Respectați cu strictețe normele de lucru cu produse de protecție a plantelor, cele de securitate a **m**uncii, de protecție a animalelor și familiilor de albine, în conformitate cu: Legea Apiculturii nr. 383/2013, cu modificările și completările ulterioare și Ordinul 127/1991 al ACA din România, Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației, Ordinul nr. 15b/3404/1991al Departamentului pentru Administrație Locală si Ordinul 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, precum și în conformitate cu Protocolul de colaborare, nr. 328432/2015, încheiat cu ROMAPIS, privind implementarea legislației în vederea protecției familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu produse pentru protectia plantelor.

Respectați prevederile Ordinului Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, nr 297/2017, privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea în siguranță a produselor de protecție a plantelor.

Respectați obligațiile ce vă revin conform Ordinului Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerului Mediului Apelor și Pădurilor și al Președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și

pentru Siguranța Alimentelor, nr. 352/636/542015, pentru aprobarea normelor privind ecocondiționalitatea în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, cu modificările și completările ulterioare.

Responsabil Prognoză și Avertizare,
Micuț – Istrate Daniela